


1931/32



RUDOLF SCHMIDT
BAUMSCHULEN
ROSENKULTUREN
RELLINGEN 1/4 HOLST

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Rudolf Schmidt

Baumschulen • Rosenkulturen

Gegründet 1904 / Baumschulareal 240 pr. Morgen

Rellingen in Holstein



Hauptpreisverzeichnis für

Wieder- Verkäufer

Herbst 1931

Frühjahr 1932

Eisenbahnstationen: Pinneberg, Halsten-
bek. Fernruf: Amt Pinneberg Sammel-
nummer 3058 / Bank-Konten: Westholst.
Bank in Pinneberg, Skandinaviska Kre-
ditaktiebolaget, Malmö [Schweden],
Schweizerische Volksbank in Zürich.
Postscheck-Konto: Hamburg 8229

MEINE LIEFERUNGSBEDINGUNGEN

(unter Zugrundelegung der Lieferungsbedingungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer). Die Bedingungen gelten zwischen mir und dem Auftraggeber als rechtlich bindend.

PREISE UND ZAHLUNG.

1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $\frac{10}{42}$ U. St. Dollar, ohne Skonto- und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb 3 Tagen nach Empfang bestätigt.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht maßgebend.
3. Der Zehnstückpreis beginnt bei Entnahme von 10 Stück, der Hundertstückpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendstückpreis bei Entnahme von 500 Stück, der Zehntausendstückpreis bei Entnahme von 5000 Stück einer Art und Form.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Rellingen.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.
7. Preisänderungen bleiben vorbehalten.
8. Verkäufer ist berechtigt, die Lieferung bis zur Zahlung oder Sicherheitsleistung zu verweigern, wenn sich nach erfolgter Auftragsbestätigung herausstellt, daß infolge schlechter Vermögensverhältnisse des Käufers der Anspruch auf Zahlung des Kaufwertes gefährdet ist.

VERSAND UND VERPACKUNG.

9. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
10. Für Schäden, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig auszuführen.
11. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

ROLLGELD.

12. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt, wenn nicht anders ausdrücklich vereinbart ist, der Besteller. Die Berechnung erfolgt nach den ortsüblichen Sätzen.

GEWÄHRLEISTUNG.

13. Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
14. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert geleistet, sofern nicht im Einzelfalle besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen worden sind. Bei solchen Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

BESCHWERDEN UND ERSATZ.

15. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

SORTENERSATZ.

16. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

MUSTER UND MASSE.

17. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen. Es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen.
18. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
19. Für alle Lieferungen sind die Qualitätsbestimmungen und Normalmaße des B. d. B. maßgebend.

TRANSPORTVERSICHERUNG.

20. Alle Pflanzensendungen sind für den Transport bei der Badischen Assecuranz-Gesellschaft versichert. Diese Versicherung ist durch den Bund deutscher Baumschulenbesitzer empfohlen und hat sich in der kurzen Zeit ihrer Tätigkeit für Pflanzenversicherung bestens bewährt. Die sehr geringen Unkosten für Transportversicherung beseitigen nun das bisherige Risiko, das der Auftraggeber während des Transportes der Pflanzen tragen mußte. Diese neue Einrichtung hat sich bis jetzt sehr segensreich ausgewirkt.

Rellingen, Herbst 1931

An meine sehr verehrten Kunden!

Hiermit erlaube ich mir, Ihnen mein neues Hauptpreisverzeichnis für die Versandzeit Herbst 1931/Frühjahr 1932 zu überreichen, indem ich der Hoffnung Ausdruck gebe, auch in diesem Jahre wieder Ihre geschätzten Aufträge zu erhalten.

Meine Kulturen befinden sich in bestem Zustande und ich kann die Lieferung einwandfreier, den Qualitätsbestimmungen des Bundes Deutscher Baumschulenbesitzer entsprechender, gesunder und wüchsiger Pflanzen verbürgen. Alle Aufträge werden prompt und sorgfältig erledigt.

Die Preise sind der augenblicklichen Wirtschaftslage angepaßt und liegen teilweise unter den Anzuchtskosten. Sollten Ihnen billigere Angebote vorliegen, so bitte ich zu berücksichtigen, daß zu billige Lieferungen sehr oft nur auf Kosten der Qualität ausgeführt werden können.

Weitere Exemplare meines Preisverzeichnisses stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Sollten Sie wider Erwarten für das vorliegende Preisverzeichnis keine Verwendung haben, so geben Sie dasselbe bitte an andere, die Bedarf in Pflanzen haben.

Besichtigung meiner Kulturen ist mir jederzeit sehr angenehm. Bei rechtzeitiger Anmeldung werde ich Sie gerne am Bahnhof (Station Pinneberg oder Halstenbek der Vorortsverkehrsstrecke Altona/Elmshorn, in ca. 30 Minuten Bahnfahrt von Hamburg/Altona zu erreichen) abholen lassen.

Hochachtungsvoll

Rudolf Schmidt

O B S T B Ä U M E

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Obstbäume und Beerenobst			
Aepfel			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2 50	23.—	200.—
8—10 „ „ verpfl., m. mehrj. Kronen	3 30	30.—	280.—
Halbstämme	1 90	17.—	150.—
„ verpfl. mit mehrjährigen Kronen	2 50	23.—	200.—
Büsche, 2—3jährig	1 75	16.—	140.—
3—4 „	2 20	20.—	180.—
Pyramiden mit 1 Serie	2 20	20.—	180.—
„ 2 Serien	3.—	29.—	270.—
Spaliere mit 1 Etage	2 20	20.—	180.—
„ 2 Etagen	2 80	26.—	240.—
„ 3 „	3 50	32.—	—
Verrier-Palmetten mit 4 Aesten	8 50	80.—	—
U-Formen mit 2 Aesten, 2—3jährig	2 50	23.—	200.—
„ 2 „ 3—4 „	2 90	27.—	250.—
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	1 60	15.—	130.—
„ 3—4 „	2.—	18.—	160.—
„ wagerecht, 1armig, 2—3 „	1 90	17.—	150.—
„ „ 1 „ 3—4 „	2 20	20.—	180.—
„ „ 2 „ 2—3 „	2 20	20.—	180.—
„ „ 2 „ 3—4 „	2 70	25.—	230.—
1jährige Veredlungen	0 75	7.—	60.—
Birnen			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2 50	23.—	200.—
8—10 „ „ verpfl. m. mehrj. Kronen	3 30	30.—	280.—
Halbstämme	1 90	17.—	150.—
Büsche, 2—3jährig	1 75	16.—	140.—
3—4 „	2 20	20.—	180.—
Pyramiden mit 1 Serie	2 20	20.—	180.—
„ 2 Serien	3.—	29.—	270.—
Spaliere mit 1 Etage	2 20	20.—	180.—
„ 2 Etagen	2 80	26.—	240.—
Verrier-Palmetten mit 4 Aesten	9 50	90.—	—
U-Formen mit 2 Aesten, 2—3jährig	2 50	23.—	200.—
„ 2 „ 3—4 „	2 90	27.—	250.—
Schnurbäume, senkrecht, 2—3jährig	1 60	15.—	130.—
„ 3—4 „	2.—	18.—	160.—
„ wagerecht, 1armig, 2—3 „	1 90	17.—	150.—
„ „ 1 „ 3—4 „	2 20	20.—	180.—
„ „ 2 „ 2—3 „	2 20	20.—	180.—
„ „ 2 „ 3—4 „	2 75	25.—	230.—
1jährige Veredlungen	0 75	7.—	60.—
Pflaumen und Zwetschen			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2 50	23.—	200.—
Halbstämme	2.—	18.—	160.—
Büsche, 2—3jährig	1 75	16.—	140.—
3—4 „	2.—	18.—	160.—
Spaliere, Fächerform, mehrjährige Veredlungen	2 65	25.—	240.—
„ mit 3 Etagen	2 75	26.—	250.—
„ 2 „	2 50	24.—	225.—

OBSTBÄUME

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Süß- und Sauerkirschen			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.60	25.—	230.—
Halbstämme	2.20	20.—	180.—
Büsche, 2—3jährig	1.50	14.—	130.—
Schattenmorellen			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	2.60	25.—	230.—
Halbstämme	2.20	20.—	180.—
Büsche, 1jähr. Veredl. auf Prunus Mahaleb	1.10	10.—	90.—
" 2-3 " " " " "	1.50	14.—	130.—
" 3-4 " " " " "	1.70	16.—	145.—
" 4-5 " verpflanzt	1.90	18.—	160.—
" 5-6 " " extra stark	2.20	21.—	200.—
Spaliere, Fächerform, 1j. Veredl. 90—120 cm breit	1.50	14.—	130.—
" " 2-3j. " 120—150 " "	2.20	20.—	180.—
" " 3-4j. " 150—180 " "	2.50	23.—	220.—
" " 1j. Winter-Handveredlungen	0.50	4.50	40.—
Aprikosen			
Hochstämme	3.—	29.—	270.—
Halbstämme	2.60	25.—	230.—
Büsche	2.10	20.—	170.—
Spaliere, Fächerform, 1jährige Veredlungen	2.60	25.—	230.—
" " mehrjährige Veredlungen	3.—	29.—	270.—
Pfirsiche			
Hochstämme	3.—	29.—	270.—
Halbstämme	2.60	25.—	230.—
Büsche	1.90	17.—	150.—
Spaliere, Fächerform, 1jährige Veredlungen	2.60	25.—	230.—
" " mehrjährige Veredlungen	3.—	29.—	270.—
Mispel			
Halbstämme	2.75	25.—	—
Büsche	1.70	15.—	—
Quitten			
Hochstämme	2.80	26.—	240.—
Halbstämme	2.20	20.—	180.—
Büsche, 2—3jährig	1.60	15.—	130.—
Walnuß			
Hochstämme, 7—8 cm Umfang	3.—	29.—	270.—
" 8—10 " "	3.70	35.—	320.—
" 10—12 " "	4.40	42.—	400.—
Sorbus aucuparia moravica			
Süßfrüchtige, eßbare Eberesche, siehe Seite 51			

BEERENSTRÄUCHER -- OBSTSORTEN

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Stachelbeeren			
Hochstämme, mit mehrjährigen Kronen	1.50	13.50	120.—
Halbstämme, 75—100 cm Stammhöhe	0.70	6.50	60.—
Sträucher, in besten, großfrüchtigen mit 3—5 Tr.	0.30	2.50	20.—
Sorten, gesunde, langtriebige, meltau- „ 5—8 „	0.40	3.50	30.—
freie Ware „ 8—12 „	0.45	4.—	32.—

Johannisbeeren			
Hochstämme, mit mehrjährigen Kronen	1.50	13.50	120.—
Halbstämme, 75—100 cm Stammhöhe	0.70	6.50	60.—
Johannisbeeren, rote Holländische, rote Kirsch .			
2jährige Büsche mit 3—5 Trieben	0.25	2.—	16.—
3 „ „ „ 5—8 „	0.30	2.70	22.—
4 „ „ „ 8—12 „	0.40	3.50	26.—
1 „ bewurzelte Stecklinge ^{0/00} 70.—	0.15	1.—	8.—
Johannisbeeren, Erstling von Vierlanden			
2jährige Büsche mit 3—5 Trieben	0.30	2.70	22.—
3 „ „ „ 5—8 „	0.40	3.50	30.—
Johannisbeeren, schwarze, in großfrüchtigen Sorten			
Büsche mit 3—5 Trieben	0.25	2.—	16.—
„ „ 5—8 „	0.30	2.70	22.—
„ „ 8—12 „	0.40	3.50	26.—
1jährige bewurzelte Stecklinge ^{0/00} 70.—	0.15	1.—	8.—
Johannisbeeren, weiße, in Sorten, 2—3jähr. Büsche	0.40	3.50	30.—

Sonstiges			
Himbeeren, in Sorten	0.20	1.70	14.—
„ Superlativ	0.20	1.80	16.—
„ Preußen und Lloyd George	0.25	2.—	18.—
Brombeeren, in Sorten, aufrecht wachsend	0.45	4.—	35.—
„ „ „ rankend	0.55	5.—	45.—
Weinreben, in Sorten	1.20	11.—	100.—
Haselnüsse, großfrüchtig, in Sorten	0.60	5.50	45.—
Rosa rugosa Regeliana, Hagebutte	0.40	3.50	27.—

Vorrätige Obstsorten

Nachstehend gebe ich Ihnen eine Uebersicht der vorrätigen Sorten. Da nicht alle Sorten in allen Formen vorrätig sind, mache ich darauf aufmerksam, daß es sehr oft vorteilhafter ist, wenn mir die Sortenwahl überlassen bleibt, da dann durchschnittlich stärkere Bäume gegeben werden können. Bodenverhältnisse, Lage und nähere Angabe, ob Tafel- oder Wirtschaftsobst, frühe oder späte Sorten gewünscht werden, bitte ich anzugeben. Ich werde dann passende Sorten aussuchen.

Aepfel

Im Sommer reifend:	Im Herbst reifend:	
Apfel aus Croncels	Akerö	Gelber Richard
Charlamowsky	Altenländer Pfann-	Hawthornden
Roter Astrachan	kuchenapfel	Johannsens roter
Säfstaholm	Antonowka	Herbstapfel
Suislepper	Bismarckapfel	Kalvill Großh. Fr. v. Ba-
Weißer Astrachan	Cellini	Lord Grosvenor [den
Weißer Klarapfel	Cox' Pomona	Ostpreußisch. Kurzstiel
	Gelber Gravensteiner	Signe Tillisch
		Schmalzprinz

O B S T S O R T E N

Im Winter reifend:

Adamsapfel
Aderslebener Kalvill
Baumanns Renette
Boikenapfel
Coulons Renette
Cox' Orangen-Renette
Englischer Winterprinz
Fiessers Erstling
Filippas-Apfel

Gelber Winterstettiner
Goldrenette v. Blenheim
Große Kasseler Renette
Gr. rheinisch. Bohnapfel
Harberts Renette
Jacob Lebel
Kaiser Wilhelm
Landsberger Renette
London Pepping
Nathusius' Taubenapfel

Ontarioapfel
Purpurroter Cousinot
Ribston Pepping
Roter Eiserapfel
Roter Trierer Weinapfel
Schöner von Boskoop
Schöner von Miltenberg
Schöner von Nordhausen
v. Zuccalmaglios Renette
Wintergoldparmäne

B i r n e n

Im Sommer reifend:

Dr. Jules Guyot
Frühe von Trevoux
Gr. Sommermagdalene
Juli-Dechantsbirne
Lübecker Sommer-Berga-
motte
Triumph de Vienne
Williams Christbirne

Andenken a. d. Kongreß
Blumenbachs Butterbirne
Bosc's Flaschenbirne
Clapps Liebling
Diels Butterbirne
Doppelte Philippsbirne
Esperens Herrenbirne
Gellerts Butterbirne
Graf Moltke
Gute Graue
Gute Louise v. Avranches
Köstliche von Charneu

Neue Poiteau
Pitmaston
Rote Herbstbergamotte
Vereins-Dechantsbirne

Im Herbst reifend:

Amanlis Butterbirne

Im Winter reifend:
Comtesse de Paris
Großer Katzenkopf
Herrenhäuser Winter-
Christbirne
Liegels Winterbutterbirne
Pastorenbirne

P f l a u m e n

Althans Reineclaude
Anna Späth
Blaue Herrenpflaume
Bühler Frühzwetsche
Esperens Goldpflaume
Fürsts Frühzwetsche
Gelbe Eierpflaume

Große gr. Reineclaude
Hauszwetsche
Jefferson
Kirk's Pflaume
Königin Viktoria
Königspflaume v. Tours
Mirabelle von Nancy

Ontario
Schöne von Löwen
Sessefleth
The Czar
Wangenheims Früh-
zwetsche
Washington

Süß- und Sauerkirschen

Altenländer schwarze
Frühkirsche
Büttners späte Knorpel-
kirsche
Doenissens gelbe Knorpel-
kirsche
Doppelte Glaskirsche
Eltonkirsche

Fromms Herzkirsche
Früheste der Mark
Große Prinzessinkirsche
Große schwarze Knorpel-
kirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Kassins frühe Herzkirsche
Königin Hortensia

Lucienkirsche
Mai-Bigarreau
Ostheimer Weichsel
Rote Maikirsche
Schattenmorelle [große
lange Lotkirsche]
Werdersche frühe
Herzkirsche

S t a c h e l b e e r e n

Amerikanische Gebirgs-
stachelbeere (Mountain
seedling)
Früh. Gelbe [Yellow Lion]
Früheste v. Neuwied, grün
Grüne Flaschenbeere
Grüne Riesenbeere [Jolly
Angler]

Grüne Hansa
Hönings früheste Gelbe
Lady Delamere, grün
May Duke, hellrot
Red Jacket, rot
Rote Preisbeere [Roaring
Lion]

Rote Triumphbeere
(Whinhams Industry)
Sämling von Maurer, rot
Weiße Triumphbeere
[White Smith]
Weiße Volltragende
[Shannon]

ROSENPREISE

ROSEN

Eigene Anzucht jährlich mehrere hunderttausend Stück. Das nachstehende Sortiment umfaßt nur erprobte ältere und neuere Sorten. Die Anzuchtbedingungen für ein gut ausgereiftes, widerstandsfähiges und wüchsiges Pflanzmaterial sind die denkbar günstigsten. Auf streng reelle Sortierung wird besonderer Wert gelegt. Mittelqualität wird nicht aus der II. Qualität aussortiert, sondern aus solchen Quartieren, in denen die Pflanzen im ganzen etwas schwächer geblieben sind und den Anforderungen der I. Qualität nicht genügen.

Preisübersicht für Rosen

1. Niedrige Rosen

a) in guten Sorten meiner Wahl:

I. Wahl	1 Stück	GM.	0.30	10 Stück	GM.	2.50	100 Stück	GM.	20.—
Mittelwahl	1 "	"	0.20	10 "	"	1.85	100 "	"	15.—
II. Wahl	1 "	"	0.15	10 "	"	1.25	100 "	"	10.—

b) in Sorten nach Wahl des Bestellers:

Gruppe		I. Wahl			Mittelwahl			II. Wahl		
		1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
1		0.30	2.50	20.—	0.20	1.85	15.—	0.15	1.25	10.—
"	2	0.35	3.—	25.—	0.25	2.20	19.—	0.20	1.50	12.50
"	3	0.40	3.50	30.—	0.30	2.60	22.50	0.20	1.75	15.—
"	4	0.50	4.50	40.—	0.40	3.50	30.—	0.25	2.25	20.—
"	5	0.60	5.50	50.—	0.45	4.—	37.50	0.30	2.75	25.—
"	6									
	(Schlingrosen)	0.50	4.—	30.—	0.40	3.—	22.50	0.25	2.—	15.—
"	7									
	(Polyantharosen auf Rosa canina)	0.30	2.50	20.—	0.20	1.85	15.—	0.15	1.25	10.—
"	7a									
	(Polyantharosen auf Rosa multifl.)	0.30	2.50	22.—	0.25	2.—	17.—	0.20	1.50	11.—
"	7b									
	(Polyantharosen auf Rosa rugosa)	0.50	4.—	30.—	0.35	3.—	22.50	0.25	2.—	15.—
"	8 (Moos- und Parkrosen)	0.50	4.—	30.—	0.40	3.—	22.50	0.25	2.—	15.—

2. Hochstämmige Rosen

Tranerst. 160-200 cm										
a. Sämlingsstamm	3.50	33.—	300.—	2.65	24.50	225.—	1.75	16.50	150.—	
a. Waldstamm	3.50	33.—	300.—	2.65	24.50	225.—	1.75	16.50	150.—	
a. Rosa rug. Deutsche Ware	2.80	26.—	240.—	2.10	19.50	180.—	1.40	13.—	120.—	
Tranerst. 140-160 cm										
a. Sämlingsstamm	2.80	26.—	240.—	2.10	19.50	180.—	1.40	13.—	120.—	
a. Waldstamm	2.80	26.—	240.—	2.10	19.50	180.—	1.40	13.—	120.—	
a. Rosa rug. Deutsche Ware	2.20	21.—	195.—	1.65	16.—	150.—	1.10	10.50	100.—	
Hochst. 100-140 cm										
a. Sämlingsstamm	1.70	15.—	130.—	1.25	10.50	97.—	0.85	7.50	65.—	
a. Waldstamm	1.55	13.50	117.—	1.10	10.—	87.—	0.75	6.75	58.—	
a. Rosa rug. Deutsche Ware	1.30	11.—	100.—	0.95	8.25	75.—	0.65	5.50	50.—	
Mittelst. 75-100 cm										
a. Sämlingsstamm	1.30	11.—	100.—	0.95	8.25	75.—	0.65	5.50	50.—	
a. Waldstamm	1.15	10.—	90.—	0.85	7.50	67.50	0.55	5.—	45.—	
Halbstämme 50-75 cm	0.90	7.50	65.—	0.70	5.50	50.—	0.45	3.75	32.50	
Fußstämme 30-50 cm	0.60	5.—	40.—	0.45	3.75	30.—	0.30	2.50	20.—	

ROSENSORTEN

Vorrätige Rosensorten

Erklärung der Zeichen vor der Preisgruppen-Nummer:

S = Schlingrosen, P = Polyantharosen, R = Remontanrosen, Rug = Rosa rugosa-Rosen,
T = Teerosen, TH = Teehybridrosen, L = Lutea (Pernetiana), M = Moosrosen, G = Garten- u. Parkrosen

Gattung	Preis- gruppe Nr.	Name und kurze Beschreibung
Schlingrosen		
S	6	Alberic Barbier, kanariengelb
S	6	American Pillar, Blume einfach, rosenrot mit weißer Mitte
P	6	Auguste Kordes, rankender Sport der bekannten Polyantharose „Joseph Guy“, sehr starkkrankend, winterhart, Blume gefüllt, feurig scharlachrot
S	6	Carmin Pillar, Blume einfach, leuchtend karminrot
TH	6	Climbing Chat. de Clos Vougeot, dunkelrot, schwärzlich schattiert
TH	6	Climbing Gen. Mac Arthur, leuchtend rot, hart, starkkrankend
T	6	Climbing Hillingdon, Sport von „Lady Hillingdon“, stark rankend, cadmiumgelb
TH	6	Climbing Ophelia, Sport von „Ophelia“, starkkrankend, zart fleischfarbig-weiß, zuweilen gelb schattiert
TH	6	Climbing Paul Lède, starkkrankender Sport von „Paul Lède“, intensiv safrangelb
L	6	Climbing Wilhelm Kordes, Sport der bekannten Sorte „Wilhelm Kordes“, kapuziner-braunrot auf goldgelbem Grund
S	6	Crimson Rambler, dunkelrot
S	6	Dorothy Perkins, kirschrosa
TH	6	Dr. Huey, neuere, sehr schöne Sorte, dunkelkarmesinrot
S	—	Düsterlohe (W. Kordes Söhne, Sparrieshoop 1931), vollständig winterharte Schlingrosenneuheit, starkkrankend, Belaubung gesund, rötlichgrün, im Vorsommer reich mit großen (bis zu 15 cm Durchmesser) einfachen, dunkelrosa Blumen bedeckt 1 Stück GM. 3.—, 10 Stück GM. 25.—, 100 Stück GM. 200.—
S	6	Excelsa, leuchtend dunkelblutrot
S	6	Frl. Oktavia Hesse, reinweiß auf gelbem Grund
T	6	Gloire de Dijon, gelb mit rosa schattiert
S	6	Hiawatha, Blume einfach, leuchtend blutrot mit weißer Mitte
S	—	Käte Schmid (W. Kordes Söhne, Sparrieshoop 1931, Züchter R. Vogel jun., Sangerhausen), verbesserte Tausendschön, starkwüchsig und gesund wie diese, in großen Dolden blühend, Farbe etwas dunkler als Tausendschön, aber in der Hitze nicht verblassend 1 Stück GM. 3.—, 10 Stück GM. 25.—, 100 Stück GM. 200.—
S	6	Paul's Scarlet Climber, leuchtend scharlachrot
S	6	Royal Scarlet Hybrid, die schönste der neueren roten Sorten, feurig scharlachrot
S	6	Rubin, rubinrot
S	6	Tausendschön, in großen, lockeren Dolden blühend, zartrosa
S	6	Veilchenblau, halbgefüllt, blauviolett
S	6	White Dorothy, reinweißer Sport von „Dorothy Perkins“
Polyantharosen		
Die mit einem M bezeichneten Sorten sind auch auf Rosa multiflora, die mit einem R bezeichneten Sorten auch auf Rosa rugosa veredelt lieferbar.		
P	7	Alice Amos, kräftigrosa

ROSENSORTEN

Gattung	Preis- gruppe Nr.	Name und kurze Beschreibung:
P	—	D. T. Poulsen (D. T. Poulsen, Kopenhagen 1930), auffallende, außerordentlich schöne rein blutrote Polyantha-Hybride, sehr starkwüchsig und widerstandsfähig, Blumen groß, in großen Dolden stehend und gut gefüllt, für Treiberei, Schnitt und Gruppen gleich gut geeignet. 1 Stück GM. 0.90, 10 Stück GM. 8.—, 100 Stück GM. 65.—
P	7 M	Eblouissant , feurig karminrot mit dunkler Schattierung
P	7 MR	Echo , leuchtendrosa
P	7 MR	Ellen Poulsen , kirschrosa
P	7	Else Poulsen , halbgefüllt, zartrosa, sehr starkwüchsig
P	7 M	Eva Teschendorff , reinweißer Sport der Sorte „Echo“
P	—	Feuerschein (M. Krause, Hasloh 1931), Sport der Sorte „Joseph Guy“, dieser ähnlich, jedoch etwas mehr Teehybridencharakter, auch in der Belaubung, wertvoll für Gruppen der reinen, leuchtendroten, nicht verblauenden Farbe halber 1 Stück GM. 0.55, 10 Stück GM. 5.—, 100 Stück GM. 45.—
P	—	Frau Astrid Späth (L. Späth, Berlin-Baumschulenweg 1930), großblumiger, leuchtend karminrosa Sport von „Joseph Guy“, Wuchs und Belaubung wie bei der Stammsorte, ebenso reichblühend wie diese, sehr wertvolle Neuheit 1 Stück GM. 1.—, 10 Stück GM. 9.—, 100 Stück GM. 75.—
P	7	Frau Rudolf Schmidt , feurigrot
P	M	Gloria Mundi , neuere Polyantharose von sehr auffallend., feurig-oranger Blütenfarbe, nicht verbrennend, groß und reichblumig 1 Stück GM. 0.45, 10 Stück GM. 4.—, 100 Stück GM. 35.—
P	7 MR	Goldlachs , lachsrosa, reichblühend
P	7 M	Gruß an Aachen , Knospe rötlich-orangefarbig mit gelblichem Schein, im Aufblühen weiß
P	7	J. F. Müller , dunkelroter Sport der Sorte „Rödhätte“, Farbe jedoch leuchtender feurigrot, nicht verblauend
P	2	Johanna Tantau , Blume gefüllt, haltbar, frischrosa, im Grunde gelblich, im Aufblühen in reinweiß übergehend
P	7	Joseph Guy , Sport der Sorte „Rödhätte“, mit etwas größeren und stärker gefüllten Blumen, leuchtend scharlachrot
P	7	Kirsten Poulsen , Blume ungefüllt, purpurrot, starkwüchsig
P	7 MR	Lady Reading , leuchtendroter Sport von „Ellen Poulsen“
P	—	Mrs. Olive Sackett (L. Späth, Berlin-Baumschulenweg 1931), leuchtendroter Sport von „Else Poulsen“, sehr großblumig, halbgefüllt, Unterseite der Blütenblätter leucht. karmin-kirschrot, Innenseite dunkelrosa, straff aufrechtwachsend, Belaubung im Austrieb broncefarbig und dadurch sehr wirkungsvoll 1 Stück GM. 2.25, 10 Stück GM. 18.—, 100 Stück GM. 150.—
P	7 MR	Miss Edith Cavell , dunkelrot
P	7	Nathalie Nypels , eine der schönsten Polyantharosen, von kräftigem Wuchs, Blume kräftig-groß
P	7 M	Orange Perfection , feurig-oranger, sehr reichblühend
P	7 MR	Orléansrose , kräftig-rosarot
P	7	Rödhätte , leuchtend kirschrot
P	7	Rudolf Kluis , rot
P	—	Senta Schmidt (Rudolf Schmidt, Rellingen 1930). Diese Sorte ist ein Sport von „Suzanne Turbat“. Der Wuchs ist niedrig, aber buschig und ganz gleichmäßig, so daß sich die Sorte besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen eignet. Die Blume ist von hübscher Form und sehr aparter, leuchtend gelblich-oranger Farbe, reichblühend wie die Stammsorte. 1 Stück GM. 1.—, 10 Stück GM. 9.—, 100 Stück GM. 80.—

ROSENSORTEN

Gattung	Preis- gruppe Nr.	Name und kurze Beschreibung
P	7	Suzanne Turbat , kupfrigrosa
P	7 MR	Teschendorff-Jubiläumsrose , zartrosa, Sport von Orleans-Rose, Blume sehr groß, vollgefüllt, reichblühend, wüchsig
P	7	Triomphe Orléanaïs , kirschrot
P	7 MR	Verdun , großblumig, in großen Dolden stehend, purpurkarminrot, nicht verblauend, besonders wertvoll für Treiberei
Tee-, Teehybrid-, Remontant- und Lutea- (Rosa Pernetiana) Rosen		
TH	1	Agnes Glover , samtig karmesinrot, kastanienbraun schattiert
TH	5	Amulett , [Math. Tantau, Uetersen 1930], gute neuere Treib-, Schnitt- und Gartenrose, Blume aufrechtstehend, starkgefüllt, feurigrot, im Verblühen auch die schöne Farbe behaltend, nicht verblauend
L	1	Angele Pernet , rötlich-orange mit chromgelb schattiert
TH	1	Annie Laurie , Sport von „Ophelia“, gelblichrosa
TH	1	Arabella , Sport von „Mad. C. Testout“, karminrosa
TH	1	Arthur Cook , dunkelpurpurkarminrot
TH	1	Aspirant Marcel Rouyer , aprikosenfarbig-gelb, groß, haltbar
TH	2	August Noack , Sport von „Columbia“, leuchtend scharlachrot ohne Nebenton, Blume sehr schön groß und von guter Form, erstklassige Treibsorte
TH	1	Betty Uprichard , außen lachsrosa, innen gelb-orange-rosa
TH	2	Briarcliff , verbesserte „Columbia“ mit bedeutend besseren, schöngestformten Blumen, dunkelrosa
TH	1	Capt. F. S. Harvey-Cant , lachsfarbig rosa auf gelbl. Grund
R	1	Captain Hayward , hellrot
TH	5	Cathrine Kordes , (W. Kordes' Söhne, Sparrieshoop 1930), Blume groß, auf kräftigen Stielen aufrechtstehend, gut geformt und gefüllt, leuchtend rubinrot mit sammetartig blutrot schattiert, Knospe spitz, feurig-blutrot, Belaubung gesund, dunkelgrün, sowohl für Schnitzzwecke als auch für Gruppenpflanzung sehr wertvoll
TH	2	Charles P. Kilham , glänzend orangerot, scharlachrot überhaucht
L	1	Cherry , Blume außen sonnenblumengelb, innen kräftig rosa
L	1	Christine , rein sattgoldgelb, schöne Gruppenrose
TH	1	Columbia , Blume groß, zartrosa, haltbar
TH	1	Covent Garden , Blume sehr groß, lebhaft dunkelrot
L	1	Cuba , kardinalrot, gelblich schattiert, sehr schön f. Gruppen
TH	2	Dame Edith Helen , Blume sehr groß, leuchtend reinrosa, sehr haltbar, stark und aufrecht wachsend
R	1	Duchess of Sutherland , rosa
TH	1	Earl Haig , leuchtend karminrot
TH	5	Edith Krause , (M. Krause, Hasloh 1930), Blume groß, gut gefüllt, spitz, aufrecht auf kräftigen Stielen stehend, reseda-weiß in der Art wie „Kaiserin Auguste Viktoria“, stark- und aufrechtwachsend
TH	2	Edith Nellie Perkins , Farbenrose, außen türkischrot, im Grunde orangegelb, innen lachsrosa und orange auf goldgelbem Grund

ROSENSORTEN

Gattung	Preis- gruppe Nr.	Name und kurze Beschreibung
L	—	Eduard Schill (W. Kordes' Söhne, Sparrieshoop 1931), Blume sehr groß, sehr gut gefüllt, haltbar und langstielig, ziegelbraunrot ohne Nebenton, Belaubung dunkelgrün, vollkommen gesund, sehr reichblühend, wird für Beetbepflanzung und Schnitt sehr empfohlen 1 Stück GM. 4. —, 10 Stück GM. 35. —, 100 Stück GM. 300. —
TH	4	E. G. Hill , wertvolle Schnitt- und Treibrose, Blume sehr groß, gut gefüllt, von schöner, dunkelkarminroter Farbe
TH	1	Elsie Beckwith , leuchtend rosa
L	1	Elvira Aramayo , herriotfarbige Gruppenrose mit aufrechtstehenden Blumen
TH	1	Empire Queen , glänzend kirschrot
TH	1	Etoile de Hollande , Blume edelgeformt, von sehr schöner, dunkelblutroter Farbe, stark duftend
R	1	Eugen Fürst , sammetartig dunkelrot
R	1	Fisher et Holmes , leuchtend scharlachrot
TH	2	Florex , korallenrosa mit orangekarmin
TH	2	Fontanelle , Blume sehr groß, starkgefüllt, haltbar, duftend, goldgelb, im Grunde orange
TH	1	Frank W. Dunlop , dunkelkarminrosa
TH	1	Franz Grümmer , leuchtend korallenrot
R	1	Frau Karl Druschki , sehr großblumig, reinweiß
TH	1	Freiburg II , pfirsichrosa, innen weißlichrosa
L	1	Gaiety , bräunlich zinnberrot, Innenseite der Petalen gelb
TH	5	Gartendirektor Nose (W. Kordes' Söhne, Sparrieshoop 1930) vorzügliche Gruppenrose und auch zum Schnitt, außerordentlich reichblühend während des ganzen Sommers, gleichmäßig und gedungen wachsend, Blume vollgefüllt, haltbar, duftend, rein blutrot
TH	1	General Mac Arthur , bekannte Sorte, leuchtend blutrot
TH	1	General Superior Arnold Janssen , karmin-orangerot
TH	1	Gloire de Hollande , dunkelrot, schwärzlich schattiert
L	1	Golden Emblem , reinzitronengelb mit roten Streifen an den äußeren Petalen
TH	1	Golden Ophelia , Blume sehr schön geformt, reingoldgelb
TH	2	Gruß an Coburg , Blume außen gelblich-braun, zuweilen bräunlichrot, innen goldgelb, aparte Farbenrose
TH	1	Gruß an Teplitz , für Gruppen sehr geeignete Sorte von kräftigem Wuchs, gesund, leuchtendrot
TH	1	Hadley-Rose , Blume sehr groß, schön geformt, dunkelrot, schwärzlich schattiert
TH	1	H. C. Valetton , goldgelb, sehr großblumig
R	1	Heinrich Münch , mattrosa
TH	1	Heinrich Eggers , für Treiberei und Schnitt, Blume ziemlich groß, gutgefüllt, von schöner Form, auf langen, steifen Stielen stehend, gelblichorangerosa
L	5	Heinrich Wendland , schöne Farbenrose, Blume groß, dicht gefüllt, aufrecht auf langen, kräftigen Stielen stehend, haltbar, an der Außenseite der Petalen leuchtend goldgelb, innen kapuzinerbraunrot, starkwüchsig, gesund
TH	5	Hermann Eggers , (W. Kordes' Söhne, Sparrieshoop 1930), hervorragende, neue Treibsorte, hervorgegangen aus „Florex“ und einem leuchtendroten, unbekannten Sämling, von sehr gutem Wuchs wie die Stammsorte, Blume sehr groß, dichtgefüllt, haltbar, auf langen, steifen Stielen aufrechtstehend, leuchtendrot ohne Nebenton, nie verbrennend oder verblassend, auch als Garten- und Freilandschnittrose wertvoll

ROSENSORTEN

Gattung	Preis- gruppe Nr.	Name und kurze Beschreibung
TH	2	Hermann Lindecke , Sport von Gen. Sup. A. Janssen, winterhart, sehr reichblühend. Die Blume ist groß, ganz besonders schön geformt, außen lachsrosa, innen weißlich
TH	1	Hermann Neuhoft , in der Art wie Gen. Sup. A. Janssen, jedoch dunkelrot, schwärzlich schattiert
L	—	Hinrich Gaede , [W. Kordes' Söhne, Sparrieshoop 1931], neue Farbenrose, sehr gut gefüllt, duftend, bräunlich-orangegelb, als Schnitt- und Gartenrose und auch besonders für Treiberei empfohlen 1 Stück GM. 4. —, 10 Stück GM. 35. —, 100 Stück GM. 300. —
R	1	Hugh Dickson , leuchtend feurigrot
TH	1	Imperial Potentate , leuchtend rosenrot
TH	1	Ivy May , Sämling von „Mad. Butterfly“, rosa, im Grunde bernsteingelb
L	1	J. Zingari , orange- und scharlachrot, reichbl. Gartenrose
TH	3	Joanna Hill , Blume groß, gefüllt, haltbar, meist einzeln auf auf kräftigem Stiel stehend, in der Mitte kräftig gelb, außen heller werdend, stark- und aufrechtwachsend
TH	1	Johan C. M. Mensing , Sport von „Ophelia“, zartrosa
TH	3	Johanniszauber , dunkelblutrot, haltbar, nicht verblauend
TH	1	John Henry , leuchtend scharlachrosa
TH	1	Jonkher J. L. Mock , Blume sehr groß, dunkelrosa, innen silbrigweiß
L	2	Julien Potin , erstklassige Schnittrose, Blume groß, von sehr guter Form, rein zitronenchromgelb, auf kräftigen Stielen aufrecht stehend
TH	1	Kaiserin Auguste Viktoria , bekannte schöne Sorte, Blume sehr edel geformt, festgefüllt, weiß auf grünlichgelbem Grund
TH	1	Kardinal Schulte , karminrot, feurigrot schattiert
TH	1	Killarney rosa , fleischfarbigrosa, weiß und blaßrosa angehaucht
TH	1	Killarney weiß , reinweiß
TH	1	K. of K. , sehr schöne Gruppenrose, halbgefüllt, durch die leucht. sammetartig scharlachrote Farbe sehr wirkungsvoll
TH	1	Lady Florence Stronge , Farbenrose, krebsrot bis altviolett-rosa, goldgelb schattiert
L	3	Lady Forteviot , Blume groß, duftend, goldgelb, rötlich aprikosenfarbig schattiert, reichblühend, starkwüchsig
T	1	Lady Hillingdon , dunkelorangegelb, starkwüchsig und gesund
TH	1	Lady Inchequin , leuchtend kirschrot mit orange schattiert
L	1	Lady Margret Stewart , von eigenartiger, leuchtender Farbe, sonnenblumengelb, orangescharlachrot geadert und gefleckt
TH	1	La France , alte bekannte Sorte, silbrigrosa, köstlich duftend
TH	1	Laurent Carle , Blume groß, stark duftend, dunkelkarmin- bis blutrot, aufrecht wachsend, buschige, gesunde Belaubung
TH	1	Lord Charlemont , schöngeformte, große Blume, leuchtend karminrot
L	1	Los Angeles , korallrot mit goldgelb schattiert
L	1	Louise Catherine Breslau , kupfrig-rotgelb
TH	5	Louise Krause , (M. Krause, Hasloh 1930), großblumig, starkgefüllt und edelgeformt, haltbar, im Grunde rötlich-orange, in hellgelb übergehend, starkwüchsig, wertvolle neue Sorte
TH	1	Mme. Abel Chatenay , karminrosa, gelblich getönt
TH	1	Mme. Butterfly , Sport von „Ophelia“, sehr wertvolle Sorte für alle Zwecke, Farbe etwas mehr kupfrig-orange als bei der Stammsorte
TH	1	Mme. Caroline Testout , bekannte Sorte, sehr groß, reinrosa
L	1	Mme. Edouard Herriot , Gruppenrose, kupfrig- bis tangorot

ROSENSORTEN

Gattung	Preis- gruppe Nr.	Name und kurze Beschreibung
L	2	Mme. Henri Queuille , Blume groß, lebhaft krebsrot mit dunkler Mitte, feurigrot schattiert, mit goldigem Schein, duftend
TH	1	Mme. Jules Bouché , kräftig und aufrecht wachsend, weiß mit lachsfarbig schattiert
TH	1	Mme. Leon Guinotte , hellrosa, orangegelb schattiert
R	1	Mme. Viktor Verdier , kirschrot
TH	2	Marcia Stanhope , Blume groß, gefüllt, gutgeformt, haltbar, blendend reinweiß
T	3	Maréchal Niel , bekannte Sorte, sehr edle Form, köstlich duftend, rein mattgelb
TH	1	Margaret Dickson Hamil , dunkel-orangegelb
TH	1	Margaret M'Gredy , Gruppensorte, geranienlackrot mit scharlach-orange
TH	5	Margarete Gnau (M. Krause, Hasloh 1930), schöne, neue Sorte für Gruppen und Schnitt, Blume sehr groß, stark gefüllt, von edler Form, fleischfarbig weiß auf gelbem Grund, zuweilen etwas kräftiger getönt, sehr stark- und aufrecht-wachsend
TH	1	Maud Cuming , pfirsich- und korallrosa
TH	—	Max Krause (M. Krause, Hasloh 1930), sehr schöne Neuheit für alle Zwecke. Blume sehr groß, starkgefüllt, von edler, spitzer Form, einzelnstehend, rötlich orangegelb, beim Aufblühen in goldgelb übergehend, sehr leuchtende Farbe, stark und aufrecht wachsend 1 Stück GM. 0.80 10 Stück GM. 7.— 100 St. GM. 65.—
TH	1	Mevrouw G. A. van Rossem , Farbenrose, dunkelorangegelb, bronzefarbig schattiert und gefleckt auf goldgelbem Grund, auf der Rückseite der Petalen bräunlichrot mit kirschrot geädert
TH	1	Miß C. E. van Rossem , hervorragend schöne Gruppensorte, reichblühend, leuchtend dunkelrot
TH	2	Mrs. A. R. Barraclough , leuchtend karminrosa auf gelbem Grund
TH	1	Mrs. Charles Lamplough , sehr empfehlenswert für alle Zwecke, Blume sehr groß, milchweiß, von besonders edler Form
TH	1	Mrs. Charles Russell , kräftig karminrosarot, wegen der großen Haltbarkeit empfehlenswerte Schnittrose
TH	2	Mrs. F. R. Pierson , Treibsorte, Blume sehr groß, edel geformt, duftend, haltbar, feurig-karminrot, Wuchs sehr stark, aufrecht
TH	1	Mrs. George Shawyer , Blume sehr groß, hellrosa
TH	1	Mrs. Henry Bowles , korallenrosa, außerordentlich reichblühend
TH	1	Mrs. Henry Morse , Blume groß, glänzend rosa mit zinnoberrot schattiert, Außenseite etwas kräftiger gefärbt
TH	1	Mrs. Henry Winnet , hervorragende Rose für Schnitt und Treiberei, Blume besonders gut geformt, langstielig, sehr haltbar, duftend, leuchtend scharlachrot
R	1	Mrs. John Laing , seidenartig reinrosa
L	1	Mrs. Redford , orangegelb, sehr wirkungsvolle Farbenrose
TH	5	Mrs. Sam. Mc Gredy , schöne, neue Farbenrose, scharlach-kupfrig-orange, an der Außenseite der Petalen rot schattiert, großblumig, gut gefüllt und schöngeformt, auf langen, festen Stielen stehend, für alle Zwecke zu empfehlen
L	1	Mrs. Wemys Quin , rein sonnengelb, wüchsig, reichblühend
TH	1	Mrs. William C. Egan , Blume groß, haltbar, silbrigrosa auf goldgelbem Grund, außerordentlich reichblühend

ROSENSORTEN

Gattung	Preis- gruppe Nr.	Name und kurze Beschreibung
TH	1	Norman Lambert , außen dunkelbutterblumengelb, innen dunkelorangelschwarzfarbig mit bronzegebelt
TH	1	Ophelia , sehr empfehlenswerte Sorte von hochedler Form, sehr reichblühend, fleischfarbig-gelblichweiß
R	1	Paul Neyron , Blume außerordentlich groß, reinrosa
TH	1	Pink Pearl , Blume ziemlich groß, sehr haltbar, langstielig, lebhaft rosa auf gelblich-lachsartigem Grund
TH	1	Pius XI , rahmweiß, Blume groß, gefüllt, auf langen Stielen einzeln stehend
TH	2	Professor Gnau , besonders geeignet für Schnitt und Treiberei, Blume gut gefüllt, stark duftend, mattgelb, im Aufblühen in rahmweiß übergehend
TH	2	Rapture , Sport von „Mme. Butterfly“, Blume besser gefüllt als bei der Stammsorte, duftend, von sehr edler Form, aprikosenkorallenfarbig mit rosa und goldgelb vermischt. Für alle Zwecke hervorragend geeignet
TH	1	Red Columbia , sammetartig schwärzlichrot
TH	1	Red Letter Day , gute Gruppenrose, Blume halbgefüllt, leuchtend scharlachrot
L	1	Reverend F. Page Roberts , reichblühend, von gesundem, kräftigem Wuchs, goldorange, gute Gruppenrose
TH	1	Roselandia , verbesserte „Golden Ophelia“, größer und leuchtender in der Farbe als die Stammsorte, goldgelb
TH	5	Rudolf Alexander Schröder (W. Kordes' Söhne, Sparrieshoop 1930), Kreuzung von „Mad. Jules Bouche“ und „Kaiserin“, ebenso starkwüchsig wie Mad. Jules Bouche, doch sind die Blumen viel größer und gefüllter, reinweiß auf gelbem Grund, straff aufrecht auf langen Stielen
TH	1	Senator , sammetartig scharlachrot, schwärzlich schattiert
TH	1	Sensation , Blume sehr groß, gefüllt, schwärzlichrot
TH	1	Shot Silk , kirschrosa-lachsartig, orange und gelb schattiert
TH	1	Sir David Davis , leuchtend karmesinrot
L	1	Souvenir de Claudius Pernet , Blume groß, von guter Form, leuchtend reingelb
L	1	Souvenir de Georges Pernet , Blume sehr groß, haltbar, gut geformt, leuchtend korallrot, Wuchs sehr kräftig, gesund und reichblühend, schöne Gartenrose
TH	1	Souvenir de H. A. Verschuren , Blume sehr groß, gefüllt, einzeln auf langen, steifen Stielen stehend, köstlich duftend, cadmiumgelb, in orange gelb übergehend
L	4	Talisman , auffallende Farbenrose, langstielig, sehr haltbar, die Blütenfarbe ist ein Gemisch von goldgelb und kupfer, scharlachrot getönt, Wuchs außerordentlich kräftig, vollkommen gesund
L	1	The Queen Alexandra Rose , leuchtend hellrot, äußere Petale gelb, aparte Farbenrose
R	1	Ulrich Brunner fils , kirschrot
R	1	Van Houtte , dunkelfeuerrot
L	1	Ville de Paris , Blume groß, genügend gefüllt, rein goldgelb
TH	4	W. E. Chaplin , verbesserte „Lord Charlemont“, Blume groß, vollgefüllt, haltbar, auf sehr langem, starkem Stiel aufrecht stehend, leuchtend rot, nie verbrennend oder verblauend, sehr starkwüchsig und vollkommen gesund, hervorragend für Schnitt und Treiberei, auch als Gartenrose
L	1	Wilhelm Kordes , auffallende Farbenrose, kapuzinerbraunrot, auf goldgelbem Grund, im Verblühen in goldgelb mit rotgestreift übergehend

ROSENSORTEN

Gattung	Preis- gruppe Nr.	Name und kurze Beschreibung
Moos- und Parkrosen		
Aus Samen gezogene Wildrosen siehe Seite 34		
L	8	Austrian Yellow , leuchtend reingelb, gut gefüllt
M	8	Blanche Moreau , reinweiß, Bl. groß, gefüllt, sehr starkwüchsig
M	8	Captain John Ingram , Blume mittelgroß, schwärzlichrot, reichblühend, starkwüchsig
M	8	Centifolia muscosa , Blume mittelgroß bis klein, kräftigrosa, reichblühend
M	8	Cristata , Blume groß, tiefrosa, Wuchs mittelhoch, buschig
Rug.		Dr. Eckener , (V. Berger - Teschendorff 1930), vollkommen winterharte Rugosahybride, starkwüchsig und unerhört reichblühend, die große Blume erscheint bereits im Frühjahr, sattgelb, mit orange durchzogen 1 Stück GM. 0.80, 10 Stück GM. 7.—, 100 Stück GM. 60.—
G	8	Fargesii , Belaubung tiefdunkelgrün, Triebe braunrot, Blume einfach, becherförmig, samtig dunkelkarminrot, die altgoldenen farbigen Staubfäden bilden einen sehr zierenden Kranz
Rug.	8	F. J. Grootendorst , Blume nelkenähnlich, leuchtendrot
L	8	Harrisoni , Blume gefüllt, goldgelb, reichblühend
R	8	J. B. Clerk , Blume groß, dunkelrot, sehr starkwüchsig
L	8	Juliet , Farbenrose, außen goldgelb, innen kapuzinerrot
Rug.	8	Konrad Ferdinand Meyer , Blume groß, duftend, schön geformt, silbrigrosa, starkwüchsig und reichblühend
L	8	Lutea bicolor , Blume einfach, außen gelb, innen kapuzinerrot
G	8	Moyesii , Blume einfach, ca. 8 cm Durchmesser, tiefscharlachrot, reichblühend
Rug.	8	Nowa Zembla , reinweißer Sport von „Konrad Ferdinand Meyer“ und dieser ähnlich, jedoch sind die Blumen etwas kleiner
L	8	Persian Yellow , Blume groß, gefüllt, reingelb
G	8	pimpinellifolia xanthina , sehr widerstandsfähige Art, Blume einfach, groß, leuchtend dunkelgelb, reichblühend
G	8	rubiginosa Bradwardine , reichblühend, lebhaft rosa
G	8	rubiginosa Lady Penzance , Blume einfach, kupfriggelb, für sonnigen Standort
G	8	rubiginosa magnifica , Blume groß, halbgefüllt, leuchtendrot, vollkommen mit Blumen übersät, starkwüchsig
G	8	rubiginosa Refulgence , sehr großblumig, halbgefüllt, leuchtend blutrot, wüchsig, reichblühend
M	8	Salet , Blume groß, gefüllt, rosa, remontierend
G	8	setigera , reichblühender, hochklimmender Strauch, Blume groß, rosenrot
G	5	Stämmeler (M. Tantau, Uetersen 1930), winterharte Parkrose von aufrechtem, gesundem Wuchs, Blume groß, erinnert an „La France“, jedoch von intensiverem, leuchtendem Rosa
Rug	8	Stern von Prag , Wuchs wie „Konrad Ferd. Meyer“, Blume groß, gefüllt, samtig schwärzlichrot
G	8	Theano , effektvoll sowohl als Einzelpflanze wie für Gruppen, Blumen klein, gefüllt, leuchtend rosa, die ganze Pflanze reich bedeckend, haltbar
G	5	Urhd (M. Tantau, Uetersen 1930), winterharte Parkrose, wenig remontierend, gesund und wüchsig, Blume starkgefüllt, gut duftend, mattsrosa

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Acer palm. dissectum viridis , wie vorige Art, jedoch grünblättrig	60—80	5.—	45.—	—
platanoïdes , Spitzahorn, Heister $\frac{0}{00}$ 150.—	80—100	6.50	60.—	—
" $\frac{0}{00}$ 250.—	125—175	0.30	2.50	20.—
plat. Schwedleri , im Austrieb blutrot, in dunkelolivgrün übergehend	175—250	0.40	3.50	30.—
pseudoplatanus , Heister $\frac{0}{00}$ 150.—	150—200	0.90	8.50	80.—
Weiß- od. Bergahorn, " $\frac{0}{00}$ 250.—	200—250	1.20	11.—	100.—
pseudopl. purpurescens , Blätter unterseits purpurviolett gefärbt	125—175	0.30	2.50	20.—
tatar. aidzuense , i. d. Art wie A. Ginnala, jed. dunkl. grün, Früchte leuchtendrot, sehr dekor.	175—250	0.40	3.50	30.—
Actinidia polygama , spitzblättr. Strahlengriffel, siehe Seite 00	150—200	0.50	4.50	40.—
Aesculus hippocastanum , Roßkastanie	200—300	0.65	6.—	55.—
Heister $\frac{0}{00}$ 180.—	60—80	0.30	2.50	20.—
" $\frac{0}{00}$ 360.—	100—140	0.50	4.50	40.—
" $\frac{0}{00}$ 720.—	140—180	0.90	8.50	80.—
" $\frac{0}{00}$ 1100.—	180—200	1.30	12.50	120.—
parviflora (macrostachya) , mittelhoher, buschiger Strauch, weiß- u. reichblühend	60—80	1.50	13.—	—
rubicunda , rotblühende Kastanie	100—150	1.65	15.—	—
Ailanthus glandulosa , Götterbaum, sehr starkwüchsig, Blätter stark gefiedert, Blüten in großen Dolden, gelblichweiß	125—175	0.60	5.50	50.—
Alnus , Erle				
glutinosa , Roterle Heister	200—300	0.35	3.—	25.—
glutinosa crispa , Blätter fiederlappig und gekraust	150—175	0.80	7.—	—
glutinosa imperialis , Blätter sehr zierlich, fiederlappig	175—200	1.—	9.—	—
glutinosa incisa , kleinblättriger Strauch	200—250	1.70	15.—	—
incana , Weißerle Heister	175—200	1.—	9.—	—
incana laciniata , sehr schöne, geschlitztblättrige, raschwüchsig Erle	200—250	1.70	15.—	—
Amelanchier , Felsenbirne	200—300	0.35	3.—	25.—
Botryapium , starkwüchsig, mit schönen weißen Blütentrauben, schöne Herbstfärbung, Büsche aus halbweitem Stand	150—200	0.70	6.—	—
rotundifolia , Blätter unterseits silbrigweiß, wollig, Blütentrauben weiß	200—250	1.—	9.—	—
spicata , blüht in großen, weißen Trauben	70—100	0.35	3.—	25.—
Amorpha fruticosa , Bastardindigo, mit hübsch gefiederter Belaubung und langen, violettblauen Blütenrispen	80—120	0.35	3.—	25.—
Ampelopsis , Wilder Wein, siehe Seite 39	125—175	0.35	3.—	25.—
Aristolochia Siphon , Pfeifenstrauch				
siehe Seite 39				
Andromeda floribunda , immergrün. Strauch mit lederartigen, länglichen Blättern, auch für Halbschatten geeignet, blüht in großen, weißen Rispen	40—60	2.75	26.—	250.—
japonica , immergrüner, kompakter Strauch, mit schönen, weißen, etwas überhängenden Blütenähren	40—60	2.25	21.—	200.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Aronia floribunda , Apfelbeere, blüht in weißen Dolden, schöne Herbstfärbung	40—60	0.35	3.—	25.—
Artemisia abrotanum , Beifuß, aromatischer Strauch mit aschgrüner, zierlich gefiederter Belaubung	70—100	0.35	3.—	25.—
Aucuba japonica , Aukube, immergrün, mit gelbbunt gefleckten Blättern	40—60 60—80	2.25 3.30	21.— 31.—	200.— 300.—
Azalea , Azalee, Felsenstrauch				
japonica , niedrig bleibende, schön blühende Form in verschiedenen Sorten u. Farben	25—40	2.75	26.—	250.—
mollis , im zeitigen Frühjahr sehr reich in roten, orangeroten u. gelben Schattierungen blühend, mit gutem Knospenbesatz	25—30 30—40 40—50 50—60	1.40 1.60 2.25 3.—	13.— 15.— 21.— 28.—	120.— 140.— 200.— 275.—
mollis-Hybriden , in veredelten Sorten und versch. Farben, mit gutem Knospenbesatz	30—40 40—50	2.20 2.75	21.— 26.—	200.— 250.—
pontica-Hybriden , pontische Azalee, veredelte Sorten, in vielen schönen Farben, mit gutem Knospenbesatz	30—40 40—60	2.20 2.75	21.— 26.—	200.— 250.—
Berberis , Berberitze				
aggregata , klein. Strauch, ähnlich <i>B. buxifol.</i> , Früchte durchscheinend gelblichweiß	60—80	0.35	3.—	25.—
brevipaniculata , aufrecht u. dichtwachsend, Zweige leuchtend rot, Früchte rosa	60—80	0.35	3.—	25.—
buxifolia (dulcis) nana , niedriger, immergrüner Strauch mit rotbraunen Zweigen, für immergr. Einfassungen	15—20 20—30	0.25 0.30	2.— 2.75	18.— 23.—
sehr geeignet				200.—
Darwini , immergrün, Blätter oberseits dunkelgrün, unterseits hellgrün	20—30	1.10	10.—	—
dictiophylla , Zweige kantig, bläulichweiß bereift, Früchte korallrot, Belaubung im Herbst schön gefärbt, haftet lange	—	0.65	6.—	—
Neuberti , halbbimmergrün, Blätter groß, lederartig, graugrün, teils gefiedert	40—60	0.90	8.—	—
sinensis , Belaubung tiefgrün, Zweige etwas kantig, tiefpurpurrot	40—60	0.60	5.50	—
stenophylla , immergrün, von überhängendem Wuchs, Blätter schmal, dunkelgrün, gelb- und reichblühend	40—60 60—80	0.90 1.50	8.50 14.—	80.— 130.—
Thunbergi , Strauch von niedrig., dichtverzweigt, Wuchs, schöne Herbstfärbg., Früchte korallrot	30—40 40—60 60—80	0.30 0.35 0.40	2.50 3.— 3.50	20.— 25.— 30.—
Büsche aus halbweitem Stand	40—70	0.30	2.50	18.—
Thunbergi atropurpurea , Belaubung tiefbraunrot, sehr schöne, harte, rotbelaubte Zier- und Heckenpflanze	30—40 40—60	0.70 0.85	6.50 8.—	60.— 75.—
vulgaris , gemeine Berberitze	70—100	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweitem Stand	40—70 70—100	0.20 0.25	1.50 2.—	12.— 17.—
vulg. atropurp. , Blutberberitze, Belaubung dunkelrot	40—60 60—80 80—100	0.30 0.35 0.40	2.50 3.— 3.50	20.— 25.— 30.—
Büsche aus halbweitem Stand	50—80	0.30	2.50	18.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Betula, Birke				
alba , Moorbirke, 0/00 180.—	100—150	0.30	2.50	20.—
aufrecht wachsend 0/00 360.—	150—200	0.50	4.50	40.—
0/00 600.—	200—250	0.80	7.50	70.—
0/00 800.—	250—300	1.—	9.50	90.—
	300—400	1.65	16.—	150.—
alba atropurpurea , Blutbirke, Belaubung	100—150	2.—	19.—	180.—
dunkelpurpurrot	150—200	3.50	32.—	—
	200—250	4.50	42.—	—
alba fastigiata , schnellwüchsige Birke von	150—200	2.50	22.—	—
säulenförmigem, fast pyramidalem Wuchs	200—250	3.30	30.—	—
	250—300	4.50	40.—	—
alba laciniata , geschlitztblättrige, sehr	150—200	2.75	25.—	—
hübsche Birke	200—250	3.30	30.—	—
	250—300	4.50	40.—	—
alba pendula Youngi , siehe Seite 52				
papyracea (papyfera) Papierbirke von				
schlankem Wuchs, mit blendend- 0/00 360.—	150—200	0.50	4.50	40.—
weißer Rinde und braunroten 0/00 600.—	200—250	0.80	7.50	70.—
Aesten, sehr großblättrig 0/00 800.—	250—300	1.—	9.50	90.—
	300—400	1.65	16.—	150.—
verrucosa , Hänge-Weiß-Birke 0/00 225.—	100—150	0.35	3.—	25.—
mit rauh-rindigen Zweigen, die 0/00 450.—	150—200	0.60	5.50	50.—
bei älteren Bäumen leicht über- 0/00 750.—	200—250	1.—	9.—	85.—
hängen 0/00 1000.—	250—300	1.25	12.—	110.—
	300—400	2.—	18.—	175.—
Buddleia, Buddleie				
Lindleyana , Blütenrispen lang, lila . . .	100—150	0.45	4.—	35.—
variabilis (Davidii) lila, gelbschlundig,				
Blütenrispen 30—40 cm lang	100—150	0.45	4.—	35.—
var. magnifica , violett-purpur mit orange-				
farbenem Schlund	100—150	0.45	4.—	35.—
var. Veitchiana , rosalila mit dunkelgelbem				
Schlund	100—150	0.45	4.—	35.—
Buxus, Buchsbaum , siehe Seite 54/55				
Calycanthus floridus , Gewürzstrauch,	40—60	1.25	11.—	—
Blüten rotbraun mit starkem, erdbeer-	60—80	1.65	15.—	—
artigem Geruch	80—100	2.—	18.—	—
Caragana arborescens , Erbsenstrauch,				
baumartiger Strauch, Blätter feingefiedert,				
im Mai blühend	130—180	0.35	3.—	25.—
arborescens pendula , Trauererbsenbaum,				
siehe Seite 52				
Carpinus, Weiß- oder Hainbuche				
betulus , geschnittene, vollgarnierte Pyra-				
miden, mit festen Ballen	250—300	5.50	52.—	—
(Heckenpflanzen siehe Seite 41)	300—350	7.50	70.—	—
betulus pyramidalis , Pyramidenweiß-	75—100	1.—	9.—	85.—
buche, Wuchs sehr schön straffpyramidal	100—125	1.10	10.50	100.—
	125—150	1.40	13.—	125.—
	150—175	2.—	19.—	180.—
	175—200	2.75	26.—	250.—
	200—250	3.80	36.—	350.—
	250—300	5.50	52.—	500.—
	300—350	8.50	82.—	800.—
Castanea vesca , echte Kastanie, Marone	80—100	0.70	6.50	60.—
	100—150	1.—	9.—	85.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Catalpa, Trompetenbaum				
bignonioides (syringaeifolia), Blüte weiß, innen gelbgestreift und rotbraun punktiert	80—125	0.60	5.50	50.—
Kaempferi, Blüte blaßgelb, im Schlunde gelbgestreift und violett punktiert . . .	80—125	0.60	5.50	50.—
speciosa, große, weiße Blütendolden . . .	80—125	0.60	5.50	50.—
Ceanothus, Säckelblume , niedriger, schön- blühender Strauch, auch für Felsengärten				
americanus, weiß, sehr reichblühend . . .	40—60	0.45	4.—	35.—
azureus, blau, reichblühend	40—70	1.65	15.—	—
Hybriden in folgenden Sorten:				
Cérès, rosa, Georges Simon, rosa, Ibis rose, rosa, Marie Simon, rosa, Rose Carmin, karminrosa	40—70	1.65	15.—	—
Cercidiphyllum japonicum , Judasbaum- blatt, starkwüchsiger Parkbaum mit schöner Herbstfärbung	80—125 125—175	0.70 0.85	6.50 8.—	60.— 75.—
Chionanthus virgin. , Schneeflockenbaum, schöner Blütenstrauch, blüht im Juni in großen, weißen, lockeren Rispen	40—70	1.65	15.—	—
Clematis , siehe Seite 39				
Colutea arborescens , Blasenstrauch, von hohem Wuchs, mit gelblicher Blüte . . .	140—200	0.35	3.—	25.—
orientalis, Blüte braunrot, Belaubung blaugrün	—	0.55	5.—	—
Cornus, Hartriegel, Kornelkirsche				
alba, weißer Hartriegel, Zweige rotbraun, guter Deckstrauch ^{0/00} 225.—	125—175	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweisem Stand ^{0/00} 160.—	100—150	0.25	2.—	18.—
alba albo-marginata elegans, schöne, weiß- buntblättrige Form	60—80 80—130	0.45 0.55	4.— 5.—	35.— 45.—
alba argenteo-marginata, starkwüchsig, Blätter weißgerandet	80—100	0.50	4.50	40.—
alba flaviramea, gelbholzig, hebt sich im Winter schön von den rotholzigen Arten ab	80 120	0.40	3.50	30.—
alba Späthi, mit sehr schöner, gelbbunter Belaubung	70—125	0.55	5.—	45.—
mas, blüht im März goldgelb ^{0/00} 200.—	40—60	0.30	2.50	22.—
Früchte eßbar, für Hecken ^{0/00} 270.—	60—80	0.40	3.50	30.—
auch sehr gut geeignet ^{0/00} 360.—	80—100	0.50	4.50	40.—
^{0/00} 450.—	100—125	0.60	5.50	50.—
^{0/00} 550.—	150—175	0.70	6.50	60.—
^{0/00} 700.—	175—200	0.85	8.—	75.—
^{0/00} 100.—	40—60	0.20	1.75	13.—
Büsche aus halbweisem } ^{0/00} 150.—	60—80	0.25	2.—	18.—
Stand } ^{0/00} 200.—	80—100	0.30	2.50	22.—
^{0/00} 250.—	100—125	0.35	3.—	27.—
sanguinea , gewöhnliche Kornelkirsche, starkwüchsig, mit braunroten ^{0/00} 180.—	60—80	0.30	2.50	20.—
Zweigen, für Hecken gut ge- ^{0/00} 225.—	80—100	0.35	3.—	25.—
eignet ^{0/00} 250.—	100—125	0.40	3.50	28.—
^{0/00} 120.—	150—200	0.45	4.—	35.—
Büsche aus halbweisem } ^{0/00} 50—70	50—70	0.25	2.—	14.—
Stand } ^{0/00} 160.—	70—100	0.30	2.50	18.—
^{0/00} 200.—	100—130	0.35	2.70	22.—
tatarica sibirica , sehr dekorative Art mit korallrotem Holz	80—125	0.45	4.—	35.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten		Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Corylus, Haselnuß					
Avellana , gemeine Haselnuß	^{0/00} 225.—	60—80	0.35	3.—	25.—
	^{0/00} 270.—	80—100	0.40	3.50	30.—
	^{0/00} 320.—	100—125	0.45	4.—	35.—
		125—150	0.50	4.50	40.—
		150—200	0.55	5.—	45.—
Colurna , Baumhasel, schöner, pyramidal wachsender Baum mit weißgrauer, rauher, korkiger Stammrinde, Blätter groß, dunkelgrün					
		80—125	0.60	5.50	50.—
		125—175	0.70	6.50	60.—
		175—225	0.80	7.50	70.—
maxima atropurpurea , Bluthaselnuß, Belaubung beständig dunkelrot					
		60—80	1.20	11.—	100.—
		80—120	1.40	13.—	125.—
Hochstämme , Stammhöhe ca. 160 cm					
			3.—	28.—	—
Cotoneaster, Zwergmispel					
acutifolia , mit schöner, glänzender Belaubung und schwarzen Früchten		40—60	0.35	3.—	25.—
		60—80	0.45	4.—	35.—
applanata , starkwüchsige Art mit ovalen dunkelgrünen Blättern, unterseits weißfilzig, Früchte lebhaft rot		40—60	0.30	2.50	20.—
		60—80	0.40	3.50	30.—
		80—100	0.45	4.—	35.—
		100—125	0.50	4.50	40.—
		125—160	0.55	5.—	45.—
bullata , Blätter, groß, glänzend, unterseits mit einer hellgelblich-grauen Wolle bedeckt, Früchte lebhaft rot					
		80—130	0.35	3.—	25.—
		130—180	0.40	3.50	30.—
divaricata , kleinblättrig, oberseits glatt und tiefgrün, Früchte rot					
		40—60	0.30	2.50	20.—
		60—100	0.40	3.50	30.—
Franchetii , Belaubung grün, halbbimmergrün, unterseits gelblichfilzig, Früchte orangerot					
		40—60	0.40	3.50	30.—
		60—80	0.45	4.—	35.—
horizontalis , kl. Strauch von kriechendem Wuchs mit niederliegenden, halbbimmergrünen Zweigen, kleinblättrig, Breite					
		30—40	0.50	4.50	40.—
		40—60	0.60	5.50	50.—
		60—80	0.90	8.50	80.—
		80—100	1.65	15.—	—
		100—120	2.75	25.—	—
microphylla , Zwergstrauch mit niederliegenden Zweigen, fast immergrüner Belaubung und korallroten Beeren					
		30—40	0.80	7.50	70.—
moupinensis , Herbstfärbung besonders schön, schwarzfrüchtig					
		65—100	0.35	3.—	25.—
		120—150	0.45	4.—	35.—
Simonsii , Belaubung dunkelgrün, glänzend, halbbimmergrün, Früchte rot					
		40—60	0.30	2.50	20.—
		60—80	0.40	3.50	30.—
		80—100	0.50	4.50	40.—
Crataegus, Dorn					
coccinea , scharlachfrüchtiger Weißdorn	^{0/00} 300.—	60—80	0.45	4.—	35.—
	^{0/00} 400.—	80—100	0.55	5.—	45.—
		125—175	0.60	5.50	50.—
monogyna (oxyacantha) , Weißdorn	^{0/00} 135.—	75—100	0.25	2.—	15.—
	^{0/00} 160.—	100—125	0.30	2.50	18.—
	^{0/00} 225.—	125—150	0.35	3.—	25.—
	^{0/00} 270.—	150—200	0.40	3.50	30.—
		200—250	0.45	4.—	35.—
monogyna kermesina pl. , dunkelrotgefüllt blühender Rotdorn					
		100—125	0.60	5.50	50.—
		125—150	0.70	6.50	60.—
		150—175	0.85	8.—	75.—
		175—200	1.—	9.50	90.—
		200—250	1.35	13.—	120.—
			1.35	13.—	120.—
sanguinea , mit blutroten Früchten					
		100—150	0.45	4.—	35.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Cydonia, Quitte				
japonica, japanische Quitte, auch für Hecken sehr geeignet, blüht feuerrot	60—80	0.40	3.50	30.—
japonica alba, Blüte einfach, weiß	40—60	0.45	4.—	35.—
japonica Maulei, niedrig bleibend, leuchtend scharlachrot, auch vor- zügliche Heckenpflanze, } Büsche aus halbweitem Stand }	40—60 60—80 30—50 50—70	0.30 0.35 0.20 0.25	2.50 3.— 1.80 2.—	22.— 25.— 15.— 18.—
japonica umbilicata, Blüten hellrosa	40—60	0.45	4.—	35.—
Cytisus, Geißklee, Strauchgoldregen				
hirsutus, Blumen hellgelb, in braun übergeh.	75—100	0.35	3.—	25.—
Laburnum, siehe Laburnum vulgare				
nigricans, Blumen dottergelb	70—90	0.40	3.50	30.—
praecox, Zwergstrauch, auch für Steingärten, im Mai dicht m. lichtgelben, duftenden Blüten bedeckt	30—50	1.65	16.—	150.—
purpureus, Zwergstrauch, sehr reichblühend, tief karmin- bis purpurrosa	30—50	1.35	13.—	120.—
Daphne, Seidelbast				
cneorum, Rosmarinseidelbast, Zwergstrauch, bringt im Mai rosafarbene, stark duftende Blüten, für Steingärten	—	3.—	25.—	—
Mezereum rubrum, blüht sehr früh im Frühj. vor Austr. der Blätter, rotblühend	40—60 60—80	1.65 2.75	16.— 25.—	150.— —
Mezereum album, weißblühender Seidelbast	40—60 60—80	2.20 3.30	20.— 30.—	— —
Deutzia, Deutzie				
crenata candidissima, reinweiß gefüllt	100—150	0.35	3.—	25.—
„ Fortunei, reinweiß, reichblühend	80—120	0.35	3.—	25.—
„ macrosepala, großblumig, weiß	80—100	0.35	3.—	25.—
„ magnifica, von kräftigem Wuchs, Blumen reinweiß, gefüllt	100—150	0.35	3.—	25.—
crenata plena, rötlich gefüllt blühend	100—150 150—200	0.35 0.45	3.— 4.—	25.— 35.—
crenata Pride of Rochester, starkwüchsig, weißgefüllt blühend	100—150 150—200	0.35 0.45	3.— 4.—	25.— 35.—
crenata rosea pl., rosa gefüllt	100—150	0.35	3.—	25.—
discolor grandiflora, reichblühend, Knospen rot, Blüten rosaweiß	30—50	0.40	3.50	30.—
gracilis, niedriger, zierlicher Strauch, weißblühend, zum Treiben vorzüglich	30—40 40—60	0.45 0.50	4.— 5.00	35.— 40.—
gracilis rosea, rosablühende Form	40—60	0.45	4.—	35.—
hybrida Watereri, sehr großblum., reinweiß	100—150 150—200 100—150	0.35 0.45 0.35	3.— 4.— 3.—	25.— 35.— 25.—
hybrida Welsi, reinweiß gefüllt	100—150	0.35	3.—	25.—
Lemoinei Boule de neige, klein. Strauch, großblumig, gelblichweiß	50—70	0.45	4.—	35.—
Lemoinei compacta, niedriger Strauch, reinweiß, sehr reichblühend	50—70	0.45	4.—	35.—
scabra, reinweiß, großblättrig	100—130	0.35	3.—	25.—
Elaeagnus, Oelweide				
angustifolia, Blätter graugrün, schmalblättrig, Blüten gelblich, duftend	100—140	0.35	3.—	25.—
argentea, mittelhoher Strauch mit silbriger Belaubung, Blüten hellgelb	70—100 100—150	0.45 0.55	4.— 5.—	35.— 45.—
edulis, von niedrigem Wuchs, Blüten hellgelb, duftend, Früchte essbar	60—100	0.45	4.—	35.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Enkianthus campanulatus , Prachtglocke, in hängenden Dolden im Mai blühend, hellgelb, trübsüßig gezeichnet, Laub im Herbst schön rot gefärbt	60—80 80—120	5.50 7.—	50.— 65.—	— —
Erica (Calluna) , Heide, für Steingärten herbacea (carnea) , Schneeheide, im ze- tigen Frühjahr rosenrot blüh. $\frac{0}{100}$ 325.—	—	0.45	4.—	35.—
mediterranea , blüht März/April, lilarosa, herbacea , (im Frühjahr blühend) und vulgaris (ab August blühend), in verschie- denen Sorten und Farben	—	0.45	4.—	35.—
Evonymus , Spindelbaum europaea , Strauch von mittelstarkem Wuchs, mit zierenden roten Früchten	80—120 125—175	0.25 0.35	2.— 3.—	18.— 25.—
Büsche aus halbweisem Stand $\frac{0}{100}$ 160.—	100—150	0.25	2.—	18.—
radicans , niedriger Strauch für Steingärten und Einfassungen, grünblättrig	20—30	0.40	3.50	30.—
radicans arg. var. , weißbunte Form	20—30	0.40	3.50	30.—
radicans vegeta , von kriechendem Wuchs, Blätter rund, glänzend dunkelgrün, für Steingärten geeignet	40—60 60—80	0.85 1.20	8.— 11.—	75.— 100.—
Exochorda Alberti , Scheinfelsenbirne, schön belaubter, hoher Strauch, im Früh- jahr mit weißen Blütenrispen reich besetzt	60—100	1.25	11.—	—
Fagus , Rotbuche sylvatica , gewöhnliche Rotbuche, s. Seite 42				
„ pendula , Trauerbuche, s. Seite 52				
„ purpurea , rotblättrige, aus Samen gezügte Pflanzen, mit Ballen	80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—250 250—300	0.75 1.— 1.40 2.— 2.75 5.— 8.—	7.— 9.— 13.— 19.— 26.— 47.— 75.—	65.— 85.— 125.— 180.— 250.— 450.— 700.—
Hochstämme siehe Seite 49	100—125 125—150 150—175 175—200 200—250 250—300 300—350	1.65 2.20 3.30 4.50 8.— 15.— 25.—	16.— 21.— 31.— 42.— 75.— — —	150.— 200.— 300.— 400.— — — —
sylv. atropurpurea macrophylla , veredel- te Blutbuche, Blätter sehr groß, tief- dunkelrot, Pflanzen mit Ballen	100—125 125—150 150—175 175—200 200—250 250—300 300—350	1.65 2.20 3.30 4.50 8.— 15.— 25.—	16.— 21.— 31.— 42.— 75.— — —	150.— 200.— 300.— 400.— — — —
Hochstämme siehe Seite 49]				
sylv. atropurpurea pendula , Trauerblut- buche, siehe Seite 52				
Fontanesia phillyreoides , Fontanesie, schönbelaubter Strauch, in vielblütigen Rispen im Juni weißblühend	80—120	0.35	3.—	25.—
Forsythia , Forsythie, bekannter Frühlings- blütenstrauch intermedia , aufrechtwachsend, Blüten lichtgelb	80—150	0.40	3.50	30.—
intermedia densiflora , Wuchs sparrig, großblumig, hellgelb, reichblühend	70—100	0.40	3.50	30.—
intermedia spectabilis , außerordentlich reichblühend, dunkelgoldgelb	80—150	0.40	3.50	30.—
intermedia vitellina , von kräftigem, auf- rechtem Wuchs, dottergelb	80—150	0.40	3.50	30.—
suspensa , Zweige überhängend, hellgelb .	70—100	0.60	5.50	50.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Forsythia suspensa Fortunei , aufr. wachs., Zweige etwas überhängend, Blüten etwas dunkler als F. suspensa	80—150	0.55	5.—	45.—
suspensa Sieboldi , von kräftigem Wuchs, Zweige etwas überhängend, lichtgelb . . .	80—125	0.45	4.—	35.—
viridissima , aufrecht wachsender, höherer Strauch mit schöner Herbstfärbung, Blüten dunkelgelb	70—120	0.40	3.50	30.—
Halbstämme in Sorten Stammhöhe	100—110	2.20	20.—	—
Fraxinus, Esche				
excelsior , gemeine Esche . . . Heistern	150—200	0.25	2.—	15.—
	200—300	0.35	3.—	25.—
excelsior pendula , Traueresche, s. S. 53				
Ornus , gem. Blumenesche, blüht i. Mai in gro- ßen, weißen Rispen, schöne Herbstfärbung	125—175	0.45	4.—	35.—
	175—250	0.60	5.50	50.—
Fuchsia Riccartoniana, Fuchsia , niedriger, reichverzweigter Strauch, unaufföhrlich schön scharlachrot blühend	—	0.60	5.50	—
Genista, Ginster				
scoparia , gewöhnlicher Ginster, Mai bis Juni gelbbühend	—	0.35	3.—	25.—
tinctoria , bis meterhoher Strauch, sehr reichblühend, tiefgelb, im Sommer blüh. in veredelten Sorten, vorrätig:	70—125	0.45	4.—	35.—
praecox , lichtgelb, praecox alba , weiß, scop. alba dura , weiß, scop. alba rosea , weißlich rosa, scop. alba multiflora , weiß gefüllt, scop. Andreana , gelb mit braunen Flügeln, scop. Firefly , gelb mit scharlachroten Flügeln, scop. fl. alba , weiß, scop. Mayfly , gelb mit braunen Flügeln	30—50	1.65	15.—	—
Gleditschia triacanthos, Christudorn , hoher Strauch, Belaubung zierlich gefie- dert, stark und lang bedornt	100—150	0.40	3.50	30.—
	150—200	0.70	6.50	60.—
Hedera, Efeu , siehe Seite 40				
Hibiscus, Eibisch . Schöner Strauch für sonnige Lage, muß im Winter etwas ge- schützt werden, blüht von Juli an reich- lich und schön				
syriacus-Hybriden in folgenden Sorten:				
albus plenus , gefüllt, weiß, Admiral Dewey , gefüllt, weiß, ardens , gefüllt vi- olettrosa, Comte de Flandre , gefüllt, leuchtendrot, elegantissimus , halbgefüllt, rosaweiß, Jeanne d'Arc , gefüllt, weiß mit hellrosa, pulcherrimus , halbgefüllt, rosaweiß, puniceus plenus , halbgefüllt, dunkelrosa, ranunculiflorus albus ple- nus , gefüllt, weiß	60—80	1.—	9.50	90.—
Hippophae rhamnoides, Sanddorn , an- spruchsl. Strauch mit feinblättriger, sil- berglänzender Belaubung, im Herbst durch die orangefarb. Früchte sehr dekorativ	100—150	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweitem } 0/00 120.—	70—90	0.25	2.—	14.—
Stand } 0/00 160.—	90—150	0.30	2.50	18.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Hydrangea, Hortensie				
arborescens grandiflora, in sehr großen, weißen Dolden reichblühend, auch für Halbschatten geeignet	60—80	0.60	5.50	50.—
paniculata grandiflora, bekannte Gartenhortensie, sehr reich in langen, zunächst weißen, im Verblühen rosafarbigem Rispen blühend	40—60	0.30	2.50	20.—
Sträucher mit 3—5 Trieben	50—80	0.40	3.50	30.—
" " 5—8 "	70—90	0.50	4.50	40.—
" extra stark zum Treiben	60—80	0.90	8.50	80.—
Halbstämme, Stammhöhe	80—100	1.65	16.—	150.—
" "	100—120	2.20	21.—	200.—
Hypericum, Johannisstrauch, Hartheu				
calycinum, Zwergstrauch, kriechend, immergrün, Blüte groß, goldgelb, Juli—September	30—40	0.70	6.50	60.—
Moserianum, halbbimmergrün, bis 100 cm, Blüte groß, goldgelb, Juli—Oktober	30—50	0.70	6.50	60.—
patulum Henryi, bis 100 cm, Blüten groß, goldgelb, Juli—September	40—60	0.70	6.50	60.—
Ilex, Stechpalme, Hülse				
aquifolium, Blätter glänzend grün, stachelig, gedeiht auch noch gut im Schatten, im Winter durch die korallroten Beeren sehr dekorativ	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	2.75	26.—	250.—
	80—100	3.75	36.—	350.—
	100—125	5.50	52.—	500.—
	125—150	7.—	67.—	650.—
	150—175	9.—	85.—	800.—
	175—200	11.—	105.—	1000.—
aquifol. pyramidale (latifolia), besonders reich mit roten Beeren besetzte Art von aufrechtem, pyramidalem Wuchs	40—60	1.20	11.—	100.—
	60—80	2.75	26.—	250.—
	80—100	3.75	36.—	350.—
	100—125	5.50	52.—	500.—
	125—150	7.—	67.—	650.—
	150—175	9.—	85.—	800.—
	175—200	11.—	105.—	1000.—
Perado, starkwüchsige Art mit großen, lederartigen Blättern	60—80	3.—	29.—	280.—
	80—100	4.40	42.—	400.—
	100—125	6.—	57.—	550.—
	175—200	13.—	120.—	—
Gelbbuntblättriger Ilex	30—40	2.75	25.—	—
	40—50	3.50	32.—	—
Weißbuntblättriger Ilex	40—50	2.75	25.—	—
	50—60	3.50	32.—	—
Jasminum, echter Jasmin				
Beesianum, leicht schlingend, starkw. Str. mit leuchtend roten Blüten, Mai/Juni	40—60	0.90	8.50	80.—
nudiflorum, schlingend. Strauch, blüht gelb vor Erscheinen der Blätter	40—60	0.90	8.50	80.—
officinale, leicht schlingender Strauch, Blüten groß, weiß, duftend, im Sommer	40—60	0.90	8.50	80.—
Juglans regia, Walnuß, Heistern	100—150	0.90	8.50	80.—
	150—200	1.50	14.—	130.—
Kalmia latifolia, breitblättrige Kalmie mit lederartigen, immergrünen Blättern und schönen, rötlichen Blüten, Mai/Juni	40—50	3.75	35.—	—
	60—80	4.50	42.—	—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Kerria, Ranunkelstrauch				
japonica, mittelhoher Strauch, Blüten gelb, einfach, Mai/Juni	65—100	0.45	4.—	35.—
japonica fl. pl., gelbgefülltblühend	65—100	0.50	4.50	40.—
japonica fol. var., weißbuntblättrig	—	0.55	5.—	—
Laburnum, Goldregen				
alpinum, Alpengoldregen, blüht etwas später und hat bedeutend größere Blütentrauben als L. vulgare	70—100 100—150	0.40 0.50	3.50 4.50	30.— 40.—
vulgare, gemeiner Goldregen, Sträucher . .	100—150	0.30	2.50	20.—
"	150—200	0.35	3.—	25.—
"	200—250	0.40	3.50	32.—
Halbstämme	—	1.20	11.—	100.—
Hochstämme	—	3.30	31.—	300.—
Vossi, besonders lange, goldgelbe Blüten- trauben, reichblühend	125—175	1.20	11.—	100.—
Halbstämme	—	1.65	16.—	150.—
Hochstämme	—	4.—	37.—	350.—
Lespedeza, Buschklees				
bicolor, reichverzweigter, bis 1½ m hoher Strauch, Juli/September karminrot blüh. Sieboldii, (Desmodium penduliflorum), Blüten etwas mehr violett gefärbt als bei L. bicolor, ab September	80—120 80—120	0.60 0.60	5.50 5.50	50.— 50.—
Ligustrum, Liguster, Rainweide				
amurense, stark- und aufrechtwachsend . .	60—80	0.35	3.—	25.—
brachystachyum, Wuchs säulenförmig auf- recht, halbbimmergrün, sattgrüne Belau- bung in der Art wie Lig. oval	40—60 60—80	0.30 0.35	2.50 3.—	20.— 25.—
Ibota, starkwachsender Strauch mit schö- ner, grau-grüner Belaubung 1/100 180.—	40—60	0.30	2.50	20.—
ionandrum, neuerer, dichtwachs. Strauch mit kleinen, rundlichen, glänzend grünen Blättern 1/100 180.—	30—50	0.30	2.50	20.—
Lodense, immergrüner Zwergliguster, siehe Seite 42				
ovalifolium, großblättriger, halbbimmer- grüner Liguster, siehe Seite 42/43				
oval. aureo-elegantissimum, Blätter breit, leuchtend goldgelb gerandet	30—50	0.45	4.—	35.—
ovalifolium aureo-marginatum, hat gelb- gerandete Blätter	20—30	0.45	4.—	35.—
Regelianum, breitwachsender Strauch mit großen, hellgrünen Blättern	40—60 60—80	0.30 0.35	2.50 3.—	20.— 25.—
sinense, halbbimmergrün, reichblühend, Blätter groß, lebhaft grün	30—50	0.35	3.—	25.—
vulgare, gemeiner Liguster, siehe Seite 43				
vulg. atrovirens, immergrün, im Winter purpurbraun, siehe Seite 43	30—40 40—60	0.40 0.50	3.50 4.50	30.— 40.—
Liquidambar styraciflua, Amberbaum, hoher Strauch, Belaubung spitzlappig, sattgrün, im Herbst dunkelrot	70—100	1.—	9.—	—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, großer Baum mit sehr großen, lebhaft grünen Blättern, Blüte tulpenartig, gelb- lichgrün, außen orangefarbig gezeichnet	100—120	3.—	—	—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Lonicera, Heckenkirsche				
alpigena, schwachwüchsig, bis 2 m, Blätter groß, glänzend grün, Blüte braun- rot, Früchte groß, glänzend rot	40—60	0.80	7.—	—
amoena alba, schöne, weißblüh. Hybride	100—150	0.40	3.50	30.—
Caprifolium, siehe Seite 40				
coerulea, niedriger, breitbuschiger Strauch, Blüte hellgelb, Früchte blaubereift, längl.	60—90	0.50	4.50	40.—
Ledebouri, aufrechtwachsender Strauch, mit dunkler Belaubung, Blüte braun . . .	80—125	0.45	4.—	35.—
Morrowii, Zweige überhängend, Blätter dunkelgrün, unterseits graugrün, Blüten weißlichgelb, Früchte dunkelrot	80—150	0.35	3.—	25.—
pileata, niedriger, breitverzweigt., immer- grüner Strauch, Blüten blaßgelb, Früchte durchscheinend violett, Breite	20—30 30—40 60—100	0.60 0.85 2.—	5.50 8.— 18.—	50.— 75.— —
Ruprechtiana, bis 2½ m hoch, Blüten gelblichweiß, Beeren orangerot	100—150	0.35	3.—	25.—
tatarica, starkwüchsig, Blüten hellrosa, Früchte lebhaft rot, Schattenstrauch . .	100—150	0.35	3.—	25.—
tat. rosea grandiflora, großblumige Art, hellrosa, reichblühend	100—150	0.35	3.—	25.—
Xylosteum, gemeine Heckenkirsche, guter Schattenstrauch, mittelstark, auch für Hecken, Blüte gelblichweiß, trägt dicke, rote Beeren	70—100 80—120	0.35 0.25	3.— 2.—	25.— 18.—
Büsche aus halbweitem Stand ⅓ 160.—				
Lycium halimifolium (europaeum), Bocks- dorn, auch für Hecken sehr gut geeignet, Zweige überhängend, blüht gelbviolett . .	100—150	0.35	3.—	25.—
Magnolia, Magnolie, Biberbaum				
Soulangeana, schöner Solitärbaum, im zei- tigen Frühjahr vor Austrieb der Blätter mit großen, weißen, rotgezeichnet., tulpen- artigen Blüten übersät	60—80 80—100 100—125 125—150	8.— 9.— 11.— 14.—	70.— 80.— 100.— 135.—	— — — —
rustica fl. rubra, rotblühend	80—100 100—125	9.— 11.—	80.— 100.—	— —
stellata, sternblütige Magnolie, weißblü- hender, niedriger Strauch	60—80	11.—	100.—	—
Mahonia aquifolium, Mahonie, kleiner Strauch mit glänzend dunkelgrüner, immer- grüner Belaubung, siehe Seite 45				
japonica, immergrüner Strauch mit bis 30 cm langen, gezähnten, gefiederten, hell- grünen Blättern	40—60	1.20	11.—	—
Malus, Zierapfel, Kirschapfel, sehr schöne Blütenstr., reichblühend mit außerordent- lich zierenden Früchten				
in Sorten meiner Wahl	100—150	0.55	5.—	45.—
bacc. fructu flavo, gelbfrüchtig	100—150	0.70	6.50	60.—
bacc. fructu maximo, große, scharlachrote Früchte	100—150	0.70	6.50	60.—
bacc. The Fairy, die Früchte haften bis weit in den Winter hinein	100—150	0.70	6.50	60.—

Z I E R G E H Ö L Z E

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Malus Eleyi , wertvolle Neuheit, im Austrieb dunkelrot, Farbe bis z. Winter beständig, Blüte lebhaft weinrot, im Herbst über und über mit kleinen, purpurroten Aepfelchen bedeckt	100—150	0.70	6.50	60.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 100	1.65	16.—	150.—
Exzellenz Thiel , Trauerapfel, s. Seite 53				
floribunda Arnoldiana , Blüten einfach, blaßrosa, sehr reichbl., Früchte gelblich	100—150	0.70	6.50	60.—
floribunda purpurea , Wuchs leicht überhängend, reichblüh., purpurrot, auch im Verblühen beständig, Früchte rot . . .	100—150	0.70	6.50	60.—
Hochstämme, Stammhöhe	160—180	2.75	26.—	250.—
micromalus , in Büscheln lebhaft rosablühend, Früchte gelb, flachkugelig . . .	100—150	0.70	6.50	60.—
Niedzwetzkyana , Rinde und Belaubung leuchtend braunrot, Blüten dunkelrosa, Früchte dunkelrot	100—150	0.70	6.50	60.—
pend. Elise Rathke , Trauerapfel, s. Seite 53				
Sargentii , niedrig bleibender Strauch, dichtverzweigt, Blüten in Dolden, reinweiß .	—	0.70	6.50	60.—
Scheideckerie , vorzüglich zum Treiben geeignet, Blüte groß, gefüllt, leuchtend rot, sehr reichblühend				
Büsche mit 3—5 Trieben	70—100	0.40	3.50	30.—
" " " 5—8	100—150	0.70	6.50	60.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 120	1.65	16.—	150.—
Hochstämme, Stammhöhe	160—180	2.75	26.—	250.—
Sieboldi calocarpa , besonders reich mit kleinen, dunkelroten Aepfelchen behang.	100—150	0.70	6.50	60.—
Morus alba , weißfrüchtige Maulbeere	100—150	0.35	3.—	35.—
Periploca graeca , Baumschlinge, s. S. 40				
Philadelphus , Pfeifenstrauch, falscher Jasmin				
Belle Etoile , starkwüchsig, reichbl., Blüte sehr groß, milchweiß, purpurrot gefleckt	120—160	0.40	3.50	30.—
Billiardi , starkwüchsig, sehr großblumig, reichblühend	100—150	0.35	3.—	25.—
brachybotris , Blüten sehr groß, weiß, duftend, bis 2½ m hoch	100—150	0.35	3.—	25.—
coronarius , Blüten gelblichweiß, wohlriech., reichblühend, trägt auch Schatten	60—90	0.35	3.—	25.—
coronarius aureus , Belaubung goldgelb, niedriger Strauch	40—70	0.45	4.—	35.—
Falconeri , Zweige rotbraun, leicht überhängend, reichblühend, reinweiß . . .	125—175	0.35	3.—	25.—
floribundus , besonders reichblühend . .	100—150	0.35	3.—	25.—
Gordonianus , starkwüchsig, großblumig, spätblühend	125—175	0.35	3.—	25.—
grandiflorus , reichblühend, stark duftend, Blüten einfach, sehr groß, reinweiß . .	125—175	0.35	3.—	25.—
	175—250	0.40	3.50	30.—
inodorus , großblumig, schwachduftend	125—175	0.35	3.—	25.—
latifolius , besonders starkwüchsig, Blüten weiß, sehr groß	125—175	0.35	3.—	25.—
Lemoinei albatre , gefüllt, reinweiß	70—100	0.40	3.50	30.—
Lem. Avalanche , Wuchs überhängend, bis 1½ m, milchweiß, reichblühend . . .	50—70	0.35	3.—	25.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Phil. Lem. Bouquet blanc , Zw. leicht überhäng., Blüten groß, gefüllt, reichblühend	80—125	0.45	4 —	35.—
Lem. erectus , Wuchs aufrecht, reichblühend, duftend, auch für Hecken . .	70—100	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweissem Stand ^{0/00} 160 —	70—100	0.30	2.50	18.—
Lem. Girandole , Neuheit, nicht ganz so hoch wie Lem. Virginal, sehr reichblühend und großblumig, dicht gefüllt, milchweiß . .	60—80	0.55	5.—	45.—
Lem. Manteau d'hermine , leichtgefüllt, gelblichweiß, bis 1 m hoch	40—60	0.40	3.50	30.—
Lem. Montblanc , sehr reichblühend, großblumig, von aufrechtem Wuchs	60—100	0.35	3.—	25.—
Lem. Virginal , sehr schöner Strauch, starkw., mit großen, dicht an den Zweigen entlang steh. Blütentr., Bl. sehr groß, gef., reinweiß	70—100	0.45	4.—	35.—
	100—140	0.55	5.—	45.—
	150—200	0.65	6.—	55.—
pubescens , Bl. dunkelgrün, unters. weißgrau, behaart, Bl. rahmw., wohlriech., s. reichbl.	125—175	0.35	3.—	25.—
purpureus maculatus , kleinerer Strauch, Bl. groß, reinweiß mit rötlich gefleckter Mitte, duftend	70—100	0.35	3.—	25.—
Satsumi Yokohamae , Blüten groß, weiß, geruchlos	125—175	0.35	3.—	25.—
Wilsoni , hoher Strauch, Bl. groß, reinweiß, sehr reichblühend	100—150	0.35	3.—	25.—
Physocarpus , s. unter „Spiraea“, Seite 35				
Pirus salicifolia pendula , Trauerbirne, siehe Seite 53				
Polygonum , Knöterich, siehe Seite 40				
Populus , Pappel	100—150	0.50	4.50	40.—
alba Bolleana , Pyramiden-Silberpappel, Wuchs pyramidal, Unterseite der Blätter leuchtend weiß	150—200	1.—	9.50	90.—
	200—250	1.65	16.—	150.—
	250—300	2.50	23.—	220.—
alba nivea , Silberpappel, unters. weißfilzig, im jungen Austrieb fast schneeweiß . .	125—175	0.35	3.—	28.—
	175—200	0.45	4.—	35.—
angulata cordata robusta , außerordentlich starkwüchsig, Blätter sehr groß, hellgrün	125—150	0.30	2.50	20.—
	150—200	0.40	3.50	30.—
balsamifera , Balsampappel mit wohlriechenden Blättern	175—250	0.35	3.—	25.—
berolinensis , Berliner Lorbeerpappel, sehr raschwüchs., großblättr., aufrechtwachsend	150—200	0.40	3.50	30.—
	200—250	0.50	4.50	40.—
	250—300	0.90	8.50	80.—
canadensis , kanadische Pappel, sehr starkwachsend, für feuchte Lage	175—275	0.35	3.—	25.—
lasiocarpa , Blätter sehr groß, herzförmig, dunkelgrün, Blattstiele und Rippen rot .	80—120	0.35	3.—	25.—
nigra fastigiata (dilatata) , italienische Pyramidenpappel, vollgarnierte Pflanzen aus weitem Stand	150—200	0.65	5.50	50.—
	200—250	0.90	8.50	80.—
	250—300	1.65	16.—	150.—
Weniger gut garnierte Pflanzen	300—350	2.75	26.—	250.—
50% billiger	350—400	4.40	42.—	400.—
	400—500	6.—	57.—	550.—
tremula , einheimische Zitterpappel	80—120	0.35	3.—	25.—
trichocarpa , starkwüchsig, Belaubung, glänzend grün, unten weißlich	150—200	0.35	3.—	25.—
Potentilla fruticosa , gemeiner Fünffingerstrauch, von niedrigem Wuchs, Belaubung graugrün, gelblichblühend	60—80	0.35	3.—	25.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Prunus avium plena , gefülltblühende Süß- kirsche, dichtgefüllt, weiß	125 150	1.20	11.—	100.—
Hochstämme 8–10 cm Umfang	—	3.—	28.—	275.—
japonica (sinensis) alba plena , guter Treib- strauch, feinzweigig, weißgefüllt	50–70	1.—	9.—	80.—
japonica rosea plena , rosagefüllt	50–70	1.50	14.—	—
Laurocerasus schipkaensis macrophylla , Kirschlorbeer, vollst. winterhart, Blätter groß, lanzettförmig, dunkelgrün	40–60 60–80 80–100	1.20 2.20 3.—	11.— 21.— 28.—	100.— 200.— 270.—
Lauroc. schipk. Reynvanii , harte Sorte, Wuchs kompakt, straff aufrecht	40–60 60–80	1.— 1.80	9.50 17.50	90.— 170.—
Mahaleb , Weichselkirsche $\frac{0}{100}$ 200.—	100–150	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweitem Stand $\frac{0}{100}$ 160.—	70–125	0.25	2.—	18.—
Myrabolana , Kirschpfl., sehr früh u. reichbl.	125–175	0.35	3.—	25.—
Padus , gemeine Traubenkirsche oder Faul- baum, blüht Anfang Mai in langen, weißen Rispen	80–125 125–175 175–250	0.40 0.50 0.55	3.50 4.50 5.—	30.— 40.— 45.—
Pissardi , Blutpfl., Belaub. dunkel- rot, vor Austrieb der Blätter sehr reich mit weißen Blüten bedeckt	Büsche 100–150 150–200 200–250	0.45 0.60 0.85	4.— 5.50 8.—	35.— 50.— 75.—
Halbstämme	—	1.20	11.—	100.—
Mittelstämme	—	1.70	16.—	150.—
Hochstämme 7-8 cm Stammumf.	—	2.20	21.—	200.—
8-10 "	—	3.30	31.—	300.—
Pissardi nigra , Blätter größer und dunkler als von Pr. Pissardi	Büsche 100–150 150–200 200–250	0.45 0.60 0.85	4.— 5.50 8.—	35.— 50.— 75.—
Halbstämme	—	1.20	11.—	100.—
Mittelstämme	—	1.70	16.—	150.—
Hochstämme 7-8 cm Stammumf.	—	2.20	21.—	200.—
8-10 "	—	3.30	31.—	300.—
Pseudocerasus Naden (Sieboldi) , frühbl., leicht gefüllt, weiß, rosa überhaucht	70–100	1.20	10.—	—
serotina , spätbl. Traubenkirsche, anspruchs- loser Strauch, Bl. glänzend grün, große, weiße Blütentrauben, Mai/Juni	100–150 150–200 200–250	0.30 0.35 0.40	2.50 3.— 3.50	20.— 25.— 30.—
serrulata Hisakura , Blüt. halbgefüllt, groß rosafarbig, sehr schöner Blütenstr. Büsche	120–150	0.70	6.50	60.—
Halbstämme	—	1.65	16.—	150.—
Hochstämme 7-8 cm Stammumf.	—	2.75	26.—	250.—
8-10 "	—	3.30	31.—	300.—
serrulata Shidare Sakura , siehe Seite 53				
serrulata Ukon , Blume groß, halbgefüllt, grünlichweiß	80–120	1.20	10.—	—
serrulata Yoshino , großblumig, einfach, rosa, starkwüchsig	80–120	1.20	10.—	—
spinosa , Schlehdorn, vor Austrieb der Bl. mit weißen Blüten übersät, Früchte blau, gutes Vogelschutzgehölz	60–80 80–130 130–160	0.25 0.35 0.40	2.— 3.— 3.50	18.— 25.— 30.—
Büsche aus halbweitem Stand $\frac{0}{100}$ 140.—	70–120	0.25	2.—	15.—
triloba plena , Mandelbäumchen, Blüten rosagefüllt, wie kleine Röschen im April bis Mai vor Austrieb der Blät- ter alle Zweige bedeckend				
Sträucher mit 3–5 Trieben	—	0.35	3.—	25.—
" " 5–8 "	—	0.45	4.—	35.—
" " extra stark	—	0.60	5.50	50.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Prunus triloba plena , Mandelbäumchen				
Halbstämme, Stammhöhe	40—60	0.85	8.—	75.—
" "	60—80	1.35	13.—	120.—
" "	80—100	2.—	19.—	180.—
" "	100—120	2.40	23.—	220.—
" "	120—140	2.75	26.—	250.—
" "	140—160	3.—	28.—	275.—
Hochstämme, "	160—180	3.30	31.—	300.—
" "	180—200	3.50	34.—	325.—
Ptelea trifoliata , Lederbaum, Belaubung	70—100	0.30	2.50	20.—
glänzend grün, Blüten grünlichweiß . .	100—150	0.35	3.—	25.—
Pterocarya laevigata , Flügelnuß, baumar- tiger Strauch m. schön gefiederter Belaubg.	100—150	1.65	16.—	150.—
Quercus , Eiche				
coccinea latifolia, Scharlacheiche, beson- ders schöne Herbstfärbung	—	2.25	—	—
macrophylla Alberti, Blätter sehr groß, dunkelgrün, oberseits glänzend	—	2.25	—	—
palustris umbraculifera, Sumpfeiche, mit dichtkugelige Krone	—	2.25	—	—
pedunculata (robur), $\frac{0}{00}$ 150.—	100—125	0.30	2.50	20.—
deutsche Eiche $\frac{0}{00}$ 250.—	125—150	0.40	3.50	30.—
$\frac{0}{00}$ 540.—	150—200	0.70	6.50	60.—
$\frac{0}{00}$ 1100.—	200—250	1.40	13.—	125.—
	250—300	2.20	21.—	200.—
ped. argenteo marginata, Blätter sind weiß gerandet	—	4.—	—	—
ped. Concordia, Goldeiche, mit leuchtend goldgelben Blättern	—	4.—	—	—
ped. fastigiata, Pyramideiche, von streng aufrechtem Wuchs in der Art wie die Pyramidenpappel, mit Ballen	100—125	2.—	19.—	180.—
	125—150	2.75	26.—	250.—
	150—175	4.—	37.—	350.—
	175—200	5.50	52.—	500.—
	200—250	7.50	72.—	700.—
	250—300	11.—	105.—	1000.—
	300—350	17.—	160.—	1500.—
rubra, amerikan. Roteiche, $\frac{0}{00}$ 150.—	100—150	0.30	2.50	20.—
mit großen Blättern, die sich $\frac{0}{00}$ 330.—	150—200	0.50	4.50	40.—
im Herbst prächtig rot färben $\frac{0}{00}$ 650.—	200—250	0.80	7.50	70.—
$\frac{0}{00}$ 1100.—	250—300	1.40	13.—	125.—
Rhamnus , Faulbaum, Wegdorn				
cathartica, gemeiner Wegdorn, mit schwar- zen Beeren, verträgt auch Schatten . .	80—125	0.30	2.50	20.—
	125—175	0.35	3.—	25.—
Frangula, gemeiner Faulbaum, mit anfangs roten, später violett-schwarzen Beeren, auch für schattige Lagen	125—175	0.35	3.—	25.—
Rhododendron , Alpenrose				
Catawbiense grandiflora, bekannte, prächtige, sehr großblumige, hellila blü- hende Sorte, vollständig winterhart .	30—40	2.25	20.—	180.—
	40—50	2.50	22.—	200.—
Cunninghams' White, frühblühend, weiß, winterhart, dicht wachsend	50—60	3.—	27.—	250.—
	60—70	3.75	35.—	325.—
Freilandpflanzen mit Knospen, gedrun- gen, von unten verzweigt	70—80	5.—	48.—	450.—
	80—100	10.—	90.—	850.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Rhododendron, Alpenrose				
arboreum- und Catawbiense-Hybriden	30—40	2.50	22.—	200.—
in vielen guten, winterharten Sorten	40—50	2.75	25.—	225.—
und allen Farben,	50—60	3.25	30.—	275.—
Freilandpflanzen mit Knospen, gedrun-	60—70	4.25	40.—	375.—
gen, von unten verzweigt.	70—80	6.—	57.—	550.—
	80—100	12.—	110.—	1000.—
ponticum , Sämlingspflanzen, breitbuschig	30—40	1.10	10.—	95.—
und starkwachsend, Blüten groß, purpur-	40—50	1.30	12.—	110.—
farben mit bräunlicher Zeichnung	50—60	1.50	14.—	130.—
	60—70	1.90	18.—	170.—
praecox , kleiner Strauch, schon im zeiti-	25—30	3.20	30.—	280.—
gen Frühjahr tiefkarminrosa blühend	30—40	3.60	34.—	330.—
punctatum , starkwüchsiger, lockerer Strauch,	30—40	3.20	30.—	280.—
Blüten rosapurpurfarben	40—50	3.60	34.—	330.—
	30—40	1.10	10.—	95.—
	40—50	1.30	12.—	110.—
	50—60	1.50	14.—	130.—
	60—70	1.90	18.—	170.—
	70—80	2.75	26.—	250.—
	80—100	5.—	47.—	450.—
Rhododendron				
Fehlerhafte Pflanzen in Sorten, für				
Unterholzpflanzung geeignet				
Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie,				
Belaubung lebhaft dunkelgrün, Blüten				
groß, schneeweiß, sehr zierende schwarze				
Beeren	60—80	0.40	3.50	30.—
Rhus, Sumach				
Cotinus , Perückenstrauch, dekorativer Str.,				
auch für Einzelstellung, Fruchtstände				
bräunlichrot, schöne lebhaft rote u. gelbe				
Herbstfärbung	60—80	0.70	6.50	60.—
Cotinus atropurpurea , Belaubung kirsch-				
rot, Fruchtstände tiefrot gefärbt	60—80	0.90	8.50	80.—
typhina , Essigbaum, gefiederte, glänzend				
grüne Blätter, im Herbst leuchtend rot,				
große, braunrote Blütenstände	150—200	0.70	6.50	60.—
Halbstämme 6—8 cm Umf.	—	2.—	18.—	—
Hochstämme 8—10 cm Umf.	—	3.—	27.—	—
typhina laciniata , die Blätter sind fein-	80—125	0.55	5.—	45.—
gefiedert, etwas schwachwüchsiger	125—175	0.70	6.50	60.—
Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere				
alpinum , Alpenjohannisbeere, $\frac{0}{100}$ 270.—	40—60	0.40	3.50	30.—
treibt sehr früh aus, $\frac{0}{100}$ 360.—	60—80	0.50	4.50	40.—
auch guter Schattenstrauch $\frac{0}{100}$ 400.—	80—100	0.55	5.—	45.—
Pflanzen für Hecken siehe auch Seite 43				
arboreum (divaricatum) , starkbedornt,				
starkwüchsig, auch für schattige Lage	80—125	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweitem Stand $\frac{0}{100}$ 180.—	80—120	0.30	2.50	20.—
aureum , Gold-Johannisbeere, Ende April				
reichlich gelbbühend, starkwüchsig	100—150	0.35	3.—	25.—
floridum , auch für schattige Lage, schöne,				
braunrote Herbstfärbung	100—150	0.35	3.—	25.—
Gordonianum , starkwüchsig, im Mai in				
langen, orangefarbenen Trauben blühend	80—125	0.45	4.—	35.—
sanguineum , bek. rotbl. Zierjohannisbeere	80—120	0.35	3.—	25.—
sang. atrorubens , dunkelrotblühend	80—120	0.40	3.50	30.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Robinia, Akazie				
<i>hispidia rosea</i> , rotbl. Akazie, Sträucher	65—100	1.—	9.50	90.—
Halbstämme, Stammhöhe	ca. 125	3.—	27.50	—
Hochstämme, 7—9 cm Stammumf.	—	5.—	45.—	—
<i>Pseudoacacia</i> , gewöhnliche Akazie	150—200	0.35	3.—	25.—
	200—300	0.60	5.50	50.—
Rosa, Rose				
<i>canina</i> , Hunds- oder Heckenrose $\frac{0}{100}$ 225.—	80—125	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweisem Stand	70—125	0.25	2.—	15.—
<i>multiflora</i> , blüht in vielblütigen, kleinen				
Sträußen, etwas klimmend $\frac{0}{100}$ 225.—	100—150	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweisem Stand $\frac{0}{100}$ 150.—	80—120	0.25	2.20	18.—
<i>rubiginosa</i> , schottische Zaunrose, mit nach				
Aepfeln duftendem Laub, Blüten klein,				
dunkelrosa $\frac{0}{100}$ 225.—	80—120	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweisem Stand $\frac{0}{100}$ 150.—	70—100	0.25	2.20	18.—
<i>rubrifolia</i> , mit rotem Holz und roter Be-				
laubung, sehr stark und aufrechtwach-				
send, Blüten blaßrot	60—100	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweisem Stand	60—80	0.25	2.20	18.—
<i>rugosa hollandica</i> , stark- und aufrecht-				
wachsend, Bl. hellgrün, im Austrieb röt.	80—120	0.35	3.—	25.—
<i>rugosa Regeliana</i> , Belaubung $\frac{0}{100}$ 180.—	40—60	0.30	2.50	20.—
üppig dunkelgrün, Blume rosa, $\frac{0}{100}$ 225.—	60—80	0.35	3.—	25.—
mit roten, sehr gr. Hagebutten $\frac{0}{100}$ 240.—	80—100	0.40	3.50	27.—
Büsche aus halbweisem Stand $\frac{0}{100}$ 150.—	50—70	0.25	2.—	18.—
<i>rugosa Regeliana alba</i> , weiß- $\frac{0}{100}$ 180.—	40—60	0.30	2.50	20.—
blühende Art $\frac{0}{100}$ 225.—	60—80	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweisem Stand $\frac{0}{100}$ 150.—	50—70	0.25	2.—	18.—
Rubus phoenicolasius , japanische Wein-				
beere, Belaubung dunkelgrün, unterseits				
silbergrau, Triebe stachlig, purpurrot, die				
karmesinroten Früchte sind eßbar	100—150	0.35	3.—	25.—
Salix, Weide				
<i>alba argentea</i> , Silberweide, schnell- und				
starkwüchsig	150—200	0.35	3.—	25.—
<i>alba vitellina Britzensis</i> , Goldweide mit				
blutroten Zweigen	150—200	0.35	3.—	25.—
<i>alba vitellina pendula nova</i> , Trauerdotter-				
weide, siehe Seite 53				
<i>caprea</i> , Salweide, m. gr., silbergr. Kätzchen	130—180	0.45	4.—	35.—
<i>caprea pendula</i> , Trauerkätzchenweide,				
siehe Seite 53				
<i>daphnoides latifolius glabra</i> , stark blau-				
bereifte Weide mit goldgelben Kätzchen,	180—250	0.35	3.—	25.—
gute Bienenweidepflanze	250—300	0.40	3.50	30.—
Halbstämme	—	1.20	11.—	100.—
Hochstämme siehe Seite 53				
<i>daphnoides ruberrima</i> , Holz glänz. rot	180—250	0.45	4.—	35.—
<i>laurifolia</i> , Belaubung lorbeerähnlich,				
glänzend grün	130—180	0.35	3.—	25.—
<i>regalis</i> , feinblättrige, silbergraue Belaubung,				
Zweige leicht überhängend	130—180	0.35	3.—	25.—
<i>rotundifolia</i> , rundblättrige Weide, Blätter				
glänzend, unterseits hellgrau	100—175	0.35	3.—	25.—
<i>Smithiana</i> , starkwüchsig, mit großen,				
dicken Kätzchen, gute Bienenweidepflanze	100—175	0.35	3.—	25.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Sambucus, Holunder				
<i>canadensis lutea</i> , Blätter goldgelb	125—175	0.35	3.—	25.—
<i>nigra</i> , gemeiner Holunder, (Fliederbeer- strauch), auch guter Schattenstrauch	125—175 175—250	0.35 0.40	3.— 3.50	25.— 30.—
<i>nigra laciniata</i> , Blätter zierlich geschlitzt	100—150	0.35	3.—	25.—
<i>nigra argenteo-marginata</i> , Bl. weißgerand.	100—150	0.40	3.50	30.—
<i>racemosa</i> , Traubenholunder, Früchte leuch- tend rot, guter Schattenstrauch	100—150 150—200 200—250	0.30 0.35 0.40	2.50 3.— 3.50	20.— 25.— 30.—
Skimmia japonica , niedr., immergr. Str., im Winter reich mit korallrot. Beeren besetzt	20—30	2.75	25.—	—
Sophora japonica , Schnurbaum, Blätter gefied., dunkelgr., unters. graugr. behaart, im Aug. in langen, gelblichweiß. Rispen bl.	125—175	1.20	11.—	100.—
Sorbus, Eberesche				
<i>aria lutescens</i> , Mehlbeere, Austrieb gelb- lich, Blätter unterseits silberweiß	150—250	0.90	8.50	80.—
<i>aucuparia</i> , gewöhnliche Eberesche, Früchte in Dolden, korallrot	150—200 200—250	0.70 0.90	6.50 8.50	60.— 80.—
<i>scandica</i> , nordische Eberesche, Früchte gelbrot, starkwüchsiger, windfester Baum	150—200 200—250 250—300	0.60 0.70 0.80	5.50 6.50 7.50	50.— 60.— 70.—
Spiraea, Spierstrauch				
<i>albiflora</i> , (callosa alba), auch für niedrige Hecken, weißblühend, fast während des ganzen Sommers	20—30 30—50 50—70	0.30 0.35 0.40	2.50 3.— 3.50	20.— 25.— 30.—
<i>arguta</i> , im Frühjahr sehr reichblühend, weiß, Wuchs leicht überhängend	70—100 100—125	0.45 0.50	4.— 4.50	35.— 40.—
<i>ariaefolia</i> , (Holodiscus discolor), blüht im Sommer in großen, weißen Rispen	125—175	0.35	3.—	25.—
<i>Billiardi</i> , lebhaft rosa, Juli bis August	125—175	0.35	3.—	25.—
<i>Bumalda Anthony Waterer</i> , von niedrig. Wuchs mit pracht- vollen dunkelrot. Blütendolden, Sommerblüher	^{0/00} 180.— 20—30 ^{0/00} 225.— 30—40 ^{0/00} 270.— 40—50	 0.30 0.35 0.40	 2.50 3.— 3.50	 20.— 25.— 30.—
<i>callosa Froebeli</i> , mit großen, dunkelrosa Blütenrispen, Sommerblüher	50—70 60—100	0.35 0.40	3.— 3.50	25.— 30.—
<i>capitatus</i> , niedriger Strauch, Zweige über- hängend, weißblühend, Anfang Juni	100—150	0.35	3.—	25.—
<i>Douglasi</i> , Blütenrispen groß, purpurrosa, Juli/August, anspruchslos	125—175	0.35	3.—	25.—
<i>Fortunei semperflorens</i> , rosablühend, fast während des ganzen Sommers	100—150	0.35	3.—	25.—
<i>hypericifolia thalictroides</i> , im zeitig. Früh- jahr reich mit blendendweiß. Blüten bed.	50—80	0.35	3.—	25.—
<i>Lindleyana</i> , Blüten dichtstehend, klein, weiß, Juli/August	100—150	0.35	3.—	25.—
<i>opulifolia</i> , (Physocarpus opul.), schnee- ballblättrige Blasenspiere, guter Deck- strauch von aufrecht. Wuchs, weißblüh.	125—175	0.35	3.—	25.—
<i>opulifolia lutea</i> , goldgelb belaubt	100—150	0.35	3.—	25.—
<i>prunifolia fl. pl.</i> , großblättrig, weißgefüllt	60—100	0.70	6.50	60.—
<i>Thunbergi</i> , niedriger Strauch, feinbelaubt, früh- und reichblühend, weißblühend	30—50	0.55	5.—	45.—
<i>van Houttei</i> , zieml. hoch- wachsend, Anf. Juni reich mit schneeweißen Blüten bedeckt	^{0/00} 180.— 60—80 80—120 ^{0/00} 225.— 120—150 ^{0/00} 270.—	 0.30 0.35 0.40	 2.50 3.— 3.50	 20.— 25.— 30.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten:	Höhe ca cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Staphylea colchica , Pimpernuß, von aufrechtem Wuchs, mit weißen Blüten . . .	60—80	1.—	9.—	—
Stephanandra incisa (flexuosa) , Kranzspiere, zierlicher, feintrieb. Strauch mit weißen Blütentrauben . . .	50—70	0.45	4.—	35.—
Tanakae , etwas stärker wachsend, mit größeren Blättern und Blütenrispen . . .	50—70	0.70	6.50	60.—
Symphoricarpus , Schneebeere				
orbiculatus , rundblättrige Schneebeere, Früchte klein, dunkelrot . . .	70—100	0.35	3.—	25.—
orbiculatus aur. var. , Blätter goldgelb gerändert, niedrigbleibend . . .	40—60	0.50	4.50	40.—
racemosus , trägt im Winter große, weiße Beeren, auch guter Schattenstrauch . . .	80—130	0.35	3.—	25.—
Büsche aus halbweitem Stand 0/00 150.—	75—120	0.30	2.50	18.—
Syringa , Syringe				
japonica , schöner japanischer Flieder mit sehr großen, weißen Rispen . . .	50—80	0.90	8.50	80.—
.	80—100	1.40	13.—	120.—
Josikaea , ungarischer Flieder, Blüten dunkelviolett, Belaubung dunkelgrün . . .	70—130	0.55	5.—	45.—
reflexa , chinesischer Flieder, spät- und sehr reichblüh., mit sehr langen Blütentrauben, Knospe karminrot, Blüte hellrosa . . .	80—150	0.55	5.—	45.—
.	150—200	0.65	6.—	55.—
Rothomagensis (chinensis) , chinesischer Flieder, zierlich bezweigt, außerordentlich reichblühend, dunkellila . . .	70—100	0.90	8.50	80.—
.	100—130	1.20	11.—	100.—
Sweginzowii , hoher Strauch, schlankzweigig Bl. zierlich, außen fleischfarb., innen weißl. . .	150—200	0.60	5.50	—
tomentella , Blätter oberseits sattgrün, unterseits graugrün, bärtig behaart, Blüten lilarosa . . .	150—200	0.80	7.50	70.—
vulgaris , gewöhnlich. Flieder, 0/00 180.—	60—80	0.30	2.50	20.—
lila blühend 0/00 225.—	80—100	0.35	3.—	25.—
. 0/00 320.—	100—125	0.45	4.—	35.—
. 0/00 450.—	125—150	0.60	5.50	50.—
.	150—200	0.65	6.—	55.—
vulgaris alba , weißblühende Form des gewöhnlichen Flieders . . .	80—100	0.60	5.50	50.—
.	100—125	0.70	6.50	60.—
vulg. Marliensis , Knospen hellrot, Blüten helllilablau, außerordentlich reichblühend . . .	80—100	0.50	4.50	40.—
.	100—125	0.70	6.50	60.—
.	125—150	0.90	8.50	80.—
vulgaris, in veredelten Sorten				
1jährige Veredlungen . . .	50—100	0.50	4.50	40.—
Sträucher mit 3—5 Trieben . . .	60—80	0.80	7.50	70.—
" " 5—8 " . . .	65—100	1.—	9.50	85.—
" " 8—12 " . . .	80—120	1.65	16.—	150.—
verpflanzte Sträucher, extra stark (nur Mme. Lemoine) . . .	120—150	2.50	23.—	225.—
Halbstämme, Stammhöhe . . .	60—80	1.35	13.—	120.—
" " . . .	80—100	1.65	16.—	150.—
" " . . .	100—120	2.20	21.—	200.—
" " . . .	120—140	2.75	26.—	250.—
Hochstämme, " . . .	140—160	3.30	31.—	300.—
" " . . .	160—180	4.50	42.—	400.—
" " . . .	180—200	5.50	52.—	500.—

ZIERGEHÖLZE

Vorrätige Sorten	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Syringa vulgaris Vorrätige Syringen-Sorten:				
Andenken an Ludwig Späth, einfach- blühend, großblumig, dunkelpurpur				
Charles X., einfach, lilarot, vorzüglich zum Treiben geeignet				
Congo, Blüten einfach, groß, dunkelrot				
Hugo Koster, Blüten einfach, große violette Rispen, Knospen rötlich				
Jan van Tol, weiß, einfachblüh., s. großbl.				
Mme. Casimir Périer, starkgef., rahmweiß				
Mme. Florens Stepman, einf., weiß, großbl.				
Mme. Jules Finger, weiß gefüllt				
Mme. Lemoine, gefüllt, großbl., blendendw.				
Marie Legraye, einfach, großblumig, weiß, vorzüglich zum Treiben				
Michel Buchner, blaßlila gef., großblumig				
Perle von Teltow, einfachbl., rosa				
Präsident Grevy, rosalila-gefüllt, s. großbl.				
Präsident Loubet, großblumig, purpurlila, Knospe karmin				
Sinai lila, einfachblüh., vorzügl. Treibsorte				
Tamarix, Tamariske				
gallica indica, rosablühend	60—80	0.40	3.50	30.—
germanica, Belaub. graugrün, Bl. blaßrosa	100—150	0.35	3.—	25.—
hispid aestivalis, die karminrosafarbigen Blüten heben sich sehr schön von dem hellgrünen Laub ab	100—150	0.45	4.—	35.—
juniperina (plumosa), Belaubung frisch hellgrün, Blüten rosa	60—80	0.35	3.—	25.—
odessana, Wuchs leicht überhängend, Be- laubung blaugrün, blüht zartrosa	100—150	0.45	4.—	35.—
tetrandra (africana), Blüten hellrosa, Be- laubung lebhaft grün, starkwüchsig	100—150	0.35	3.—	25.—
tetr. parviflora, kleinblumig, rosa	100—150	0.35	3.—	25.—
tetr. purpurea, dunkelrot blühend	100—150	0.35	3.—	25.—
Tecoma (Bignonia) , siehe Seite 40				
Teucrium chamaedrys , Gamander, hübsch f. niedrige Einfassung, dunkelgrün, blüht Juli/Oktobre purpurrot ^{0/00} 160.—	15—25	0.30	2.50	20.—
Tilia, Linde				
euchlora, Krimlinde Heister	175—250	2.10	20.—	190.—
intermedia, holländische Linde "	175—250	2.10	20.—	190.—
parvifolia, kleinblättrige Linde, Steinlinde, siehe Seite 44				
platiphyllus (grandifolia), großblättrige Linde, Sommerlinde Heister	175—250	1.65	16.—	150.—
Ulmus, Ulme, Rüster				
americanus, Weißrüster, mit überhängenden Aesten	200—250 250—300	0.25 0.35	2.30 3.—	22.— 28.—
campestris, Feldrüster, siehe Seite 44	140—200	0.90	8.50	80.—
camp. Louis van Houtte, Belaubung gold- bronzefarbig, Blattmitte oft grün	200—250	1.50	13.—	—
Halbstämme, Stammhöhe	120—140	1.65	16.—	150.—
Mittelstämme, "	140 160	2.—	19.—	180.—
" "	160—180	2.40	23.—	220.—
Hochstämme, siehe Seite 51				

ZIERGEHÖLZE

	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Ulmus camp. monumentalis (Wheatleyi) , schnellwüchsig, Belaubung glänzend dun- kelgrün, sehr lange haftend	150—200 200—250 250—300 300—350	0.85 1.20 1.65 2.75	8.— 11.— 16.— 26.—	75.— 100.— 150.— 250.—
montana , Bergrüster, großblättrig	180—250 250—300	0.35 0.45	3.— 4.—	25.— 35.—
montana Dampieri , pyramidal wachsend, mit dunkelgrünen, gekräuselten Blättern	125—150 150—175 175—200	0.90 1.20 1.65	8.— 10.— 15.—	— — —
mont. Dampieri Wredei , Goldpyramiden- ulme mit intensiv goldgelb gefärbten Blättern	60—80 80—100 100—125	0.85 1.20 1.65	8.— 11.— 16.—	75.— 100.— 150.—
Halbstämme, Stammhöhe ca. 80		1.65	16.—	150.—
mont. fastigiata , schöne, dickzweigige Form von pyramidal. Wuchs, mit enganliegenden, gekräuselten, dunkelgrünen Blättern, auch für schmale Hecken geeignet	150—200 200—250 250—300 300—350 350—400	0.70 0.90 1.40 2.25 3.30	6.50 8.50 13.— 21.— 31.—	60.— 80.— 120.— 200.— 300.—
mont. pendula , Trauerulme, s. Seite 53				
Veronica cupressoides , Ehrenpreis, niedr., dichtverzweigter Strauch für Steingärten, blüht in Büscheln, hellblau	—	0.65	6.—	55.—
Viburnum , Schneeball				
Carlesi , niedriger Strauch, breitwachsend, winterhart, blüht in Dolden, reinweiß, wohlriechend, April/Mai	30—40 40—60	1.35 1.65	13.— 16.—	120.— 150.—
Lantana , mit großen, graugrünen Blättern und schönen, weißen Blütendolden	80—120 120—160 160—200	0.35 0.40 0.45	3.— 3.30 3.60	25.— 28.— 32.—
opulus , gemeiner Schneeball, mit leuch- tendroten Früchten	100—150 150—200	0.35 0.40	3.— 3.50	25.— 30.—
Büsche aus halbweisem Stand % 160.—	80—140	0.30	2.50	20.—
opulus sterile , gefülltblühend. Schneeball- strauch, auch zum Treiben	80—125 125—175	0.45 0.50	4.— 4.50	35.— 40.—
Büsche sehr geeignet	80—100 100—120	0.90 1.20	8.50 11.—	80.— 100.—
Halbstämme, Stammhöhe				
rhytidophyllum , immergrüner, feinbelaubt. Strauch, starkwüchsig, winterhart, Blüten gelblichweiß, Mai	50—70 50—60	0.85 1.30	8.— 12.—	75.— —
Büsche Stämmchen, Stammhöhe				
tomentosum (plicatum) , Wuchs kugelig, blüht Mai/Juni in Scheindolden, nur am Rand mit einigen großen Blüten besetzt	40—65	0.85	8.—	—
Vitis odoratissima , wohlriechender Wein, siehe Seite 40				
Weigelia (Diervilla) , Weigelie bekannter und beliebter Blütenstrauch				
amabilis , hellrosa	80—120 120—180	0.40 0.45	3.50 4.—	30.— 35.—
amabil. alba , Bl. weiß, leichtrosa angehaucht	80—120	0.40	3.50	30.—
Eva Rathke , etwas schwachwüchs. als die übrigen Sorten, reichblüh., tiefdunkelrot	50—80 80—120	0.60 0.70	5.50 6.50	50.— 60.—
floribunda , kleinblättrig, dunkelgrün, reich- blühend, Blüten fleischfarbig	70—100	0.40	3.50	30.—
Heroine , großblumig, hellrosa	70—100	0.45	4.—	35.—
intermedia , Blüten rosa und weiß	70—100	0.40	3.50	30.—

ZIERGEHÖLZE — SCHLINGPFLANZEN

	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Weigelia intermedia Stelzneri, rosa . . .	70—100	0.40	3.50	30. —
japonica, sehr großblaubig, Blüten weiß, in weinrot übergehend . . .	70—100	0.50	4.50	40. —
Othello, Blüten ziemlich groß, hellkarmin- rot, Knospen dunkelrot . . .	70—100	0.50	4.50	40. —
Pascal, Blüten mittelgroß, lebhaft braunrot . . .	70—100	0.50	4.50	40. —
Pavillon blanc, großblumig, zartfleischfarb., mit gekräuseltem, breitem, weißem Saum . . .	70—100	0.50	4.50	40. —
Président Duchartre, Blüten dunkelpurpur, Laub im Austrieb leicht bronziert, dunkel- randig und gewellt . . .	80—120	0.40	3.50	30. —
styriaca, reichblühend, leuchtend hellrot . . .	80—120	0.40	3.50	30. —
van Houttei, rosa . . .	80—120	0.40	3.50	30. —
Verschaffelti, purpurrosa, weiß gestreift . . .	80—120	0.40	3.50	30. —
Wistaria (Glycine) chin, siehe Seite 40				

Schlingpflanzen

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Actinidia polygama , spitzblättriger Strahlen- griffel, starkschlingend, Belaubung glänzend dunkelgrün, lange haftend, Blüte weiß, Juni-Juli . . .	2. —	18. —	—
Ampelopsis , Wilder Wein			
Engelmanni, ähnlich wie A. quinquefolia, aber selbstklimmend, schöne Herbstfärbung, aufgebundene Pflanz. mit 3—5 Rank. $\frac{0}{100}$ 270. —	0.35	3.30	30. —
" " " 5—8 " $\frac{0}{100}$ 300. —	0.45	4. —	35. —
quinquefolia (hederacea), gewöhnl. wild. Wein aufgebundene Pflanz. mit 3—5 Rank. $\frac{0}{100}$ 225. —	0.35	3. —	25. —
" " " 5—8 " $\frac{0}{100}$ 300. —	0.45	4. —	35. —
" " " 8—12 " $\frac{0}{100}$ 350. —	0.50	4.50	40. —
radicantissima (muralis), schöner starkwüchsi- ger Selbstklimmer . . .	0.45	4. —	35. —
Veitchi, bekannter Selbstklimmer, die efeuähn- l. Blätter liegen der Wand flach an, schöne Herbstfärbung . . .			
1jährige Veredlungen mit Topfballen . . .	0.45	4. —	35. —
2jährige Freilandpflanzen I. Qualität . . .	0.55	5. —	45. —
2jährige Freilandpflanzen Mittelqualität . . .	0.45	4. —	35. —
Aristolochia Siphon , Pfeifenblume, Osterluzei, Blätter sehr groß, herzförmig, starkwüchsig, Blüten pfeifenähnlich, starke Freilandpflanzen . . .	1.40	13. —	120. —
Freilandpflanzen, Mittel-Qualität . . .	1.10	10. —	95. —
Clematis , Waldrebe			
Jackmanni, (dunkelviolet) und andere groß- blumige Sorten in verschiedenen Farben . . .			
1jährige Veredlungen mit Topfballen . . .	1.40	13. —	120. —
2jährige starke Freilandpflanzen . . .	1.65	15. —	140. —
montana rubens, starkkrankend, reichblühend, Blüten groß, rosa . . .			
2jährige starke Freilandpflanzen . . .	1.20	11. —	100. —
vitalba, gemeine Waldrebe, sehr starkwüchsig, reichblühend, Blüte klein, weiß . . .	0.50	4.50	40. —
viticella, kleinblumig, blau, starkwüchsig . . .	1.20	11. —	100. —

SCHLINGPFLANZEN — HECKENPFLANZEN

		1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Hedera, Efeu				
arbores, kugelförmig	30—50 cm	2.—	18.—	—
helix, kleinblättrig, mit Ballen	40—60 cm	0.40	3.—	25.—
	60—80 cm	0.45	4.—	35.—
	80—100 cm	0.55	5.—	45.—
	100—125 cm	0.70	6.50	60.—
	125—150 cm	1.—	9.50	90.—
hibernica, großblättrig, m. Ballen	40—60 cm	0.50	4.50	40.—
	60—80 cm	0.60	5.50	50.—
	80—100 cm	0.85	8.—	75.—
	100—125 cm	1.—	9.50	90.—
	125—150 cm	1.65	16.—	150.—
Lonicera caprifolium, Geißblatt, Jellängerjelierber,				
in Sorten meiner Wahl		1.—	9.50	90.—
fuchsoides, granatrof		2.75	25.—	—
punicea, orangerot		2.75	25.—	—
Periploca graeca, Baumschlinge, Blüten mattvio-				
lett, wohlriechend, Juli bis August		1.30	12.—	—
Polygonum, Knöterich				
Auberti, äußerst starkwüchsig, Sommer bis Herbst				
an den Zweigenden reichlich weißblühend		1.—	9.50	90.—
baldschuanicum, äußerst starkwüchsig, Juni bis				
Herbst mit langen, rötlichweißen Blütenrispen				
bedeckt		1.—	9.50	90.—
Schlingrosen, siehe unter „Rosen“ Seite 9				
Tecoma (Bignonia), Jasmintrumpete				
grandiflora, kletternder Strauch mit gefiederten				
Blättern und großen, trichterförmigen, orange-				
roten Blüten, Sommer bis Herbst		2.—	18.—	—
grandifl. Mme. Galen, sehr reichblühend, lachs-				
orangegeb		2.—	18.—	—
radicans, Wuchs stärker und Blüten größer als				
bei T. grandiflora, orangerot		2.—	18.—	—
Vitis odoratissima, wohlriechender Wein				
		1.20	11.—	100.—
Wistaria (Glycine) Blauregen				
chinensis, Blätter gefiedert, blüht im Frühjahr,				
Blütentrauben lang herabhängend, blaßviolett,				
starke Freilandpflanzen		2.20	21.—	200.—
Freilandpflanzen Mittel-Qualität		1.65	16.—	150.—

Heckenpflanzen

Die mehrmals verpflanzten Größen sind aus weitem Stand, gut garniert für fertige Hecken

mm = mehrmals verpflanzt, v. = verpflanzt, S. = Sämling, St. = Steckling

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. GM.	1000 St. GM.
A. Laubhölzer				
Acer campestre, Feldahorn, eine viel zu wenig bekannte, vorzügliche Heckenpfl., ver trägt gut den Schnitt, mit sehr hübscher Belaub. Mehrm. verpflanzte Büsche, geschnitten, gut garniert, aus weitem Stand, an Stäben aufgebunden	m/m	80—100	25.—	225.—
	m/m	100—125	32.—	300.—
	m/m	125—150	40.—	360.—
	m/m	150—175	55.—	500.—
	m/m	175—200	65.—	600.—
	m/m	200—250	90.—	800.—
	m/m	250—300	130.—	1200.—

HECKENPFLANZEN

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. GM.	1000 St. GM.
Acer campestre, Feldahorn				
Mehrmals verpflanzte Büsche aus weitem Stand	m/m	80—100	20.—	180.—
	m/m	100—125	25.—	225.—
	m/m	125—150	30.—	270.—
	m/m	150—175	40.—	360.—
	m/m	175—200	45.—	400.—
	m/m	200—250	55.—	500.—
2 mal verpflanzte Heistern aus halb- weitem Stand	m/m	80—100	11.—	100.—
	m/m	100—125	14.—	130.—
	0/000 200.—	2j. v.	20—40	3.— 22.—
	0/000 315.—	2j. v.	40—65	4.50 35.—
	0/000 500.—	3j. v.	65—100	6.50 56.—
	0/000 675.—	3j. v.	100—140	8.50 75.—
	0/000 900.—	3j. v.	140—180	11.— 100.—
Carpinus betulus, Weiß- oder Hain- buche, I. Qualität, mehrm. verpfl.	m/m	60—80	22.—	200.—
aus weitem Stand, d. h. eine Ware,	m/m	80—100	35.—	320.—
gut garniert, mit bester Bewurzelung	m/m	100—125	50.—	450.—
und möglichst geradem Mitteltrieb,	m/m	125—150	65.—	600.—
(werden auf Wunsch zu 5/10 Stück	m/m	150—175	90.—	800.—
gebündelt, in Moos und Emballier- leinen eingebunden, geliefert)	m/m	175—200	125.—	1100.—
	m/m	200—225	150.—	1350.—
Wenn mit Erdballen geliefert wird,	m/m	225—250	200.—	1800.—
erhöht sich der Preis um 25%	m/m	250—300	250.—	2250.—
2 mal verpfl. aus weitem Stand,	m/m	300—350	350.—	—
Mittelqualität, d. h. eine Ware gut	m/m	60—80	18.—	160.—
wüchsig, die aber nicht allen An- forderungen der I. Qual. entspricht	m/m	80—100	25.—	225.—
	m/m	100—125	40.—	360.—
	m/m	125—150	55.—	500.—
	m/m	150—175	75.—	680.—
	m/m	175—200	100.—	900.—
	m/m	200—225	125.—	1100.—
	m/m	225—250	150.—	1250.—
	m/m	250—300	180.—	1600.—
2 mal verpfl. Heistern aus halb- weitem Stand	m/m	60—80	12.—	100.—
	m/m	80—100	15.—	135.—
	m/m	100—125	18.—	165.—
	m/m	125—150	22.—	200.—
(Jüngere, 1 mal verpfl. Ware s. S. 66)	m/m	150—175	30.—	275.—
Cornus mas, Kornelkirsche, an- spruchsloser, guter Heckenstrauch, blüht, März goldgelb, Früchte essbar	m/m	40—60	22.—	200.—
	m/m	60—80	30.—	270.—
	m/m	80—100	40.—	360.—
	m/m	100—125	50.—	450.—
	m/m	150—175	60.—	550.—
	m/m	175—200	75.—	700.—
Büschel aus halbweitem Stand	m/m	40—60	13.—	100.—
	m/m	60—80	18.—	150.—
	m/m	80—100	22.—	200.—
(Jüngere, 1 mal verpfl. Ware, s. S. 82)	m/m	100—125	27.—	250.—
Crataegus monogyna, Weißdorn	m/m	75—100	15.—	135.—
	m/m	100—125	18.—	160.—
	m/m	125—150	25.—	225.—
	m/m	150—200	30.—	270.—
	m/m	200—250	35.—	—
	4j. v.	80—120	6.—	50.—
12-14 mm Durchm.	4j. v.	80—120	5.—	40.—
0/000 360.— 9-12 „ „	3j. v.	60—80	4.—	33.—
0/000 300.— 6-9 „ „	2j. v.	40—60	2.50	20.—
0/000 180.— 4-6 „ „				
[Unverpfl. 1-2j. Säml. siehe Seite 66]				

HECKENPFLANZEN

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. GM.	1000 St. GM.
Crataegus coccinea , scharlachfrüchtiger Weißdorn	m/m	60—80	35.—	300.—
(Jüngere, 1 mal verpfl. Ware, s. S. 82)	m/m	80—125	45.—	400.—
sanguinea , Weißdorn mit blutroten Früchten	m/m	125—175	50.—	—
Cydonia japonica Maulei, japanische Quitte	m/m	100—150	35.—	—
Büsche aus halbweitem Stand	m/m	40—60	22.—	200.—
(Jüngere 1 mal verpfl. Ware s. S. 66)	m/m	60—80	25.—	240.—
Fagus sylvatica , Rotbuche	m/m	30—50	15.—	140.—
Mehrmals verpflanzt aus weitem Stand, I. Qualität, d. h. eine Ware gut garniert, mit bester Bewurzelung und möglichst geradem Mitteltrieb	m/m	50—70	18.—	160.—
Wenn mit Erdballen geliefert wird, erhöht sich der Preis um 25%	m/m	60—80	18.—	160.—
	m/m	80—100	35.—	320.—
	m/m	100—125	50.—	450.—
	m/m	125—150	65.—	600.—
	m/m	150—175	90.—	800.—
	m/m	175—200	125.—	1100.—
	m/m	200—225	175.—	1600.—
	m/m	225—250	220.—	2000.—
	m/m	250—300	300.—	2700.—
Mehrmals verpflanzt aus weitem Stand, Mittelqualität, d. h. eine Ware gut wüchsig, die aber nicht allen Anforderungen der I. Qualität entspricht	m/m	60—80	12.—	100.—
	m/m	80—100	23.—	200.—
	m/m	100—125	30.—	270.—
	m/m	125—150	45.—	400.—
	m/m	150—175	60.—	540.—
	m/m	175—200	90.—	800.—
	m/m	200—250	110.—	1000.—
	m/m	250—300	140.—	1250.—
2mal verpflanzte Heistern aus halbweitem Stand	m/m	60—80	9.—	80.—
	m/m	80—100	12.—	110.—
	m/m	100—125	18.—	160.—
	m/m	125—150	30.—	270.—
	m/m	150—175	40.—	360.—
	m/m	175—200	60.—	540.—
$\frac{0}{000}$ 160.—	3j. v.	15—30	2.50	18.—
$\frac{0}{000}$ 270.—	3j. v.	30—50	4.—	30.—
$\frac{0}{000}$ 500.—	3j. v.	50—80	6.50	56.—
$\frac{0}{000}$ 900.—	3j. v.	80—120	11.—	100.—
sylvatica purpurea , Blutbuche,	m/m	80—100	65.—	—
aus Samen gezogene Pflanzen mit Ballen	m/m	100—125	85.—	—
	m/m	125—150	125.—	—
	m/m	150—175	180.—	—
	m/m	175—200	250.—	—
	m/m	200—250	450.—	—
	m/m	250—300	700.—	—
Ligustrum Lodense , immergrüner Zwergliguster, das Laub nimmt im Herbst eine fast den ganzen Winter anhaltende Büsche rotbraune Farbe an, voll- kommen winterhart	1j. b. St.	8—15	9.—	80.—
	2j.	15—20	18.—	160.—
	3j.	20—30	33.—	300.—
	4j.	30—40	45.—	400.—
ovalifolium , immergrüner Liguster				
verpfl. Büsche mit 10—20 Trieben	m/m	60—80	18.—	170.—
" " " 10—20 "	m/m	80—100	20.—	190.—
" " " 10—20 "	m/m	100—125	24.—	220.—
" " " 10—20 "	m/m	125—150	27.—	250.—
" " " 8—15 "	m/m	60—80	16.—	140.—
" " " 8—15 "	m/m	80—100	19.—	180.—
" " " 8—15 "	m/m	100—125	21.—	200.—
" " " 8—15 "	m/m	125—150	24.—	220.—

HECKENPFLANZEN

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. GM.	1000 St. GM.
Ligustrum ovalifolium, immergr. Lig.				
mit 5-8 Trieben $\frac{0}{000}$ 500.—	3j. v.	30-50	6.—	55.—
" 5-8 " $\frac{0}{000}$ 700.—	3j. v.	50-80	9.—	80.—
" 5-8 " $\frac{0}{000}$ 1000.—	3j. v.	80-100	13.—	120.—
von 2 Trieben an $\frac{0}{000}$ 270.—	2j. b. St.	30-50	3.50	30.—
" 2 " " $\frac{0}{000}$ 400.—	2j. b. St.	50-80	5.—	45.—
" 2 " " $\frac{0}{000}$ 520.—	2j. b. St.	80-100	6.50	60.—
" 2 " " $\frac{0}{000}$ 180.—	1j. b. St.	15-30	2.50	20.—
vulgare, gemeiner Liguster				
verpfl. Büsche mit 10-20 Trieben	m/m	60-80	22.—	200.—
" " " 10-20 "	m/m	80-100	25.—	240.—
" " " 10-20 "	m/m	100-125	30.—	280.—
" " " 8-15 "	m/m	60-80	19.—	180.—
" " " 8-15 "	m/m	80-100	21.—	200.—
" " " 8-15 "	m/m	100-120	25.—	240.—
mit 5-8 Trieben $\frac{0}{000}$ 600.—	3j. v.	30-50	8.—	70.—
" 5-8 " $\frac{0}{000}$ 900.—	3j. v.	50-80	11.—	100.—
" 5-8 " $\frac{0}{000}$ 1200.—	3j. v.	80-100	14.—	130.—
von 2 Trieben an $\frac{0}{000}$ 270.—	2j. b. St.	30-50	3.50	30.—
" 2 " " $\frac{0}{000}$ 400.—	2j. b. St.	50-80	5.—	45.—
" 2 " " $\frac{0}{000}$ 520.—	2j. b. St.	80-100	6.50	60.—
" 2 " " $\frac{0}{000}$ 180.—	1j. b. St.	15-30	2.50	20.—
vulg. atrovirens, das im Winter purpurbraun gefärbte Laub haftet bis zum Frühjahr				
verpfl. Büsche mit 15-25 Trieben	m/m	40-60	30.—	270.—
" " " 15-25 "	m/m	60-80	35.—	320.—
" " " 15-25 "	m/m	80-100	45.—	400.—
" " " 8-15 "	m/m	40-60	25.—	225.—
" " " 8-15 "	m/m	60-80	30.—	270.—
" " " 8-15 "	m/m	80-100	40.—	360.—
mit 5-8 Trieben	3j. v.	40-60	20.—	180.—
" 5-8 "	3j. v.	60-80	25.—	225.—
" 5-8 "	3j. v.	80-100	30.—	270.—
" 3-5 " $\frac{0}{000}$ 1100.—	2j. b. St.	30-50	13.—	120.—
" 3-5 " $\frac{0}{000}$ 1450.—	2j. b. St.	50-80	17.—	160.—
" 3-5 " $\frac{0}{000}$ 630.—	1j. b. St.	10-20	8.—	70.—
" 3-5 " $\frac{0}{000}$ 800.—	1j. b. St.	20-40	10.—	90.—
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere				
verpfl. Büsche mit 8-15 Trieben	m/m	40-60	30.—	270.—
" " " " " " "	m/m	60-80	40.—	360.—
" " " " " " "	m/m	80-100	45.—	400.—
4jährig verpfl. mit 6-12 Trieben	4j. v.	30-40	22.—	200.—
" " " " " " "	4j. v.	40-60	25.—	230.—
" " " " " " "	4j. v.	60-80	30.—	270.—
" " " " " " "	4j. v.	80-100	33.—	300.—
mit 3-5 Trieben	3j. v.	40-60	17.—	150.—
" 3 5 "	3j. v.	60-80	19.—	170.—
" 1-2 "	2j. v.	15-30	12.—	100.—
" 1-2 "	2j. v.	30-50	15.—	130.—
Rosa rubiginosa, schott. Zaunrose				
Büsche aus halbweitem Stand	m/m	80-120	25.—	225.—
(Jüngere, 1mal verpfl. Ware s. S. 86)	m/m	70-100	18.—	150.—
rugosa Regeliana, mit sehr großen, dekorativen, roten Hagebutten und	m/m	40-60	20.—	180.—
rugosa Regeliana alba, weißblüh.	m/m	60-80	25.—	225.—
Büsche aus halbweitem Stand	m/m	80-100	27.—	240.—
(Jüngere, 1mal verpfl. Ware s. S. 86)	m/m	50-70	18.—	150.—

HECKENPFLANZEN

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. CM.	1000 St. GM.
Tilia parvifolia, kleinblättr. Linde, vorzüglich für Hecken- und Lauben- pflanzung geeignet, mehrmals ver- pflanzt, vollgarniert	m/m	80—100	40.—	360.—
	m/m	100—125	55.—	500.—
	m/m	125—150	75.—	700.—
	m/m	150—175	110.—	1000.—
	m/m	175—200	150.—	1350.—
	m/m	200—250	200.—	1800.—
0/000 200.—	2j. v.	15—30	3.—	22.—
0/000 320.—	3j. v.	30—50	4.50	36.—
0/000 540.—	3j. v.	50—80	7.—	60.—
0/000 720.—	3j. v.	80—100	9.—	80.—
0/000 270.—	2j. S.	30—50	4.—	30.—
0/000 400.—	2j. S.	50—80	5.50	45.—
Ulmus campestris, Feldrüster, gute Heckenpfl., auch für Halbschatten, mehrmals verpflanzt, vollgarniert	m/m	80—100	20.—	180.—
	m/m	100—125	30.—	270.—
	m/m	125—150	40.—	360.—
	m/m	150—175	50.—	450.—
	m/m	175—200	70.—	630.—
	m/m	200—250	90.—	800.—
	m/m	250—300	110.—	1000.—
	m/m	300—350	150.—	—
0/100 360.—	2j. v.	40—65	5.—	40.—
0/000 540.—	2j. v.	65—100	7.—	60.—
0/000 720.—	2j. v.	100—140	9.—	80.—

B. Immergrüne Heckenpflanzen

v = verpflanzt, m/m = mehrmals verpflanzt, B = Ballenpflanzen

	Alter	Höhe ca. cm	10 St. GM.	100 St. GM.	1000 St. GM.
Berberis buxifol. (dulcis) nana, niedriger, immergr. Strauch mit rotbraunen Zweigen		15—20	2.—	18.—	160.—
		20—30	2.75	23.—	200.—
Buxus sempervirens (arbores- cens), baumartig. Buchsbaum	B	20—30	4.50	40.—	360.—
Büsche mit Ballen	B	30—40	8.—	75.—	650.—
	B	40—50	11.50	110.—	1000.—
	B	50—60	16.—	150.—	1400.—
	B	60—70	26.—	250.—	2250.—
	B	70—80	42.—	400.—	3600.—
Büsche ohne Ballen	m/m	10—15	1.20	10.—	90.—
	m/m	15—25	1.70	14.—	120.—
	m/m	20—30	2.50	22.—	200.—
Jüngere 3-4j. Ware, s. S. 89					
suffruticosa, Einfassungsbuxus unverpfl. verpfl Ware					
per lfd. Meter 0.35 0.45					
„ 10 „ 3.— 4.—					
„ 100 „ 25.— 35.—					
Erica herbacea (carnea), Schneeheide, blüht im zei- tigen Frühjahr rosenrot.	B	—	4.—	35.—	325.—
Evonymus radicans, niedriger Strauch, grünblättr., für Einf.	m/m	20—30	3.50	30.—	—
radicans arg. var., weißbunte Form	m/m	20—30	3.50	30.—	—

IMMERGRÜNE HECKENPFLANZEN

	Alter	Höhe ca. cm	10 St. GM.	100 St. GM.	1000 St. GM.
Mahonia aquifolium, Mahonie	B	30-40	4.50	40.—	350.—
verpfl. Büsche, mit Ballen	B	40-50	5.—	45.—	400.—
	B	50-60	6.—	55.—	500.—
verpfl. Büsche, ohne Ballen	m/m	20-30	2.—	18.—	160.—
	m/m	30-40	3.—	28.—	250.—
	m/m	40-50	3.60	33.—	300.—
	m/m	50-60	4.20	38.—	350.—
verpfl. Büsche aus halb- weitem Stand, ohne Ballen	m/m	20-35	1.50	10.—	90.—
1-2jährige $\frac{0}{000}$ 270.—	3j. v.	30-50	2.—	15.—	135.—
Pflanzen $\frac{0}{000}$ 360.—	3j. v.	15-30	0.50	3.50	30.—
siehe Seite 84 $\frac{0}{000}$ 450.—	4j. v.	20-40	0.60	4.50	40.—
			0.70	5.50	50.—
Teucrium chamaedrys, Ga- mander , für niedrige Einf., dunkelgrün, blüht Juli/Okt., purpurrot		15-20	2.50	20.—	160.—
Taxus baccata, Eibe , vor- zügliche Heckenpflanze, verträgt jeden Schnitt und auch Schatten	B	20-30	7.—	65.—	600.—
	B	30-40	9.50	90.—	800.—
	B	40-50	16.—	150.—	1300.—
	B	50-60	19.—	180.—	1600.—
	B	60-70	26.—	250.—	2250.—
	B	70-80	37.—	350.—	3200.—
Breite, volle Ware mit Ballen	B	80-90	47.—	450.—	4300.—
	B	90-100	57.—	550.—	5300.—
Größere Pflanzen bis 250 cm, siehe Seite 62	B	100-125	75.—	700.—	6500.—
	B	125-150	90.—	850.—	8000.—
	m/m	20-30	3.50	30.—	270.—
2mal verpfl., ohne Ballen	m/m	30-40	4.—	35.—	320.—
Jüngere, 3-4j. Ware s. S. 92	m/m	40-50	5.—	45.—	400.—
Thuja occidentalis, Lebens- baum , mehrfach geschnitten., vollgarnierte Pflanzen, mit festen Ballen	B	60-80	7.—	65.—	600.—
	B	80-100	9.—	80.—	750.—
	B	100-125	10.50	100.—	900.—
	B	125-150	13.—	125.—	1200.—
	B	150-175	20.—	190.—	1700.—
	B	175-200	34.—	330.—	3000.—
	B	200-225	47.—	450.—	4000.—
	B	225-250	67.—	650.—	6000.—
	B	250-275	85.—	800.—	—
	B	275-300	125.—	1200.—	—
	B	300-350	165.—	1600.—	—
Gewöhnliche Heckenware, mit Ballen	B	40-60	4.—	35.—	320.—
	B	60-80	5.—	45.—	400.—
	B	80-100	6.—	55.—	500.—
	B	100-125	7.—	65.—	600.—
	B	125-150	9.—	80.—	720.—
	B	150-175	10.50	100.—	900.—
	B	175-200	17.—	165.—	1500.—
	B	200-225	26.—	250.—	2300.—
	B	225-250	42.—	400.—	3600.—
Ohne Ballen, aus weitem Stand	2× v.	40-60	3.—	22.—	200.—
	2× v.	60-80	3.50	28.—	250.—
	2× v.	80-100	4.—	33.—	300.—
$\frac{0}{000}$ 360.—	4j. v.	20-45	—	4.50	40.—
$\frac{0}{000}$ 400.—	4j. v.	25-50	—	5.—	45.—
$\frac{0}{000}$ 450.—	4j. v.	30-60	—	5.50	50.—
$\frac{0}{000}$ 220.—	3j. v.	12-25	—	3.—	25.—
$\frac{0}{000}$ 270.—	3j. v.	15-30	—	3.50	30.—

IMMERGRÜNE HECKENPFLANZEN

	Alter	Höhe ca. cm	10 St. GM.	100 St. GM.	1000 St. GM.
Thuja occidentalis columna , bildet ohne Schnitt schöne, schlanke, dichtbezweigte Säulen, sehr wertvolle Form, behält im Winter die grüne Farbe	B B B B B B	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	13.— 17.— 23.— 31.— 42.— 57.—	120.— 165.— 225.— 300.— 400.— 550.—	1000.— 1500.— 2000.— 2700.— — —
Vinca major , großblättr. Immer- grün, Blüten groß, dunkelblau		—	5.—	45.—	—
minor , kleinblättriges Immer- grün, mit klein. blauen Blüten und kleineren Blättern . . . schwächere Pflanzen . . .		— —	3.50 2.—	30.— 22.—	— —

Für Heckenpflanzung u. Schutzpflanzung geeignete Laub- und Nadelhölzer

Bei den Sorten, die im Schnitt gehalten werden können, habe ich in cm die ungefähre Höhe, in der sich die betreffende Sorte im Schnitt halten läßt, angegeben. Ungeschnitten werden die Pflanzen ihrem Wuchs entsprechend höher. Bei den Sorten, bei denen Höhenmaße nicht angegeben sind, handelt es sich um ausgesprochene Blütensträucher, die sich ohne Schnitt am schönsten entwickeln.

Die Nummern der Katalogseiten, auf denen die vorrätigen Maße und die Preise verzeichnet sind, stehen in Klammern hinter dem Sortennamen bzw. Höhenmaße.

A. Laubhölzer

Acer campestre 100—500 cm (40/65), Berberis buxifolia dulcis) nana 15—30 cm (44), B. Thunbergi 50—150 cm (19/80), B. Thunbergi atropurpurea 50—150 cm (19), B. vulgaris 50—150 cm (19/81), B. vulg. atropurp. 50—150 cm (19/81), Betula alba 100—500 cm (20/65), Caragana arborescens (20/65), Carpinus betulus 100—400 cm (41), Carp. betulus pyramidalis 100—500 cm [41], Cornus alba 100—200 cm [21/81], C. mas 100—200 cm [41/81], C. sanguinea 50—150 cm [21/81], Corylus Avellana 100—400 cm [22/66], C. maxima atropurpurea 100—500 cm [22], Cotonaster acutifolia 50—180 cm [22], C. applanata 50—200 cm [22/82], C. bullata 50—200 cm [22/82], C. Franchetii 50—180 cm [22], C. moupinensis 50—200 cm [22/82], C. Simonsii 50—150 cm [22/82], Crataegus coccinea 100—500 cm [42/82], C. monogyna und mon. kerm. pl. 100—500 cm [41/22], C. sanguineum 100—500 cm [42], Cydonia japonica 50—200 cm [23], C. japonica Maulei 50—150 cm [42/66], Deutzia crenata Arten [23], D. gracilis (23), D. hybr. Watereri und hybr. Welsi (23), D. Lem. compacta (23), Erica herbacea (carnea) 15—30 cm (44) Evonymus europaea (24/83), E. radicans 20—30 cm (44), E. rad. arg. var. 20—30 cm (44), Fagus sylvatica 100—500 cm (42/66), F. sylv. purpurea 100—500 cm (42), Hippophae rhamnoides (25/83), Ilex aquifolium 100—400 cm (26), I. aquif. pyramidale 100—400 cm (26), Kerria japonica und japon. fl. pl. (27), Laburnum vulgare (27/83), Ligustr. amurense 50—150 cm (27), L. brachystachium (strictum) 50—150 cm (27), L. Ikota 50—150 cm (27), L. ionandrum 50—150 cm (27), L. Lodense 20—50 cm (42), L. ovalifolium 50—200 cm (42/43), L. oval. aureo-marg. 50—150 cm (27), L. vulgare 50—200 cm (43), L. vulg. aurea 25—50 cm (27), L. vulg. atrovirens 50—150 cm (43), Lonicera Morrowii, pileata, tatarica, Xylosteum (28), Lycium halimifolium (28), Mahonia aquifolium 50—150 cm (45), Morus alba 100—200 cm (29/66), Philadelphus Billardi, brachybotris, coronarius, floribundus, Gordonianus, grandiflorus, inodorus, latifolius, Lem. erectus, Lem. Virginal, Satsumi Yokohamae (29/30), Pop. nigra fastigiata 150—600 cm (30/66), Potentilla fruticosa 50—100 cm (30), Prun. Mahaleb 100—300 cm (31), P. Myrabolana 100—400 cm (31), Pr. Padus 100—300 cm (31/85), Pr. Pissardi und Pissardi nigra 100—300 cm (31), Pr. serotina 100—300 cm (31/67), Pr. spinosa 100—300 cm (31/85), Quercus pedunculata (robur) (32/67), Qu. ped. fastigiata 100—700 cm (32), Rhamnus cathartica, Rh. Frangula (32/85), Ribes alpinum 50—100 cm (43), R. arboreum, aureum, floridum, Gordonianum, sanguineum, sang. atrovirens (33), Robinia Pseudoacacia 100—500 cm (34/67), Rosa canina 100—300 cm (34), R. multiflora 100—300 cm (34), R. rubiginosa 100—800 cm (43/86), R. rubrifolia 100—800 cm (34/86), R. rugosa Regelliana und Reg. alba 80—200 cm (43/86), Sambucus nigra und racemosa (35/86), Spiraea albiflora (callosa alba) 30—50 cm (35/86), Sp. araeifolia (35), Sp. arguta (35), Sp. Bum. Anthony Waterer 30—50 cm (35/86), Sp. callosa Froebeli 40—70 cm (35), Sp. Douglasi (35), Sp. Thunbergi 30—50 cm (35), Sp. van Houttei (35), Symphoricarpos orbiculatus und racemosus (36/87), Syringa Rothomagensis, vulgaris, vulgaris alba, vulg. Mariensis (36), Teucrium chamaedrys 15—25 cm (45), Tilia intermedia 100—500 cm T. parvifolia 100—500 cm (45/44), Ulmus campestris 100—500 cm (44/68), U. camp. monumentalis (Wheatleyi) 100—500 cm (38), U. montana 100—500 cm (38/68), U. mont. fastigiata 100—500 cm (38), Viburnum Lantana, opulus und opulus sterile (38/87), Vinca major und minor 20—80 cm (46), Weigelia amabilis und andere starkwüchsige Sorten [38].

B. Nadelhölzer

Buxus sempervirens [arborescens] 20—100 cm [44/89], *B. sufruticosa* 10—30 cm [44], Cham. *Lawsoniana* 100—500 cm [55/68], Cham. *Laws. Alumii* 100—500 cm [55], Cham. *Laws. Fraseri* 100—500 cm [56], Ch. *Laws. monumentalis glauca* 100—500 cm [56], Ch. *Laws. monumentalis nova* 100—500 cm [56], Ch. *Laws. Triumph von Boskoop* 100—500 cm [56], Ch. *pisifera* 100—500 cm [57], Ch. *pisifera aurea* 100—500 cm [57], Ch. *pisifera plumosa* 100—400 cm [57], Ch. *pisifera plumosa aurea* 100—400 cm [57], Ch. *pisifera squarrosa* 100—300 cm [57], *Juniperus communis* 50—200 cm [58/90], *J. comm. hibernica* und *suecica* 50—200 cm [58], *J. virginiana* 50—200 cm [58/90], *Larix europaea* und *leptolepis* 100—500 cm [58/68], *Picea alba* 100—500 cm [59/69], *P. excelsa* 100—500 cm (59/69), *P. Omorica* 100—500 cm (59), *P. pungens* 100—500 cm (59/69), *P. pungens glauca* 100—500 cm (59/69), *P. sitchensis* 100—500 cm (60/69), *Pinus montana* 50—150 cm (61/69), *P. mont. mughus* 30—100 cm (61/69), *P. montana pumilio* 20—60 cm (61), *P. mont. uncinata* 50—200 cm (61), *P. Strobus* 100—500 cm (61/69), *Pseudotsuga Dougl. caesia* 100—500 cm (61/70), *Taxus baccata* 30—500 cm (45/92), *T. bacc. erecta Overeynderi* 30—500 cm (62), *Thuja gigantea aurea* 100—500 cm (63), *Th. occidentalis* 50—500 cm (45), *Th. occ. columnata* 50—500 cm (46), *Th. occ. Ellwangeriana* und *Ellwang. elegantissima* 50—200 cm (63), *Th. occ. fastigiata* 50—500 cm (63), *Th. occ. pyramidalis* 50—500 cm (64), *Th. occ. Rosenthalii* 50—500 cm (64), *Th. occ. spiralis* 50—500 cm (64), *Th. occ. Wareana* 50—500 cm (64), *Tsuga canad.* 50—500 cm (64/93).

Allee- und Parkbäume

Der Stammumfang ist in Zentimetern auf 1 m über der Erde gemessen. Die Krone beginnt durchweg 2 bis 2 1/2 m über der Erde. **Halb- oder Mittelstämme mit niedrigeren Stammhöhen siehe unter „Ziergehölze“.**

Ein Stammdurchmesser von:	entspricht einem Stammumfang von:
19—25 mm	ca. 6—8 cm
25—30 "	" 8—9 "
30—35 "	" 10—12 "
35—45 "	" 12—14 "
45—50 "	" 14—16 "
50—55 "	" 16—18 "
55—65 "	" 18—20 "
65—70 "	" 20—22 "
70—80 "	" 22—25 "

	St. Umf. in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Acer, Ahorn				
campestre, Feldahorn	7—8	2.75	26.—	250.—
	8—10	4.—	38.—	350.—
	10—12	5.—	48.—	450.—
dasycarpum, amerikanischer Silberahorn	8—10	2.50	23.—	200.—
	10—12	3.—	29.—	270.—
	12—14	4.50	43.—	400.—
dasycarpum pyramidale, Wuchs aufrecht, pyramidal	7—8	2.75	26.—	250.—
	8—10	4.—	38.—	350.—
	10—12	5.50	53.—	500.—
	12—14	7.—	67.—	650.—
Negundo, Eschenahorn	7—8	1.65	16.—	150.—
	8—10	2.50	23.—	200.—
	10—12	3.—	29.—	270.—
Negundo arg. variegatum, weißbunt- blättrig	8—10	2.25	21.—	200.—
Negundo Odessanum, goldgelb belaubt Stammhöhe 160—180 cm	8—10	2.25	21.—	200.—
platanooides, Spitzahorn	7—8	1.65	16.—	150.—
	8—10	2.50	23.—	200.—
	10—12	3.—	29.—	270.—
	12—14	4.50	43.—	400.—

ALLEE- UND PARKBÄUME

	St.-Umf. in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Acer plat. globosum , Kugelhorn	8—10	4.—	38.—	350.—
	10—12	5.—	48.—	450.—
	12—14	6.50	62.—	600.—
plat. Schwedleri , Austrieb blutrot, in dunkles Olivgrün übergehend	7—8	3.30	31.—	300.—
	8—10	4.40	42.—	400.—
	10—12	5.50	53.—	500.—
	12—14	7.—	65.—	—
pseudoplatanus , Bergahorn	7—8	1.65	16.—	150.—
	8—10	2.50	23.—	200.—
	10—12	3.—	29.—	270.—
	12—14	4.50	43.—	400.—
pseudoplat. Leopoldi , Austrieb schön rot, Blätter hübsch weiß, gelb und rotbunt ge- färbt Stammhöhe 190 cm	8—10	4.40	42.—	—
pseudoplat. purpurescens , Blattunterseite purpurviolett gefärbt	7—8	2.20	21.—	200.—
	8—10	2.75	26.—	250.—
	10—12	3.50	33.—	320.—
Aesculus , Kastanie				
hippocastanum , Roßkastanie	7—8	3.30	31.—	300.—
	8—10	4.40	42.—	400.—
	10—12	5.50	53.—	500.—
	12—14	6.60	63.—	600.—
hipp. flore pleno , weißgefüllt blühend	14—16	13.—	120.—	—
rubicunda , rotblühende Kastanie	7—8	5.50	53.—	500.—
	8—10	6.60	63.—	600.—
	10—12	8.80	84.—	800.—
	12—14	11.—	105.—	1000.—
Ailanthus glandulosa , Götterbaum	10—12	7.50	70.—	—
	12—14	10.—	90.—	—
Alnus glutinosa und incana , Rot- und Weißerle	7—8	1.20	11.—	100.—
	8—10	1.35	13.—	120.—
	10—12	1.65	16.—	150.—
Betula , Birke				
alba , gemeine Weißbirke, aufrechtwachsend	7—8	1.35	13.—	125.—
	8—10	2.50	23.—	200.—
	10—12	2.90	27.—	250.—
	12—14	4.50	42.—	400.—
mit Erdballen	8—10	2.75	26.—	250.—
" "	10—12	4.—	37.—	350.—
" "	12—14	5.—	47.—	450.—
" "	14—16	6.50	62.—	600.—
alba laciniata , geschlitztblättrig	7—9	5.50	50.—	—
verrucosa , Hängeweißbirke, bei älteren Exemplaren hängen die Zweige leicht über	7—8	1.65	16.—	150.—
	8—10	2.50	23.—	225.—
	10—12	3.30	31.—	300.—
	12—14	5.—	47.—	450.—
mit Erdballen	7—8	2.20	21.—	200.—
" "	8—10	3.—	29.—	280.—
" "	10—12	4.50	42.—	400.—
" "	12—14	5.50	52.—	500.—
Caragana arborescens , Erbsestrauch	8—10	1.65	16.—	150.—
Carpinus betulus , Weißbuche, mit Ballen	7—8	2.75	26.—	250.—
	8—10	3.30	31.—	300.—
	10—12	4.40	42.—	400.—
Castanea vesca , echte, eßbare Kastanie, Marone	10—12	6.50	60.—	—
	12—14	8.—	70.—	—

ALLEE- UND PARKBÄUME

	St. u. Umf. in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Catalpa bignonioides (syringaefolia), Trompetenbaum	8—10 10—14	5. 50 7. —	50. — 60. —	— —
Corylus Columna , Baumhasel	7—8 8—10	6. 50 8. —	62. — 77. —	600. — 750. —
<i>maxima atropurpurea</i> , Bluthasel, Stammhöhe ca. 160 cm	6—8	3. —	28. —	—
Crataegus , Dorn				
<i>Carrieri</i> , mit großblättriger, glänzender Be- laubung und schöner Herbstfärbung,	7—8 8—10	2. 90 3. 70	27. — 34. —	250. — 320. —
<i>Früchte gelbrot, punktiert</i>	7—8	2. 90	27. —	250. —
<i>monogyna fl. albo pleno</i> , weißgefülltblüh.	8—10	3. 70	34. —	320. —
<i>monogyna kermesina pl.</i> dunkelrot gefüllt- blühend	7—8 8—10	2. — 2. 50	18. — 23. —	160. — 200. —
Fagus , Buche				
<i>sylvatica</i> , Rotbuche, mit Ballen	7—8 8—10	4. 50 6. —	42. — 57. —	400. — 550. —
<i>sylv. purpurea</i> , Blutbuche, aus Sämlings- pflanzen gezogen, mit Ballen	7—8 8—10	9. — 12. —	85. — 110. —	— —
<i>sylv. atropurpurea macrophylla</i> , veredelte Blutbuche	7—8 8—10 10—12	15. — 20. — 25. —	— — —	— — —
Fraxinus , Esche				
<i>excelsior</i> , gemeine Esche	7—8 8—10 10—12 12—14	1. 40 2. 20 2. 50 3. 30	13. — 20. — 23. — 31. —	120. — 180. — 200. — 300. —
<i>excelsior aurea</i> , Goldesche mit goldgelbem Holz und sehr schöner, leuchtend gelber Herbstfärbung	8—10 10—12	3. — 3. 50	25. — 30. —	— —
<i>excelsior globosa</i> , Kugelesche	8—10 10—12	3. 30 4. 40	31. — 42. —	300. — 400. —
<i>Ornus</i> , gemeine Blumenesche	8—10 10—12	4. 40 5. 50	42. — 52. —	400. — 500. —
Juglans regia , Walnuß	7—8 8—10 10—12	3. — 3. 70 4. 40	29. — 35. — 42. —	270. — 320. — 400. —
Laburnum , Goldregen				
<i>Adamii</i> , Blüten verschiedenfarbig, rot, gelb und purpurfarben	8—10	4. 50	40. —	—
<i>vulgare</i> , gemeiner Goldregen	7—9	3. 30	31. —	300. —
<i>Vossi</i> , mit bes. langen, gelben Blütentrauben	7—9	4. —	37. —	350. —
Malus floribunda purpurea , Zierapfel				
purpurrot, reichbl., Stammh. 160—180 cm	7—9	2. 75	26. —	250. —
<i>Scheideckerie</i> , Zierapfel, leuchtendrot, gefülltblühend, Stammhöhe 160—180 cm	7—9	2. 75	26. —	250. —
Platanus orientalis acerifolia , Platane .	8—10 10—12 12—14	4. 40 6. — 8. 25	42. — 57. — 79. —	400. — 550. — 750. —
Populus , Pappel				
<i>alba nivea</i> , Silberpappel	8—10 10—12	2. 20 2. 60	20. — 25. —	180. — 240. —
<i>angulata cordata robusta</i> , außerordent- lich starkwüchsig, Blätter sehr groß, hellgrün	8—10 10—12 12—14	2. 20 2. 60 3. —	20. — 25. — 28. —	180. — 240. — 260. —
<i>balsamifera</i> , Balsampappel	10—12 12—14	2. 60 3. —	25. — 28. —	240. — 260. —

ALLEE- UND PARKBÄUME

	St.-Umf. in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St GM.
Populus berolinensis , Berliner Lorbeer-	8-10	2.20	20.—	180.—
pappel	10-12	2.60	25.—	240.—
	12-14	3.20	30.—	280.—
canadensis , kanadische Pappel	7-8	1.20	11.—	100.—
	8-10	1.50	14.—	120.—
	10-12	2.—	18.—	160.—
	12-14	2.20	20.—	180.—
nigra fastigiata , italienische Pyramiden-	8-10	2.50	23.—	200.—
pappel	10-12	2.90	27.—	250.—
	12-14	3.—	29.—	275.—
tremula , Zitterpappel	8-10	2.20	20.—	—
Prunus , Kirsche				
avium plena , weißgefülltblüh. Süßkirsche	8-10	3.—	28.—	275.—
Padus , gemeine Traubenkirsche	8-10	1.80	17.—	160.—
Pissardi , Blutpflaume	7-8	2.20	21.—	200.—
	8-10	3.30	31.—	300.—
Pissardi nigra , Blätter dunkler und größer	7-8	2.20	21.—	200.—
als von Pr. Pissardi	8-10	3.30	31.—	300.—
serrulata Hisakura , Zierkirsche, Blüten	7-8	2.75	26.—	250.—
groß, rosa, halbgefüllt	8-10	3.30	31.—	300.—
triloba plena , Mandelbäumchen				
Stammhöhe 160-180 cm	—	3.30	31.—	300.—
„ 180-200 „	—	3.50	34.—	325.—
Quercus Eiche				
palustris , Sumpfeiche	8-10	7.50	72.—	700.—
	10-12	9.—	85.—	800.—
	12-14	10.—	95.—	900.—
pedunculata (robur) , deutsche Eiche . . .	7-8	3.30	31.—	300.—
	8-10	4.40	42.—	400.—
	10-12	6.—	58.—	550.—
	12-14	6.60	63.—	600.—
rubra , amerikanische Roteiche	7-8	3.50	30.—	280.—
	8-10	4.—	38.—	350.—
	10-12	5.50	53.—	500.—
	12-14	6.60	63.—	600.—
Rhus typhina , Essigbaum	8-10	3.—	27.—	—
Robinia , Akazie				
hispida rosea , rotblühende Akazie . . .	7-9	5.—	45.—	—
Pseudoacacia , gemeine Akazie	7-8	1.50	14.—	135.—
	8-10	2.50	23.—	200.—
	10-12	3.30	31.—	300.—
Pseudoacacia Bessoniana , starkwüchsige	8-10	2.90	27.—	250.—
Kugelakazie	10-12	3.50	33.—	300.—
	12-14	4.—	37.—	350.—
Pseudoacacia inermis , echte Kugelakazie	8-10	2.90	27.—	250.—
	10-12	3.50	33.—	300.—
	12-14	4.—	37.—	350.—
Salix daphnoides latifolius glabra , Weide,				
starkblaubereift, mit großen, goldgelben	8-10	2.—	18.—	170.—
Kätzchen	10-12	2.75	25.—	—
Sophora japonica , Schnurbaum	8-10	6.—	57.—	550.—
	10-12	7.—	67.—	650.—
Sorbus , Eberesche				
aria lutescens , Mehlbeere, Austrieb gelb-	8-10	2.90	27.—	250.—
lich, Blätter unterseits silberweiß . . .	10-12	3.80	36.—	330.—
	12-14	4.40	42.—	400.—

ALLEE- UND PARKBÄUME

	St. + Umf. in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM
Sorbus aucuparia , gemeine Eberesche	8—10	2.50	23.—	200.—
	10—12	3.—	29.—	270.—
	12—14	4.40	42.—	400.—
aucuparia moravica , süßfrüchtige, eßbare Eberesche	8—10	2.90	27.—	250.—
	10—12	3.80	36.—	330.—
	12—14	4.40	42.—	400.—
scandica , nordische Eberesche	7—8	1.50	13.—	120.—
	8—10	2.50	23.—	200.—
	10—12	3.—	29.—	270.—
	12—14	4.40	42.—	400.—
Syringa vulgaris , in veredelten Sorten Stammhöhe 160—180 cm	—	4.50	42.—	400.—
„ 180—200 „	—	5.50	52.—	500.—
Tilia , Linde				
americana megaladonta , sehr großblättrig, Wuchs pyramidal, das Laub haftet bis spät in den Herbst	8—10	5.—	48.—	450.—
	10—12	6.60	63.—	600.—
	12—14	8.25	79.—	750.—
argentea , starkwüchsig, Blätter groß, hell- grün, unterseits etwas weißlich, haften bis spät in den Herbst	8—10	5.—	48.—	450.—
	10—12	6.60	63.—	600.—
	12—14	8.25	79.—	750.—
	14—16	12.—	110.—	1000.—
euchlora , Krimlinde	7—8	4.—	37.—	350.—
	8—10	5.—	48.—	450.—
	10—12	6.60	63.—	600.—
intermedia , holländische Linde	8—10	5.—	48.—	450.—
	10—12	6.60	63.—	600.—
	12—14	8.25	79.—	750.—
	14—16	12.—	110.—	1000.—
	16—18	15.—	145.—	1400.—
	18—20	19.—	181.—	1700.—
	20—24	22.—	210.—	2000.—
parvifolia , kleinblättrige oder Steinlinde, beste Bienenlinde, winterhart, sehr zu empfehlen	7—8	2.75	26.—	250.—
	8—10	5.—	48.—	450.—
	10—12	6.60	63.—	600.—
	12—14	8.25	79.—	750.—
platiphyllus (grandifolia) , großblättrige Linde, Sommerlinde	7—8	2.75	26.—	250.—
	8—10	4.—	38.—	350.—
	10—12	5.—	48.—	450.—
	12—14	6.60	63.—	600.—
tomentosa (argentea) , echte, ungarische Silberlinde	8—10	6.60	63.—	600.—
	10—12	8.25	79.—	750.—
	12—14	10.—	95.—	900.—
Ulmus , Ulme, Rüster				
americanus , Weißrüster, mit überhängenden Zweigen	7—8	1.40	13.—	120.—
	8—10	1.90	17.—	150.—
campestris , Feldrüster	7—8	1.40	13.—	120.—
	8—10	1.90	17.—	150.—
	10—12	2.50	23.—	200.—
	12—14	2.90	27.—	250.—
camp. Louis van Houtte , Goldrüster	8—10	2.75	26.—	250.—
camp. monumentalis (Wheatleyi) , schnell- wüchsige, sehr empfehlenswerte Ulme mit guter Kronenbildung	7—8	2.—	19.—	180.—
	8—10	3.50	33.—	300.—
	10—12	4.40	42.—	400.—
	12—14	5.—	48.—	450.—
	14—16	7.—	67.—	650.—

ALLEE- UND PARKBÄUME

	St.-Umf. in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Ulmus camp. pyramidalis Hörsholmi , sehr guter Straßenbaum von kräftigem, auf- rechtem Wuchs	8-10 10-12 12-14	3.50 4.40 5.—	33.— 42.— 48.—	300.— 400.— 450.—
camp. Rueppelii , Kugelrüster, ähnl. wie U. camp. umbraculifera, von regelmäßigem Wuchs	8-10 10-12	3.50 4.40	33.— 42.—	300.— 400.—
camp. umbraculifera , Kugelrüster, bildet ohne Schnitt kugelförmige Kronen . .	8-10 10-12	3.50 4.40	33.— 42.—	300.— 400.—
hollandica , holländische Rüster	8-10 10-12	1.90 2.50	17.— 23.—	150.— 200.—
montana , Bergrüster	7-8 8-10 10-12 12-14 14-16	1.40 1.90 2.50 2.90 4.—	13.— 17.— 23.— 27.— 37.—	120.— 150.— 200.— 250.— 350.—
montana fastigiata , schöne dickzweigige Form von pyramidalem Wuchs, mit eng- anliegenden, gekräuselten, dunkelgrünen Blättern	7-8 8-10 10-12 12-14	2.— 2.75 4.— 5.—	19.— 26.— 37.— 47.—	180.— 250.— 350.— 450.—
montana Pitteursi , bester Alleebaum für rauhe Lagen, bildet ohne Schnitt schöne, geschlossene Kronen	7-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20	1.40 1.90 2.50 2.90 4.— 5.50 7.—	13.— 17.— 23.— 27.— 37.— 52.— 67.—	120.— 150.— 200.— 250.— 350.— 500.— 650.—
vegeta , Chichester-Ulme, noch schnell- wüchsiger und großblättriger als Ulmus Pitteursi	7-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20	1.40 1.90 2.50 2.90 4.— 5.50 7.—	13.— 17.— 23.— 27.— 37.— 52.— 67.—	120.— 150.— 200.— 250.— 350.— 500.— 650.—

Trauerbäume

	Stamm- umfang in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 GM. GM.
Betula alba pendula Youngi , Hochstämme, Trauerbirke	7-8 8-10	6.50 7.50	62.— 72.—	600.— 700.—
Von unten an garniert, 125-150 cm	—	2.50	23.—	—
mit geradem Mitteltrieb 150-200 „	—	3.30	30.—	—
200-250 „	—	4.50	40.—	—
250-300 „	—	5.50	50.—	—
Caragana arborescens pendula , Trauer- erbsebaum	7-9	3.75	35.—	—
Fagus sylvatica pendula , Hochstämme Trauerbuche	7-8 8-10 10-12	15.— 20.— 25.—	135.— 180.— 225.—	— — —
Von unten an garniert, 100-125 cm	—	3.—	27.—	—
mit geradem Mitteltrieb 125-150 „	—	4.50	40.—	—
150-175 „	—	7.50	70.—	—
175-200 „	—	9.—	80.—	—
200-250 „	—	11.—	100.—	—
250-300 „	—	18.—	170.—	—
sylvatica atropurpurea pendula , Trauer- blutbuche, von unten an 80-100 cm	—	3.—	27.—	—
garniert, mit geradem 100-125 „	—	4.50	40.—	—
Mitteltrieb 125-150 „	—	7.50	70.—	—

TRAUERBÄUME — KONIFEREN

	Stamm- umfang in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Fraxinus excelsior pendula , Hochstämme Traueresche	8—10 10—14	2.75 4.—	26.— 37.—	250.— 350.—
Malus Excellenz Thiel , schöner Trauer- baum, Blüten zartrosa, Mai, im Herbst reich mit klein., wachsgelben, rotbackigen Aepfelchen bedeckt Büsche 100-150 cm	—	0.85	8.—	75.—
pendula Elise Rathke , starkhängender Trauerapfel, Früchte ziemlich groß, prächtig gefärbt Hochstämme	7—9	4.—	35.—	—
Pirus salicifolia pendula , Trauerbirne, Blätter weidenartig, schön silberweiß, reichbl., weiß, Halbstämme, Stammh.ca.	150	2.20	20.—	—
Prunus serrulata Shidare Sakura , rosa gefülltbl. Trauerkirsche, Hochstämme Halbstämme	7—10 —	4.— 2.—	35.— 18.—	— —
Büsche 80—125 cm	—	1.65	15.—	—
Salix alba vitellina pendula nova , Trauerdotterweide, Hochstämme	8—10 10—12 12—14	2.75 3.30 4.—	26.— 31.— 37.—	250.— 300.— 350.—
Von unten an garniert, 150—200 cm	—	0.90	8.50	80.—
mit geradem Mitteltrieb 200—250 „	—	1.50	14.—	130.—
250—300 „	—	2.—	19.—	180.—
300—400 „	—	2.75	26.—	250.—
400—500 „	—	3.30	31.—	300.—
caprea pendula , Hochstämme	7—8	2.75	25.—	—
Trauerkätzchenweide „	8—10	3.30	30.—	—
Trauerrosen , siehe Seite 8				
Ulmus montana pendula , Hochstämme	8—10	2.75	26.—	250.—
Trauerulme „	10—12	4.—	37.—	350.—
„	12—14	5.—	45.—	—

Koniferen (Nadelhölzer)

Sämtliche Koniferen sind mehrmals verpflanzt, gut garniert und haben feste Wurzelballen. Die Pflanzen werden erst unmittelbar vor dem Versand herausgenommen. Da der Ballen während des Transports leicht etwas austrocknet, die Pflanzen aber, wenn sie erst ballentrocken geworden sind, oftmals nicht gut anwachsen, sind Koniferen vor dem Pflanzen durchdringend zu wässern und beim Pflanzen einzuschlämmen. Die Ballentücher, in die die Pflanzenballen eingebunden werden, sind nicht abzunehmen, sondern mit in die Erde zu bringen.

	Höhe in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Abies, Tanne, Edeltanne				
amabilis, Purpurtanne, harte Tanne von herrlichem Wuchs mit blaugrüner Benad.	40—50	5.—	45.—	—
balsamea, Balsamtanne, Benadelung dun- kelgrün, duftend	30—40	0.60	5.50	50.—
	40—60	0.70	6.50	60.—
	60—80	0.90	8.50	80.—
	80—100	1.30	12.50	120.—

KONIFEREN [NADELHÖLZER]

	Höhe in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Abies concolor , kalifornische Weißtanne, Benadelung blaugrau, sehr lang- u. breit- nadelig	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	2.20 3.75 5.50 7.50 16.—	21.— 36.— 52.— 70.— 150.—	200.— 350.— 500.— — —
grandis , mit langer, glänzendgrüner Be- nadelung, schlank pyramidal wachsend	30—40 40—60 60—80	1.— 1.40 2.20	9.50 13.— 21.—	90.— 125.— 200.—
Nordmanniana , Nordmannstanne, sehr breitwüchsig, dunkelgrün	30—40 40—60 60—80 150—175 175—200 200—250 250—300 300—350 350—400	2.— 2.75 5.— 25.— 30.— 35.— 40.— 45.— 50.—	19.— 26.— 47.— — — — — — —	180.— 250.— 450.— — — — — — —
Veitchii , Veitchs Weißtanne, s. empfehlens- werte, schöne, ganz harte Tanne, Bena- delung oberseits glänzend grün, unter- seits silberweiß	30—40 40—60 60—80 80—100	2.20 4.50 6.50 9.—	21.— 40.— 60.— 85.—	200.— — — —
Araucaria imbricata , chilenische Araukarie, Schmucktanne mit quirliger Verästelung, gleichartig dicht um die Triebe gestell- ten steifen, stechenden Nadeln, glänzend grün	20—25 25—30 30—40	2.75 4.— 5.50	25.— 35.— 50.—	— — —
Buxus , Buchsbaum				
japonica aurea , Belaubung hübsch gold- gelb, 20—25 cm hoch und breit	20—25	0.85	8.—	75.—
sempervirens (arborescens) , baumartiger Buchsbaum	Breite $\frac{0}{100}$			
Büsche mit Ballen	15—20 cm 360.— 17—25 „ 650.— 20—30 „ 1000.— 30—40 „ 1400.— 2250.— 3600.—	20—30 0.50 30—40 0.85 40—50 1.20 50—60 1.65 60—70 2.75 70—80 4.40 80—100 6.—	4.50 8.— 11.50 16.— 26.— 42.— 57.—	40.— 75.— 110.— 150.— 250.— 400.— 550.—
Extra breite Büsche				
Geschnittene Kugeln, Breite wie Höhe	20—25 25—30 30—35 35—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90	1.35 2.— 2.75 4.— 5.— 6.50 9.— 12.— 16.—	13.— 19.— 26.— 37.— 47.— 62.— 85.— 110.— 150.—	120.— 180.— 250.— 350.— 450.— 600.— 800.— — —
Kronenstämme				
Kronendurchm.	30—40 cm Stammhöhe 30—40 cm „ 40—50 cm „ 40—50 cm „	30—40 6.— 40—50 7.— 40—50 7.50 50—60 10.—	55.— 65.— 70.— 95.—	— — — —

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Buxus, Buchsbaum				
Geschnittene Pyramiden	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—50	1.65	16.—	150.—
	50—60	2.75	26.—	250.—
	60—70	4.—	37.—	350.—
	70—80	5.—	47.—	450.—
	80—90	6.50	62.—	600.—
	90—100	8.—	77.—	750.—
	100—120	11.—	100.—	—
	120—140	15.—	140.—	—
	140—160	18.—	170.—	—
Viereckig geschnittene Formen, unten 60—70 cm, oben 40—50 cm br.	40—50	16.—	150.—	—
sempervirens Handsworthi , mit dunkel- grüner, großblättriger Belaubung	20—30	0.60	5.50	50.—
	30—40	1.—	9.50	90.—
	100—120	12.—	—	—
Cedrus, Zeder				
atlantica glauca , blaugrüne Form der At- las-Zeder von schönem, pyramidalem Wuchs	60—80	4.—	35.—	—
	80—100	5.50	50.—	—
	100—125	7.50	70.—	—
	125—150	12.—	—	—
deodara , Himalaya-Zeder, hoher Baum, mit vollpyramidaler Krone, die Zweige hängen bei jüngeren Exemplaren leicht über	30—40	2.—	18.—	—
	40—60	2.75	25.—	—
	60—80	4.—	35.—	—
	80—100	5.50	—	—
Chamaecyparis Lebensbaum-Zypresse, Lawsoniana , Lawsons-Zypresse, gewöhn- liche Zypresse	40—60	0.50	4.50	40.—
	60—80	0.70	6.50	60.—
	80—100	0.90	8.50	80.—
	100—125	1.10	10.50	100.—
	125—150	2.20	21.—	200.—
	150—175	3.30	31.—	300.—
	175—200	5.—	47.—	450.—
	200—225	7.50	72.—	700.—
	225—250	9.50	92.—	900.—
	250—300	15.—	140.—	—
	300—350	20.—	—	—
Laws. Alumii , von säulenförmigem Wuchs und stahlblauer Färbung	40—60	0.60	5.50	50.—
	60—80	0.85	8.—	75.—
	80—100	1.10	10.50	100.—
	100—125	1.65	16.—	150.—
	125—150	2.70	26.—	250.—
	150—175	4.40	42.—	400.—
Laws. coerulea , sehr schöne Art von bläulicher Färbung und lockerem Wuchs	40—60	0.75	7.—	65.—
	60—80	1.10	10.50	100.—
	80—100	1.65	16.—	150.—
	175—200	9.—	85.—	800.—
	200—225	13.—	125.—	1200.—
	225—250	17.—	165.—	1600.—
Laws. erecta viridis , schlank aufrecht wachsend, lebhaft grün bezweigt	40—60	0.70	6.50	60.—
	60—80	0.95	9.—	85.—
	80—100	1.25	12.—	110.—
	100—125	1.75	17.—	160.—
Laws. Fletcheri , langsam dicht säulenförm. wachsende Art mit gefiederter, krauser, blaugrüner Bezweigung	40—60	2.—	18.—	—

KONIFEREN (NADELPLANZEN)

	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Chamaecyparis, Lebensbaum - Zypresse				
Laws. forsteckensis , ganz dicht- und kurz- zweigige, graugrüne Zwergform	15—20	2.20	21.—	—
	20—25	2.75	26.—	—
Laws. Fraseri , bildet säulenförmige Pyra- miden von dunkelblaugrüner Farbe	40—60	0.60	5.50	50.—
	60—80	0.85	8.—	75.—
	80—100	1.10	10.50	100.—
	100—125	1.65	16.—	150.—
	125—150	2.70	26.—	250.—
	150—175	4.40	42.—	400.—
	175—200	6.50	62.—	600.—
	200—225	9.50	92.—	900.—
	225—250	13.—	125.—	1200.—
	250—300	20.—	180.—	—
Laws. glauca nivea , zierliche, weißlich- blau bezweigte Form von gedrunenem Wuchs	60—80	0.85	8.—	75.—
	80—100	1.10	10.50	100.—
	100—125	1.65	16.—	150.—
	175—200	6.50	62.—	600.—
	200—225	9.50	92.—	900.—
	225—250	13.—	125.—	1200.—
Laws. glauca Veitch , von geschlossenem, aufrechtem Wuchs mit leicht überhän- genden Zweigspitzen und ausgeprägt stahlblauer Färbung	40—60	0.75	7.—	65.—
	60—80	1.10	10.50	100.—
	80—100	1.65	16.—	150.—
Laws. intertexta , sehr hübsche, auffallende Form von lockerem Wuchs mit weitge- stellten, überhängenden Zweigen, blau- grün	40—60	1.20	10.—	—
	60—80	1.50	13.—	—
	80—100	2.—	18.—	—
Laws. minima glauca , dicht und breit wachsende Zwergform, dunkelblaugrün	20—30	2.20	21.—	200.—
	30—40	3.75	36.—	350.—
	40—50	5.50	52.—	500.—
Laws. monumentalis glauca , Wuchs schön pyramidal, Belaubung blaugrün	60—80	0.85	8.—	75.—
	80—100	1.10	10.50	100.—
	100—125	1.65	16.—	150.—
Laws. monumentalis nova , sehr schöne, hellblau gefärbte Art, Wuchs pyramidal	60—80	0.85	8.—	75.—
	80—100	1.10	10.50	100.—
	100—125	1.65	16.—	150.—
Laws. Silver Queen , sehr hübsche Form von lockerem Wuchs, mit silberschim- mernder Belaubung	40—60	1.20	10.—	—
	60—80	1.50	13.—	—
	80—100	2.—	18.—	—
Laws. Stewardtii , auffallende, intensiv goldgelb gefärbte Form von säulenfö- rmigem Wuchs	40—60	2.—	18.—	—
	60—80	3.50	30.—	—
	80—100	4.50	40.—	—
Laws. Triumph von Boskoop , sehr schöne Form von schmalpyramidalem Wuchs mit graublauer, silbrigschimmernder Belau- bung	40—60	0.75	7.—	65.—
	60—80	1.10	10.50	100.—
	80—100	1.65	16.—	150.—
	100—125	2.75	26.—	250.—
	125—150	5.—	47.—	450.—
	150—175	6.50	62.—	600.—
	175—200	9.—	85.—	800.—
	200—225	13.—	125.—	1200.—
	225—250	17.—	165.—	1600.—
	250—300	25.—	230.—	—
	300—350	29.—	270.—	—
Laws. Wisselii , eigenartige, säulenförmig wachs. Art mit aufrechtstehenden, an- liegenden Zweigen und dichter, kurzer schwärzlichgrüner Belaubung	30—40	0.90	8.—	—
	40—60	1.20	10.—	—
	60—80	1.50	13.—	—
	80—100	2.—	18.—	—

KONIFEREN (NADELHÖZER)

	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Chamaecyparis, Lebensbaum - Zypresse				
<i>nutkaensis glauca</i> , sehr dekorativ, Wuchs schmalpyramidal, Belaubung blaugrün, leicht überhängend, winterhart	40—60 60—80	4.50 5.50	40.— 50.—	— —
<i>obtusa Crippsii</i> , zierliche, pyramidal und dichtwachsende Form von leuchtend gelber Färbung	30—40 40—50 50—60	2.20 3.— 3.50	20.— 27.— 32.—	— — —
<i>obtusa nana gracilis</i> , sehr langsam wachs. niedrige, flach ausgebreitete Zwergform mit dunkelgrüner, fächerartiger Bezwei- gung, für Steingärten	15—20 20—25 25—30	2.20 2.75 3.30	21.— 26.— 31.—	200.— 250.— 300.—
<i>obtusa pygmaea</i> , zierliche, sehr niedrige, Zwergform, für Steingärten sehr geeignet	15—20 20—30 30—40	2.20 2.75 3.30	21.— 26.— 31.—	— — —
<i>pisifera</i> , leichtbezweigte, frischgrüne Form	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	0.70 1.20 2.20 3.30 4.50 5.50 7.—	6.50 11.— 21.— 31.— 42.— 52.— 67.—	60.— 100.— 200.— 300.— 400.— 500.— 650.—
<i>pisifera aurea</i> , sehr harte Art mit inten- siv goldgelb gefärbter Belaubung	40—60 60—80 80—100 100—125	1.20 2.— 3.30 5.—	11.— 19.— 31.— 47.—	100.— 180.— 300.— 450.—
<i>pisifera filifera</i> , winterharte Art mit grau- grünen, fadenförmig lang überhängenden Zweigen	40—60 60—80 80—100	1.75 2.75 5.50	16.— 26.— 52.—	150.— 250.— 500.—
<i>pisifera filifera nana</i> , dichtbuschige Zwerg- form mit fadenförmigen Zweigen	40—50 50—60	3.— 4.—	27.— 36.—	— —
<i>pisifera plumosa</i> , bildet schöne, dichtge- schlossene Pyramiden, Bezweigung strau- ßenfederartig gekräuselt, dunkelgrün	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	0.55 0.70 0.90 1.20 1.65 2.20 3.30 5.—	5.— 6.50 8.50 11.— 16.— 21.— 31.— 47.—	45.— 60.— 80.— 100.— 150.— 200.— 300.— 450.—
<i>pisifera plumosa aurea</i> , sehr schöne gold- gelb gefärbte Form der vorigen, winter- hart	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	0.55 0.70 0.90 1.20 1.65 2.20	5.— 6.50 8.50 11.— 16.— 21.—	45.— 60.— 80.— 100.— 150.— 200.—
<i>pisifera squarrosa</i> , von pyramidalem Wuchs mit leicht überhängenden Zweigen, Be- laubung silbergrau	30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	0.70 0.90 1.65 2.75 4.40 5.50	6.50 8.50 16.— 26.— 42.— 50.—	60.— 80.— 150.— 250.— 400.— —
<i>sphaeroidea andelyensis</i> , aparte Form von schmalem, dichtkegelförmig. Wuchs	40—60	3.—	27.—	—
Cryptomeria japonica , jap. Cryptomerie, sehr dekorative Konifere von breitpyra- midalem Wuchs, lichtgrün belaubt	60—80 80—100 100—125	0.90 1.30 1.75	8.50 12.50 17.—	80.— 120.— 160.—

KONIFEREN [NADELHÖLZER]

Vorrätige Sorten:	Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Juniperus, Wacholder				
<i>chinensis</i> Pfitzeriana, von breitpyramidalem Wuchs mit kräftigen, fast wagerecht abstehenden Aesten, zierlich graugrün belaubt, Zweigspitzen leicht überhäng.	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—60	1.65	16.—	150.—
	60—80	2.75	26.—	250.—
	80—100	4.—	38.—	375.—
	100—125	5.50	52.—	500.—
<i>communis</i> , gemeiner Wacholder	30—40	0.50	4.50	40.—
	40—60	0.75	7.—	65.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
	80—100	2.20	21.—	200.—
	100—125	3.30	31.—	300.—
<i>communis</i> cracovica, raschwüchsige, säulenförmig aufrecht wachsende Art mit hellgrüner Benadelung	80—100	2.75	25.—	—
	100—125	4.—	36.—	—
<i>communis</i> hibernica, irischer Säulenwacholder, bildet blaugrüne, schmale Pyramiden	30—40	0.60	5.50	50.—
	40—60	0.85	8.—	75.—
	60—80	1.40	13.—	125.—
	80—100	2.20	21.—	200.—
	100—125	3.30	31.—	300.—
	125—150	4.40	42.—	400.—
<i>communis</i> suecica, schwedischer Säulenwacholder, ähnlich wie J. hibernica, mit nickenden Zweigspitzen, unempfindlich gegen Pilzbefall	30—40	0.60	5.50	50.—
	40—60	0.85	8.—	75.—
	60—80	1.40	13.—	125.—
	80—100	2.20	21.—	200.—
	100—125	3.30	31.—	300.—
	125—150	4.40	42.—	400.—
<i>japonica aurea</i> , wertvolle, sehr dekorative, breitw. Form mit häng. Zweig., goldgelb	30—40	4.—	36.—	—
	40—50	5.—	45.—	—
<i>Sabina femina</i> und <i>mas</i> , Breite	30—40	1.20	11.—	100.—
Sadebaum, breitverzweigter	40—60	1.65	16.—	150.—
Strauch von kriechendem Wuchs,	60—80	2.75	26.—	250.—
dunkelgrün	80—100	4.40	42.—	400.—
	100—120	7.50	—	—
<i>Sabina tamariscifolia</i> , sehr breitwüchs., niedr. Form, bläulichgrün	30—40	3.—	28.—	—
	40—60	4.50	40.—	—
<i>virginiana</i> , virginisch. Wacholder, aufrecht, dicht geschlossen wachsend, graugrün bezweigt	30—40	0.50	4.50	40.—
	40—60	0.75	7.—	65.—
	60—80	1.20	11.—	100.—
<i>virginiana glauca</i> , von kräftigem, pyramidalem Wuchs, schöne, blaugrüne Bezweigung	40—60	2.75	25.—	—
	60—80	4.—	35.—	—
	80—100	5.50	50.—	—
	100—125	7.50	70.—	—
Larix, Lärche				
<i>europaea</i> , gemeine europäische Lärche	80—100	0.70	6.50	60.—
	100—150	1.20	11.—	100.—
	150—200	1.90	18.—	175.—
	200—250	2.75	26.—	250.—
<i>leptolepis</i> , japanische Lärche, weniger anspruchsvoll auf Boden und Lage, starkwüchsig, mit blaugrüner Benadelung und braunrotem Holz	80—100	0.60	5.50	50.—
	100—150	0.90	8.50	80.—
	150—200	1.55	15.—	140.—
	200—250	2.—	19.—	180.—
	250—300	2.75	26.—	250.—

KONIFEREN [NADELHÖLZER]

		Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Picea, Fichte, Tanne					
alba, nordamerikanische Weißfichte von pyramidalem Wuchs, mehr oder weniger blaugrün gefärbt		40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	0.60 0.85 1.25 1.65 2.40 3.30 4.40	5.50 8.— 12.— 16.— 23.— 31.— 42.—	50.— 75.— 110.— 150.— 225.— 300.— 400.—
excelsa, gemeine Fichte oder Rottanne	1000 St. 400.— 540.— 800.— 1000.— 1350.—	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150	0.55 0.70 1.— 1.25 1.65	5.— 6.50 9.50 12.— 16.—	45.— 60.— 90.— 110.— 150.—
Weniger regelmäßig gewachs.	2000.—	150—175	2.40	23.—	225.—
Pflanzen für Hecken, Gruppen	3000.—	175—200	3.50	34.—	330.—
etc. geeignet, 33 ¹ / ₃ % billiger!	4000.—	200—250 250—300	4.75 6.—	46.— 57.—	440.— 550.—
excelsa compacta nana, zierliche Zwerg- form von dichtem, rund- 20—30 cm breit lichem Wuchs 30—40 " "		15—20 20—25	2.20 3.—	21.— 29.—	200.— 275.—
excelsa pumila glauca, flachrunde, ganz dichte, kurznaдлиge Art, 30—40 cm breit dunkelblaugrün 30—40 " " 40—50 " "		20—30 30—40 40—50	2.20 3.30 4.40	21.— 31.— 42.—	200.— 300.— 400.—
excelsa pygmaea, Wuchs kegelförmig, ganz dicht benadelt und bezweigt		20—30 30—40	2.20 3.30	21.— 31.—	200.— 300.—
excelsa Remontii, besonders regelmäßig spitzkegelförmig wachsende Zwergform, hellgrün		20—30 30—40 40—50	3.50 5.— 6.50	30.— 45.— 60.—	— — —
Omorica, Omorikafichte, serbische Fichte von schmalem, säulenförmigem Wuchs mit leicht hängenden Zweigspitzen und dichter, dunkelgrüner, unterseits silber- weiß gefärbter Benadelung, unempfindl. gegen Ruß und Rauch. Sehr wertvolle, zu empfehlende Fichte		30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—225	1.20 2.— 2.60 3.50 4.— 5.50 7.— 9.— 11.—	11.— 19.— 25.— 32.— 38.— 52.— 67.— 87.— 100.—	100.— 180.— 240.— 300.— 375.— 500.— 650.— 850.— —
orientalis, morgenländische Fichte, von breitkegelförmigem Wuchs, mit sehr feiner, dichter, glänzend grüner, kurzer Benadelung		20—30 30—40 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200 200—250 250—300	0.70 1.35 6.50 8.50 11.— 14.— 22.— 35.— 45.—	6.50 13.— 62.— 82.— 105.— — — — —	60.— 125.— 600.— 800.— 1000.— — — — —
pungens, Stechfichte, vollständig harte Art mit steifen, abstehenden, kräftig grau- grün gefärbten Nadeln Ohne Ballen zum Eintopfen, siehe Seite 96		30—40 40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	0.50 0.70 1.20 2.20 3.75 5.50 7.—	4.50 6.50 11.— 21.— 36.— 52.— 67.—	40.— 60.— 100.— 200.— 350.— 500.— 650.—

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

	Höhe in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Picea, Fichte, Tanne				
pungens glauca , aus Samen gezogene, ausgesucht blaugefärbte Pflanzen	30—40	1.65	16.—	150.—
	40—60	2.75	26.—	250.—
	60—80	4.40	42.—	400.—
	80—100	7.50	72.—	700.—
Pflanzen mit Fehlern, für Gruppen ge- eignet, sind 40 Prozent billiger	100—125	13.—	120.—	—
	125—150	17.—	160.—	—
	150—175	22.—	200.—	—
Pflanzen ohne Ballen zum Eintopfen, siehe Seite 96	175—200	26.—	250.—	—
	200—225	28.—	—	—
	225—250	32.—	—	—
	250—300	35.—	—	—
pungens glauca Kosteri , Veredlungen, sehr langnadelig und intensiv blaugrau gefärbt	30—40	3.30	31.—	300.—
	40—50	5.50	52.—	500.—
	50—60	7.—	67.—	650.—
Pflanzen mit Fehlern, für Gruppen ge- eignet, sind 40 Prozent billiger	60—70	10.—	95.—	900.—
	70—80	12.—	115.—	1100.—
	80—100	19.—	185.—	1800.—
pungens glauca Moerheimi , besonders schöne, außerordentlich langnadelige und leuchtend blaugrau gefärbte Art	30—40	4.—	36.—	—
	40—60	7.—	65.—	—
	60—80	11.—	100.—	—
	80—100	14.—	125.—	—
pungens glauca Vuyk , wohl die am inten- sivsten blaugefärbte Form, von regel- mäßigem Bau	40—50	10.—	95.—	—
sitchensis , Sitkafichte, Wuchs $\frac{0}{100}$ 400.—	40—60	0.55	5.—	45.—
streng pyramidal, gedeiht am $\frac{0}{100}$ 540.—	60—80	0.70	6.50	60.—
besten in feuchtem, sumpfi- $\frac{0}{100}$ 800.—	80—100	1.—	9.50	90.—
gem Boden $\frac{0}{100}$ 1000.—	100—125	1.25	12.—	110.—
	125—150	1.65	16.—	150.—
	150—175	2.40	23.—	225.—
	175—200	3.50	34.—	330.—
Pinus, Kiefer oder Föhre				
cembra , Zürrbelkiefer, schöne, zierliche Kiefer von dichtem, schmalpyramidalem Wuchs mit stahlblauer Benadelung	30—40	2.20	21.—	200.—
	40—60	3.30	31.—	300.—
	60—80	5.—	47.—	450.—
	80—100	7.—	67.—	—
	150—175	20.—	180.—	—
	175—200	25.—	230.—	—
	200—225	35.—	—	—
contorta , Küsten-Kiefer, kleine, gedrung., pyramidal wachsende Art mit glänzend- frischgrüner Benadelung	40—60	1.10	10.50	100.—
	60—80	1.65	16.—	150.—
	80—100	2.75	26.—	250.—
excelsa , Tränenkiefer, mit lang herunter- hängender, blaugrüner Benadelung, sehr schöne, empfehlenswerte Art	30—40	0.90	8.50	80.—
	40—60	1.35	13.—	120.—
	60—80	2.20	21.—	200.—
	80—100	3.30	31.—	300.—
Jeffreyi , sehr schön blaugrün benadelt, im Austrieb bläulich	30—40	2.20	20.—	—
	40—50	3.30	30.—	—
Laricio austriaca , österreich. Schwarz- kiefer von breitverzweigtem, kräftigem Wuchs, sehr langnadelig	30—40	1.20	11.—	100.—
	40—60	1.85	18.—	175.—
	60—80	2.75	26.—	250.—
	80—100	3.75	36.—	350.—
	100—125	5.50	52.—	500.—

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

		Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Pinus, Kiefer oder Föhre					
montana, Berg- oder Krumm-	0/00 400.—	20—30	0.55	5.—	45.—
holzkiefer, starkwüchsig,	0/00 700.—	30—40	0.90	8.50	80.—
breitverzweigt	0/00 900.—	40—50	1.20	11.—	100.—
	0/00 1350.—	50—60	1.65	16.—	150.—
	0/00 1800.—	60—80	2.20	21.—	200.—
	0/00 3600.—	80—100	4.40	42.—	400.—
	0/00 6000.—	100—125	7.—	67.—	650.—
		125—150	9.—	80.—	—
montana mughus, niederlie-	0/00 540.—	20—30	0.70	6.50	60.—
gende Art der Pinus montana,	0/00 900.—	30—40	1.20	11.—	100.—
von kriechendem Wuchs . . .	0/00 1100.—	40—50	1.35	13.—	125.—
	0/00 1800.—	50—60	2.20	21.—	200.—
	0/00 2700.—	60—80	3.30	31.—	300.—
		80—100	5.50	52.—	500.—
montana pumilio, sehr niedrig bleibende,		20—30	1.65	16.—	150.—
breitwüchsige Form, kurzadelig		30—40	2.20	21.—	200.—
		40—50	3.30	31.—	300.—
montana uncinata, stark und	0/00 400.—	20—30	0.55	5.—	45.—
ziemlich aufrechtwachsend,	0/00 700.—	30—40	0.90	8.50	80.—
Benadelung etwas mehr	0/00 900.—	40—50	1.20	11.—	100.—
blaugrün	0/00 1350.—	50—60	1.65	16.—	150.—
	0/00 1800.—	60—80	2.20	21.—	200.—
silvestris, gemeine Kiefer		40—60	0.70	6.50	60.—
		60—80	1.—	9.50	90.—
		80—100	1.65	16.—	150.—
		200—250	7.50	70.—	—
Strobus, Weymouthskiefer, raschwüchsige		40—60	0.70	6.50	60.—
Kiefer mit langen, feinen, blaugrünen		60—80	0.90	8.50	80.—
Nadeln		80—100	1.35	13.—	120.—
		100—125	2.—	19.—	180.—
		125—150	2.75	26.—	250.—
Pseudotsuga, Douglastanne, schöne					
schnellwüchsige Tanne, für Parkanlagen					
sehr dekorativ, das Holz ist sehr wertv.					
Douglasi caesia, graunadelige Form . . .					
		40—60	0.60	5.50	50.—
		60—80	0.90	8.50	80.—
		80—100	1.20	11.—	100.—
		100—125	1.35	13.—	125.—
		125—150	1.85	18.—	175.—
		150—175	2.75	26.—	250.—
		175—200	3.75	36.—	350.—
		200—250	7.—	67.—	650.—
Douglasi glauca, sehr harte und wertvolle					
Gebirgsform mit schöner, blaugrüner Be-					
nadelung					
		40—60	0.60	5.50	50.—
		60—80	0.90	8.50	80.—
		80—100	1.20	11.—	100.—
		100—125	1.35	13.—	125.—
		125—150	1.85	18.—	175.—
		150—175	2.75	26.—	250.—
		175—200	3.75	36.—	350.—
		200—250	7.—	67.—	650.—
		250—300	10.—	90.—	—
		300—350	13.—	120.—	—
Douglasi glauca pyramidalis, außeror-					
dentlich wertvolle Form von schlankem,					
pyramidalem Wuchs und schöner, blau-					
grüner Färbung					
		50—60	5.—	45.—	—
		60—70	6.—	55.—	—

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

		Höhe ca. cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.	
Taxodium distichum , Sumpfyypresse, Wuchs schön pyramidal, für feuchte Böden, Blätter frischgrün, fallen im Herbst ab		40—60 60—80 80—100 100—125	1.— 1.50 3.— 4.50	9.— 14.— 27.— —	— — — —	
Taxus, Eibe 1000 Stück GM.						
baccata , eines der wertvoll- sten, einheimischen Nadel- hölzer, gedeiht auch noch gut im Schatten, als Solitär- und Heckenpflanze gleich gut geeignet, verträgt jeden Schnitt, von langer Lebens- dauer	Ware Büsche, volle, br. Geschn. Büsche	600.— 800.— 1300.— 1600.— 2250.— 3200.— 4300.— 5300.— 6500.— 8000.—	20—30 30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—90 90—100 100—125 125—150	0.80 1.— 1.70 2.— 2.75 3.80 5.— 6.— 8.— 9.50	7.— 9.50 16.— 19.— 26.— 37.— 47.— 57.— 75.— 90.—	65.— 90.— 150.— 180.— 250.— 350.— 450.— 550.— 700.— 850.—
2mal verpfl. ohne Ballen, für Hecken geeignet, siehe Seite 45			150—175 175—200 200—225 225—250 250—275	15.— 20.— 27.— 32.— 37.—	145.— 195.— 260.— 310.— 360.—	1400.— 1900.— 2500.— 3000.— 3500.—
Ungeschnittene, breite Büsche, teilweise breiter als hoch			40—50 50—60 80—100 100—125 60—70 70—80 80—90 90—100	1.90 2.20 6.— 8.50 3.20 4.50 5.80 7.—	17.— 21.— 57.— 80.— 30.— 42.— 55.— 66.—	170.— 200.— 550.— 750.— 290.— 400.— 520.— 630.—
Geschnittene Pyramiden			100—125 125—150 150—175 175—200 200—225 225—250	9.— 11.— 18.— 25.— 31.— 37.—	85.— 105.— 170.— 240.— 300.— 360.—	800.— 1000.— 1600.— 2300.— 2900.— 3500.—
baccata erecta Overeynderi , von auf- rechtem Wuchs, bildet breite Pyramiden, dunkelgrüne Benadelung			30—40 40—50 50—60 60—70	1.— 1.45 2.— 3.30	9.50 14.— 19.— 31.—	90.— 130.— 180.— 300.—
baccata fastigiata (hibernica) , irländisch. Säulentaxus, bildet schmale Pyramiden, die breiten, tiefdunkelgrünen Nadeln stehen rings um die Zweige			20—30 30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—100 100—125 125—150	1.30 1.65 2.40 3.30 4.40 6.— 8.— 11.— 15.—	12.— 16.— 23.— 31.— 42.— 57.— 77.— 100.— 140.—	110.— 150.— 225.— 300.— 400.— 550.— 750.— 900.— —
baccata fastigiata aureo-variegata , sehr schöne, goldbunte Form			30—40 40—50 50—60 60—70 70—80 80—100 100—125	1.65 2.40 3.30 4.40 6.— 8.— 11.—	16.— 23.— 31.— 42.— 57.— 77.— 100.—	150.— 225.— 300.— 400.— 550.— 750.— 900.—
cuspidata , harte Sorte mit aufstrebenden, teils ausgebreiteten Aesten von gedrung. Wuchs, Benad. etw. heller als von T. baccata			20—30 30—40 40—50	0.85 1.10 1.90	8.— 10.50 18.—	75.— 100.— 170.—

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

Thuja, Lebensbaum

		Höhe in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
<i>gigantea</i> , von üppigem, schlankpyramidal. Wuchs, Belaubung glänzendgrün, auch im Winter konstant		60—80 80—100 100—125 125—150	1.20 1.65 2.20 3.75	11.— 16.— 21.— 36.—	— — — —
<i>gigantea aurescens</i> , sehr schöne, farben- beständige Form von kräftigem Wuchs mit bronze gelben Zweigspitzen		40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175 175—200	0.70 1.20 1.65 2.20 3.75 5.50 8.—	6.50 11.— 16.— 21.— 36.— 52.— 77.—	60.— 100.— 150.— 200.— 350.— 500.— 750.—
<i>occidentalis</i> , abendländischer Lebensbaum	‰ 600.— ‰ 750.—	60—80 80—100	0.80 1.—	7.— 9.—	65.— 80.—
Breite, mehrf geschnittene, vollgarnierte Pflanzen	‰ 900.— ‰ 1200.—	100—125 125—150	1.10 1.40	10.50 13.—	100.— 125.—
Qualitätsware	‰ 1700.— ‰ 3000.—	150—175 175—200	2.10 3.60	20.— 34.—	190.— 330.—
Gewöhnliche Heckenware s. Seite 45	‰ 4000.— ‰ 6000.—	200—225 225—250 250—275 275—300 300—350	5.— 7.— 9.— 13.— 17.—	47.— 67.— 85.— 125.— 165.—	450.— 650.— 800.— 1200.— 1600.—
<i>occidentalis columna</i> , bildet ohne Schnitt schöne, schlanke dichtbezweigte Säulen, sehr schöne Form, behält auch im Winter die grüne Farbe	‰ 1000.— ‰ 1500.— ‰ 2000.— ‰ 2700.—	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	1.40 1.80 2.50 3.30 4.50 6.—	13.— 17.— 23.— 31.— 42.— 57.—	120.— 165.— 225.— 300.— 400.— 550.—
<i>occidentalis elegantissima</i> , wächst schlank pyramidal, dicht und zierlich, mit hell- gelben Zweigspitzen		30—40 40—60 60—80	0.60 0.80 1.20	5.50 7.50 11.—	50.— 70.— 100.—
<i>occ. Ellwangeriana</i> , ganz harte Art, bil- det zierliche, dicht bezweigte, gedrun- gene Pyramiden mit feiner, locker ge- stellter, graugrüner Bezweigung		30—40 40—60 60—80 80—100 100—125	0.60 0.80 1.20 1.85 2.75	5.50 7.50 11.— 18.— 26.—	50.— 70.— 100.— 170.— 250.—
<i>occ. Ellwangeriana elegantissima</i> , mit äußerst zierlicher, feingefiederter Be- zweigung		40—60 60—80 80—100	0.90 1.35 2.—	8.50 13.— 19.—	80.— 120.— 180.—
<i>occ. Ellwangeriana Rheingold</i> , wächst kegelförmig, hellgoldgelb		20—30 30—40	2.20 3.—	— —	— —
<i>occ. fastigiata</i> , bildet ohne Schnitt schlanke, dichtbe- zweigte Säulen, Farbe auch im Winter unverändert hellgrün	‰ 1000.— ‰ 1500.— ‰ 2000.—	40—60 60—80 80—100 100—125 125—150 150—175	1.35 1.80 2.50 3.30 4.50 6.—	13.— 17.— 23.— 31.— 42.— 57.—	120.— 165.— 225.— 300.— 400.— 550.—
<i>occ. globosa</i> , dunkelgrün belaubte, dicht- bezweigte Kugelform		20—30 30—40 40—50 50—60	0.70 1.20 2.— 2.75	6.50 11.— 19.— 26.—	60.— 100.— 180.— 250.—
<i>occ. Hoveyi</i> , gedungen und rundlich wachsende, hellgrüne Form		40—50 50—60 60—70 70—80	2.— 2.20 2.75 3.30	18.— 21.— 26.— 31.—	170.— 200.— 250.— 300.—

KONIFEREN (NADELHÖLZER)

	Höhe in cm	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Thuja, Lebensbaum				
occ. pyramidalis, leuchtendgrüne, säulen- förmig wachsende Art, die auch im Winter nicht braun wird, von geschlos- senem Wuchs	60-80 80-100 100-125 125-150	1.20 1.65 2.20 2.75	11.— 16.— 21.— 26.—	100.— 150.— 200.— 250.—
occ. recurva nana, niedrige, spitzkugelig wachsende Form mit ganz dichter, krauser Bezweigung	Breite: 20-30 30-40 40-50	1.35 2.40 3.75	13.— 23.— 35.—	120.— 220.— —
occ. Riversii, von schlankem, gedrunenem Wuchs, gelblichgrün bezweigt	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150	0.80 1.35 2.— 2.90 4.—	7.50 13.— 19.— 28.— 37.—	70.— 120.— 180.— 270.— 350.—
occ. Rosenthalii, bildet schmale, locker garnierte Säulen mit dunkelgrüner, zier- lich gekräuselter, flach gestellter Be- zweigung	30-40 40-60 60-80 80-100 100-125	1.30 1.65 2.20 3.30 4.40	12.— 16.— 21.— 31.— 42.—	110.— 150.— 200.— 300.— 400.—
occ. spiralis, sehr schöne, empfehlenswerte Form von geschlossenem, pyramidalem Wuchs mit dunkelgrüner Belaubung	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150 250-275 275-300	0.70 1.20 1.65 2.20 3.75 10.— 14.—	6.50 11.— 16.— 21.— 36.— 95.— 135.—	60.— 100.— 150.— 200.— 350.— 900.— 1300.—
occ. Vervaeneana, wächst breitpyramidal, die im Sommer gelbliche, leichte und feine Bezweigung färbt sich im Winter goldbroncefarbig	40-60 60-80 80-100 100-125	0.80 1.35 2.— 2.90	7.50 13.— 19.— 28.—	70.— 120.— 180.— 270.—
occ. Wagneri (Versmanni), bildet schmale Pyramiden, Belaubung feinzweigig, dunkelblaugrün	30-40 40-60 60-80 150-175	0.70 0.90 1.35 6.—	6.50 8.50 13.— 55.—	60.— 80.— 120.— —
occ. Wareana, sehr wertvolle, dunkelgrüne Form von gedrunenem Wuchs	40-60 60-80 80-100	1.40 1.80 2.40	13.— 17.— 23.—	125.— 165.— 225.—
Thujopsis dolobrata , japanischer Lebens- baum, Wuchs ebenmäßig, breitpyramidal, Belaubung breitschuppig, glänzend hell- grün, winterhart	30-40 40-50 50-60 60-80	0.90 1.65 2.75 4.40	8.50 16.— 26.— 42.—	80.— 150.— 250.— 400.—
Tsuga canadensis , kanadische Hemlocks- tanne, eine sehr schöne Konifere mit zier- licher, leicht überhängender Bezweigung	30-40 40-60 60-80 80-100 100-125 125-150	0.85 1.80 2.75 4.40 5.50 7.50	8.— 17.— 26.— 42.— 52.— 72.—	75.— 160.— 250.— 400.— 500.— 700.—

Forstpflanzen

S. = Sämling, St. = Steckling, v. = verpflanzt, b. = bewurzelt

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
A. Laubhölzer					
Nicht aufgeführte Sorten siehe unter „Junge Ziergehölze“ Seite 80-87					
Acer campestre , Feldahorn	1j. S.	20—40	1.50	10.—	90.—
	1j. S.	40—60	2.—	14.—	130.—
	2j. v.	20—40	2.50	18.—	160.—
	2j. v.	40—65	3.50	28.—	250.—
	3j. v.	65—100	5.—	40.—	360.—
	3j. v.	100—140	6.50	55.—	500.—
platanoides , Spitzahorn	1j. S.	20—40	1.20	8.—	75.—
	1j. S.	40—60	1.50	12.—	110.—
	2j. v.	20—40	2.—	15.—	140.—
	2j. v.	40—65	2.50	20.—	180.—
	3j. v.	65—100	4.—	30.—	270.—
	3j. v.	100—140	5.—	40.—	360.—
	4j. v.	140—180	6.50	55.—	—
pseudoplatanus , Weiß- oder Berg- ahorn	1j. S.	20—40	1.20	8.—	75.—
	1j. S.	40—60	1.50	12.—	110.—
	2j. v.	20—40	2.—	15.—	140.—
	2j. v.	40—65	2.50	20.—	180.—
	3j. v.	65—100	4.—	30.—	270.—
	3j. v.	100—140	5.—	40.—	360.—
	4j. v.	140—180	6.50	55.—	—
	4j. v.	180—220	8.—	70.—	—
pseud. purpurescens , Blätter unter- seits purpurviolett gefärbt	3j. v.	65—100	15.—	100.—	—
	3j. v.	100—140	17.—	130.—	—
Alnus glutinosa , Rot- od. Schwarzerle	1j. S.	10—20	1.—	5.50	50.—
	2j. v.	40—65	2.—	15.—	140.—
	2j. v.	65—100	2.50	18.—	165.—
	2j. v.	100—140	3.—	26.—	240.—
	3j. v.	140—180	5.—	40.—	360.—
	3j. v.	180—200	7.50	65.—	600.—
incana , Weiß- oder Bergerle	1j. S.	10—20	1.—	5.50	50.—
	2j. v.	40—65	2.—	15.—	140.—
	2j. v.	65—100	2.50	18.—	165.—
	2j. v.	100—140	3.—	26.—	240.—
	3j. v.	140—180	5.—	40.—	360.—
	3j. v.	180—200	7.50	65.—	600.—
Betula alba , Weißbirke, Moorbirke	1j. S.	10—20	1.—	6.—	50.—
	1j. S.	20—40	1.20	8.—	70.—
	2j. v.	20—40	1.50	12.—	110.—
	2j. v.	40—65	2.70	22.—	200.—
	2j. v.	65—100	4.—	33.—	300.—
	3j. v.	100—140	7.—	60.—	550.—
verrucosa , Hänge-Weißbirke s. S. 81	1j. S.	10—20	2.—	12.—	—
Caragana arborescens , Erbsenbaum	1j. S.	20—45	2.50	18.—	—
	2j. v.	40—60	4.50	35.—	—
	2j. v.	65—100	6.—	50.—	—

FORSTPFLANZEN

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Carpinus betulus , Weiß- oder Hain- buche	1j. S.	5—10	0.75	4.—	36.—
	1j. S.	10—20	1.—	6.—	54.—
	2j. v.	20—40	3.—	25.—	225.—
	3j. v.	40—65	4.50	40.—	360.—
	3j. v.	65—100	6.—	55.—	500.—
	3j. v.	100—140	9.—	80.—	720.—
Corylus Avellana , Haselnuß	1j. S.	10—20	4.—	30.—	—
	1j. S.	20—40	6.—	50.—	—
	2j. v.	30—50	7.—	60.—	—
	3j. v.	40—65	8.50	75.—	—
	3j. v.	65—100	10.—	90.—	—
	4j. v.	100—140	12.—	110.—	—
Crataegus monogyna (oxyacantha) , Weißdorn	1j. S.	10—20	0.80	5.—	45.—
	1j. S.	15—30	1.—	6.50	58.—
	1j. S.	20—40	1.20	8.—	70.—
	1j. S.	30—60	1.50	11.—	100.—
4—6 mm Durchm.	2j. S.	—	2	14.—	120.—
6—9 " "	2j. S.	—	3.50	26.—	235.—
9—12 " "	2j. S.	—	4.50	33.—	300.—
4—6 " "	2j. v.	40—60	2.50	20.—	180.—
6—9 " "	3j. v.	60—80	4.—	33.—	300.—
9—12 " "	4j. v.	80—120	5.—	40.—	360.—
12—14 " "	4j. v.	80—120	6.—	50.—	—
Cydonia japonica Maulei, japanische Quitte	1j. S.	20—40	1.50	6.—	55.—
	2j. v.	25—50	4.—	30.—	270.—
	3j. v.	40—70	6.—	50.—	450.—
Fagus sylvatica , Rot- od. Waldbuche	1j. S.	7—20	1.—	7.50	70.—
	1j. S.	10—25	1.30	9.—	85.—
	2j. v.	20—40	2.50	18.—	165.—
	2j. v.	25—50	2.70	22.—	200.—
	3j. v.	15—30	2.—	16.—	150.—
	3j. v.	30—50	3.—	24.—	215.—
	3j. v.	50—80	5.50	45.—	400.—
	4j. v.	80—120	9.50	85.—	800.—
	4j. v.	120—150	14.—	125.—	1100.—
Fagus sylv. purpurea , Blutbuche	1j. S.	10—20	6.—	50.—	—
	3j. v.	15—30	16.—	150.—	—
	3j. v.	30—50	27.—	250.—	—
Fraxinus americana (alba) , Weißesche	1j. S.	10—20	1.—	6.—	55.—
	1j. S.	20—40	1.50	10.—	90.—
excelsior , gemeine Esche	2j. S.	40—65	2.—	15.—	—
	2j. S.	65—100	2.70	22.—	—
pubescens , Grauesche	2j. v.	20—40	1.50	12.—	110.—
	3j. v.	40—65	3.—	25.—	220.—
	3j. v.	65—100	4.—	35.—	300.—
	4j. v.	100—140	6.—	50.—	450.—
	4j. v.	140—180	8.—	70.—	650.—
	4j. v.	180—200	10.—	90.—	850.—
Ligustrum in den Sorten; Lodense, ovalifolium, vulgare, vulg atrovirens, siehe Seite 42/43					
Mahonia aquifolia , Mahonie, s. S. 84					
Morus alba , Maulbeere	2j. S.	15—30	3.50	25.—	—
	2j. S.	30—60	4.50	35.—	—
	2j. v.	30—50	5.—	40.—	—
	2j. v.	50—80	6.—	50.—	—

FORSTPFLANZEN

	Alter	Höhe ca. cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Populus angulata cordata robusta, äußerst schnellwüchsige Pappel	1j.b.St.	65—100	5.—	40.—	—
canadensis (monolifera), kanadische Pappel	1j.b.St.	100—140	6.—	50.—	—
		40—65	2.70	22.—	200.—
		65—100	3.50	28.—	250.—
		100—140	5.—	44.—	400.—
		140—180	7.—	60.—	550.—
		180—220	8.—	75.—	700.—
nigra, Schwarzpappel und		40—65	3.—	25.—	—
nigra fastigiata (dilatata),		65—100	4.—	35.—	—
italienische Pyramidenpappel		100—140	6.—	50.—	—
Prunus serotina, spätblühende Traubenkirsche	1j. S.	20—40	1.50	10.—	—
	1j. S.	40—60	2.—	16.—	—
	2j. v.	40—65	3.—	25.—	—
	3j. v.	65—100	5.—	40.—	—
	3j. v.	100—140	7.—	60.—	—
	3j. v.	140—180	9.50	85.—	—
Quercus coccinea, Scharlacheiche palustris, Sumpfeiche	1j. S.	10—20	5.—	40.—	—
	1j. S.	10—20	5.—	40.—	—
	3j. v.	30—50	13.—	120.—	—
pedunculata (robur), deutsche Eiche, Stieleiche	1j. S.	10—20	1.—	6.—	55.—
	3j. v.	20—40	2.—	16.—	150.—
	3j. v.	40—65	3.50	30.—	270.—
	4j. v.	65—100	6.—	55.—	500.—
	4j. v.	100—140	8.50	75.—	700.—
	4j. v.	140—180	14.—	125.—	—
rubra, amerikanische Roteiche	1j. S.	10—20	1.—	7.—	60.—
	1j. S.	20—40	1.70	12.—	100.—
	3j. v.	40—65	4.50	40.—	350.—
	3j. v.	65—100	6.—	50.—	450.—
	3j. v.	100—140	7.—	60.—	500.—
	4j. v.	140—180	10.—	90.—	800.—
	4j. v.	180—220	13.—	120.—	—
sessiliflora, Traubeneiche	3j. v.	40—65	5.—	40.—	—
	3j. v.	65—100	8.—	70.—	—
	3j. v.	100—140	10.—	90.—	—
Robinia Pseudoacacia, Akazie	1j. S.	40—60	1.70	13.—	120.—
	1j. S.	60—100	2.50	18.—	165.—
	2j. v.	40—65	2.50	20.—	180.—
	2j. v.	65—100	3.50	30.—	270.—
	2j. v.	100—140	5.—	40.—	360.—
	3j. v.	140—180	8.—	70.—	—
Sorbus aucuparia, gewöhnliche Eberesche, Vogelbeere	1j. S.	10—20	1.20	8.—	—
	1j. S.	20—40	1.70	13.—	—
	2j. v.	20—40	2.50	20.—	—
	2j. v.	40—65	3.50	30.—	—
	3j. v.	65—100	6.—	50.—	—
	3j. v.	100—140	7.50	65.—	—
scandica, nordische Eberesche, Vogelbeere	1j. S.	5—10	1.—	7.—	—
	1j. S.	10—20	1.50	10.—	—
	1j. S.	20—40	2.—	15.—	—
Tilia platyphyllos (grandifolia), großblättrige Linde, Sommerlinde	1j. S.	10—20	2.—	16.—	150.—
	1j. S.	20—40	3.—	24.—	200.—
	2j. S.	30—50	3.50	30.—	250.—
	2j. S.	50—80	5.—	40.—	360.—
	3j. v.	30—50	5.—	40.—	360.—
	3j. v.	50—80	7.50	65.—	600.—
	3j. v.	80—120	9.—	80.—	750.—
	4j. v.	120—150	14.—	120.—	—

FORSTPFLANZEN

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM	10000 St. GM.
Tilia parvifolia , kleinblättrige Linde, Stein- oder Winterlinde	1j. S.	10—20	1.50	12.—	110.—
	1j. S.	20—40	2.50	20.—	180.—
	2j. S.	30—50	3.—	25.—	220.—
	2j. S.	50—80	4.—	35.—	300.—
	3j. v.	30—50	3.—	25.—	220.—
	3j. v.	50—80	5.—	45.—	400.—
Veredlungen in Sorten, s. S. 87	3j. v.	80—100	7.—	60.—	500.—
Ulmus campestris , Feldulme oder -Rüster	2j. v.	20—40	2.50	20.—	—
	3j. v.	40—65	3.50	30.—	—
	3j. v.	65—100	5.50	48.—	—
	4j. v.	100—140	7.50	65.—	—
	4j. v.	140—180	9.—	80.—	—
montana , Bergulme oder -Rüster	1j. S.	10—20	1.20	8.—	—
	2j. S.	20—40	1.50	12.—	—
	2j. v.	20—40	2.50	20.—	—
	3j. v.	40—65	3.50	30.—	—
	3j. v.	65—100	5.50	45.—	—
	3j. v.	100—140	7.—	60.—	—
	4j. v.	140—180	9.—	80.—	—
B. Nadelhölzer					
Nicht aufgeführte Nadelhölzer siehe unter „Junge Koniferen“ Seite 88-93					
Abies pectinata , Edel- od. Weißtanne	2j. S.	—	0.60	3.—	—
	3j. S.	8—20	1.—	7.—	—
	3j. v.	10—20	1.50	12.—	—
	4j. v.	12—30	2.—	16.—	—
	5j. v.	15—35	2.50	20.—	—
	5j. v.	20—40	3.—	25.—	—
	5j. v.	25—50	4.—	30.—	—
Chamaecyparis Lawsoniana , Lebensbaum-Zypresse	2j. S.	—	2.—	10.—	—
	3j. v.	20—35	3.50	25.—	—
	4j. v.	25—50	4.50	35.—	—
	2 x v	40—60	20.—	180.—	—
Larix dahurica , dahurische Lärche	2j. v.	20—40	3.75	30.—	—
	2j. v.	40—65	7.50	60.—	—
europaea , europäische Lärche	1j. S.	10—20	1.—	6.—	55.—
	2j. v.	15—30	2.—	15.—	140.—
	2j. v.	20—40	2.50	20.—	180.—
	2j. v.	25—50	3.—	25.—	220.—
	3j. v.	40—65	4.—	35.—	—
	3j. v.	65—100	6.—	50.—	—
leptolepis , japanische Lärche	1j. S.	10—20	1.50	10.—	90.—
	3j. v.	40—65	7.50	65.—	600.—
	3j. v.	65—100	9.—	80.—	—
	3j. v.	100—140	12.—	100.—	—
sibirica , sibirische Lärche	1j. S.	5—15	0.75	6.—	—
	2j. v.	20—45	3.75	30.—	—
sudetica , Sudetenlärche	1j. S.	10—20	1.20	8.—	—
	2j. v.	15—30	2.50	20.—	—
	2j. v.	20—40	3.—	25.—	—
	2j. v.	25—50	3.50	30.—	—

FORSTPFLANZEN

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM	10000 St. GM.
Picea alba , amerikanische Weißfichte	2j. S.	7—25	0.70	3.50	32.—
	2j. S.	10—30	1.—	4.—	38.—
	3j. v.	12—30	1.50	9.—	—
	4j. v.	25—50	2.—	16.—	—
	4j. v.	30—60	2.50	20.—	—
	4j. v.	40—70	3.50	27.—	—
excelsa , Fichte, Rottanne	2j. S.	10—30	0.70	3.50	30.—
	2j. S.	12—30	1.—	5.—	45.—
	3j. v.	12—30	1.20	7.—	65.—
	3j. v.	15—35	1.20	8.—	75.—
	3j. v.	20—40	1.50	11.—	100.—
	4j. v.	20—45	1.60	12.—	100.—
	4j. v.	25—50	2.—	15.—	125.—
	4j. v.	30—60	2.50	18.—	160.—
	5j. v.	40—70	3.—	25.—	230.—
	2j. S.	—	1.—	6.—	55.—
pungens , Blau- oder Stehfichte	3j. v.	10—20	2.—	16.—	150.—
	4j. v.	12—30	2.70	23.—	210.—
	4j. v.	15—30	3.—	25.—	230.—
	5j. v.	25—50	4.—	35.—	—
	5j. 2xv.	20—30	7.—	60.—	—
	5j. 2xv.	30—40	9.—	80.—	—
pungens glauca , Blaufichte s. S. 91 sitchensis , Sitkafichte	2j. S.	7—25	1.—	5.—	45.—
	2j. S.	10—30	1.20	7.—	65.—
	3j. v.	15—35	2.20	17.—	160.—
	3j. v.	20—40	2.50	20.—	180.—
	4j. v.	20—45	3.—	25.—	220.—
	4j. v.	25—50	3.30	28.—	250.—
	4j. v.	30—60	3.50	30.—	270.—
	4j. v.	40—70	4.—	35.—	300.—
	1j. S.	—	0.60	3.—	—
	2j. S.	—	1.20	7.—	—
Pinus Banksiana , Bankskiefer	2j. v.	—	1.50	10.—	—
	3j. v.	—	2.—	15.—	—
	1j. S.	—	0.70	4.—	35.—
	2j. S.	—	1.—	6.—	55.—
	2j. v.	—	1.50	10.—	85.—
	3j. v.	—	2.70	22.—	200.—
Laricio austriaca , Oesterreichische Schwarzkiefer	5j. 2xv.	—	22.—	200.—	—
	2j. S.	—	1.—	4.—	36.—
	3j. v.	—	2.—	16.—	—
	4j. v.	—	4.—	36.—	—
	5j. 2xv.	20—30	12.—	100.—	—
	5j. 2xv.	—	—	—	—
montana , Berg- oder Krummholz- kiefer	1j. S.	—	0.60	3.—	27.—
	1j. S.	I. Größe	0.50	2.20	20.—
	2j. S.	—	1.—	6.—	55.—
	2j. v.	I. Größe	1.20	8.—	72.—
	2j. v.	II. "	1.—	7.—	65.—
	3j. v.	—	2.—	16.—	150.—
Strobus , Weymouthskiefer	2j. S.	—	0.70	4.—	35.—
	3j. v.	—	1.50	9.—	80.—
	4j. v.	15—30	2.—	16.—	150.—
	4j. v.	20—40	2.50	20.—	185.—
	4j. v.	25—50	2.70	22.—	200.—
	4j. v.	30—60	3.—	25.—	—
montana mughus , siehe Seite 91 silvestris , gemeine Kiefer, aus an- erkanntem Saatgut	5j. 2xv.	25—50	10.—	90.—	—
	5j. 2xv.	—	—	—	—

FORSTPFLANZEN — STAUDEN

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Pseudotsuga Douglassi caesia , graue Fraser-Douglasfichte	1j. S.	—	1.50	10.—	80.—
	2j. S.	10—20	2.—	15.—	140.—
	4j. v.	20—40	5.—	45.—	400.—
	4j. v.	25—50	6.—	55.—	500.—
	5j. v.	30—60	8.—	70.—	650.—
	5j. 2xv.	30—40	17.—	150.—	—
Douglasli glauca , blaue Colorado- Douglasfichte	5j. 2xv.	40—60	22.—	200.—	—
	1j. S.	—	1.50	10.—	80.—
	2j. S.	10—30	2.—	15.—	120.—
	4j. v.	15—35	5.—	45.—	400.—
Douglasli viridis , grüne Douglas- fichte	4j. v.	20—40	6.—	55.—	500.—
	1j. S.	—	1.50	10.—	—
	2j. S.	10—25	2.—	15.—	—
	2j. S.	15—35	2.50	20.—	—
	2j. S.	20—40	3.—	25.—	—
	2j. v.	12—30	3.50	28.—	—
	2j. v.	15—35	4.—	34.—	—
	3j. v.	20—40	4.50	40.—	—
	3j. v.	25—50	6.—	50.—	—
	4j. v.	30—60	7.—	65.—	—
	4j. v.	40—70	9.—	80.—	—

Stauden

Zeichenerklärung: F = Fels- und Mauerpflanze, zur Bepflanzung von Steingärten, Fels-Mauern etc.
E = für Einfassungen geeignet, S = Schnittstauden, R = Rabattenstauden, D = Solitärstauden und
Dekorationsstauden, Fa. = Farne, W = Sumpf- und Wasserpflanzen, Bl = Blumenzwiebeln

Die Höhe, die die Stauden ungefähr erreichen, ist annähernd angegeben, ebenfalls die Blütezeit

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Acaena Buchanania , Stachelnüsschen, Blätter ge- fiedert, immergrün, blaugrün, rasenbildend, 15 cm, Juli/August, F	0.25	2.25	20.—
Achillea , Schafgarbe			
Eupatorium Parkers Var., goldgelb, 90 cm, Juli/August, R S	0.45	4.—	36.—
millefol. Kirschköningin, leuchtend kirschrot, 50 cm, Juni/August, R S F	0.25	2.25	20.—
Parmica plena The Pearl, remontierend, weiß- gefüllt, 50—80 cm, Juni/August, R S F	0.30	2.70	24.—
Aconitum Napellus , Eisenhut, in langen Rispen dunkelblau blühend, 80—120 cm, Juli/Aug., R S	0.40	3.60	32.—
Actaea racemosa , Silberkerze, weiß, 120 cm, Juli/August, R S F	0.55	5.—	45.—
Ajuga reptans fol. atropurpurea, Günsel, Blät- ter dunkelrot, buntgefleckt, Blüten dunkelblau, 10 cm, Mai, F E	0.20	1.80	16.—
Alchemilla alpina , Frauenmantel, Blätter sil- bergraugrün, Blüten gelblichgrün, 5—10 cm, Juni/August, F	0.20	1.80	16.—

STAUDEN

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Alsine laricifolia , Steinmiere, lockerrasig, weißblühend, 10—20 cm, Juli/September, F	0.30	2.70	24.—
Alyssum , Steinkraut			
rostratum , reichblühend, goldgelb, Juli, Blätter unterseits silbrig, 30 cm, F E	0.25	2.25	20.—
saxatile , Blätter unterseits silbergrau, filzig, Bl. leuchtendgelb, 30—40 cm, April/Juni, F E	0.25	2.25	20.—
Althaea rosea pl., Stockrose oder Malve, Blüten groß, gefüllt, rosettenförmig, 150—200 cm, Juli/September, D R, in Farben gemischt	0.35	3.10	28.—
Anchusa , Ochsenzunge,			
italica Dropmore, leuchtend rein dunkelblau, 100—150 cm, Juni/August, R	0.35	3.10	28.—
italica Opal, himmelblau, 120 cm, Juni/Aug., R	0.35	3.10	28.—
myosotidiflora , Blüten vergißmeinnichtartig, hellblau, 50—60 cm, April/Mai, R S	0.40	3.60	32.—
Androsace primuloides , Mannsschild, großbl., rosa, üppig wachsend, 5—10 cm, Mai/Juni, F	0.35	3.10	28.—
Anemone japonica Luise Uhink, Windsröschen, reinweiß, großblumig, 50—90 cm, Aug./Okt., R S	0.45	4 —	36.—
Antennaria , Katzenpfötchen			
dioica rubra , Blätter graugrün, rasenbildend, Blüt. rot, strohblumenartig, 10 cm, Mai/Juni, F	0.25	2.25	20.—
margaritacea , weißlich glänz. mit gelber Scheibe, Laub weißfilzig, 50 cm, Juli/August, R S F	0.25	2.25	20.—
tomentosa , Blätter silbergrau, rasenbild., Blüten weiß, 5—10 cm, Mai/Juni, F	0.20	1.80	16.—
Aquilegia , Akelei			
chrysantha , Gold-Akelei, blaß goldgelb mit sehr langem Sporn, 80—100 cm, Mai/Aug., R S	0.35	3.10	28.—
haylodgensis , Hybrid. in verschiedenen Farben, langgestielt und langgespornt, 50—100 cm, Mai/Juni, R S	0.35	3.10	28.—
vulgaris pl., gefülltblühend in verschied. Farben, 70 cm, Juni, R S	0.35	3.10	28.—
Arabis alpina fl. pl., Gänsekresse, reinweiß gefüllt, 15—20 cm, April, F E	0.20	1.80	16.—
Armeria Lauchiana , Grasnelke, bildet dichte, runde Polster, Bl. rosa, 15 cm Mai/Aug., F E	0.18	1.60	15.—
Arundo Donax , Pfahlrohr, 150—250 cm, Gr. W	0.70	6.30	54.—
Asperula odorata , würziger Waldmeister, für Halbschatten, Bl. klein, weiß, Mai/Juni, 20 cm, F	0.25	2.25	20.—
Aspidium filix mas , Wurmfarne, starkwachsend, mit bis 60 cm langen Wedeln, immergrün, Fa	0.35	3.10	28.—
spinulosum , Schildfarne, mit sehr breiten, lockeren Wedeln, halbbimmergrün, Fa	0.35	3.10	28.—
Aster , Sternblume, Aster			
alpinus , niedrige Alpenaster, bis 20 cm, Mai/Juni, lila, F E	0.25	2.25	20.—
Amellus , Sommeraster in verschiedenen Farben, 40—60 cm, Aug./September, R S	0.50	4.50	40.—
diplostephioides Leichtlinii, großbl., dunkellila, mit gelber Mitte, 50—60 cm, Juni/Juli, R S	0.35	3.10	28.—
ericoides , dichtverzweigt, reichblühend, Blüten klein, weiß, 100 cm, Sept. Okt., R S	0.35	3.10	28.—
hybr. luteus , gelbe, zierliche Sternblütchen, 30 bis 50 cm, Juli/Sept., R S	0.35	3.10	28.—

STAUDEN

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Aster hybr. Nordlicht, leuchtendrosa mit gelber Mitte, 100 cm, September/Oktober, R S . . .	0.35	3.10	28.—
N.-A. W. Bowman, dunkellila, 150 cm, ab September, R S D . . .	0.35	3.10	28.—
N.-A. Lil Fardell, leucht. karminrosa, 125 150 cm, September/Oktober, R S D . . .	0.35	3.10	28.—
N.-A. pulchellum, großblumig, tiefkarminrosa, 150—200 cm, Sept./Okt., R S D . . .	0.35	3.10	28.—
N.-B. Beauty of Colwall, gefüllt, lavendelblau, 100—120 cm, Sept./Okt., R S . . .	0.35	3.10	28.—
N.-B. de la Toussaint, Allerheiligenaster, mattlila, 25 cm, Ende Okt./Anfang Nov., R S . . .	0.35	3.10	28.—
N.-B. Heiderose, sehr schön rosafarb., 120-150 cm, September/Oktober, R S . . .	0.35	3.10	28.—
N.-B. Nancy Ballard, rötlichblau gefüllt, mit sehr großen Blütendolden, 100 cm, Oktober, R S . . .	0.35	3.10	28.—
N.-B. Schön Rottraut, feurigrosa, einfachblüh., 100—150 cm. September/Oktober, R S . . .	0.35	3.10	28.—
N.-B. St. Egwin, leuchtendrosa, 50—80 cm, Oktober, R S . . .	0.35	3.10	28.—
N.-B. Weiße Zwergkönigin, reinweiß, einfachblühend, 60 cm, Sept./Okt., R S . . .	0.35	3.10	28.—
subcoeruleus Apollon, reichblüh., großbl., dunkelblau mit orangefarbig. Mitte, 40 cm, Juni, R S yunnanensis, leuchtend lilablau, großbl., bis 30 cm, Mai/Juni, R S . . .	0.35	3.10	28.—
Frühlings-, Sommer- und Herbstastern in Sorten meiner Wahl mit Namen . . .	0.40	3.60	32.—
Astilbe , Prachtspiere			
Arendsi Bergkristall, schneeweiß, 80—100 cm, Juli/August, R S . . .	0.65	6.—	55.—
Arendsi Gloria, dunkelrosa, 40—60 cm, Juli, R S . . .	0.45	4.—	36.—
Arendsi Granat, leuchtend dunkelkarminrosa, 60—90 cm, Juli/August, R S . . .	0.70	6.30	54.—
Arendsi Hyacinth, leuchtend lilarosa, 60—80 cm, Juli/August, R S . . .	0.60	5.40	48.—
Arendsi Lachskönigin, prächtig hellachsrosa, 70—80 cm, Ende Juli, R S . . .	0.60	5.40	48.—
hybr. Gloria purpurea, Belaubung dunkelrot, Blüten leuchtend rot, 60—80 cm, Juli/Aug., RS . . .	0.70	6.30	54.—
Thunbergi delicata, reinzartrosa, 150 cm, Aug., R . . .	0.45	4.—	36.—
Thunbergi Moerheimi, besonders schöne, große weiße Blütenrispen, 80—100 cm, Juli, R . . .	0.55	5.—	44.—
Astrantia major, Sterndolde, weiß, rosa geadert, 60 cm, Juni/August, S . . .	0.35	3.10	28.—
Athyrium filix femina, Frauenfarn, mit zielr. gelblich-grünen Wedeln, 30—100 cm, Fa . . .	0.35	3.10	28.—
Aubrietia Blaukissen, 10 cm, März/Mai, F E . . .	0.25	2.25	20.—
hybr. grandiflora, großblumig, lichtblau . . .	0.35	3.10	28.—
hybr. Dr. Mules, dunkelviolet, großblumig . . .			
Betonica glomerata grandifl. superba, Battunge rotviolet, 50 cm, Ende Juni/Juli, S R . . .	0.35	3.10	—
Blechnum spicant, Rippenfarn, wintergrün, Wedel glänzend, lederartig, 30—40 cm, Fa. . .	0.40	3.60	32.—
Bocconia cordata (japonica), Federmohn, dekorative Einzelpfl., bis 200 cm, Belaubung grau-grün, mit weißen Blütenrispen, D . . .	0.35	3.10	28.—

STAUDEN

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Brunella Webbia , Braunelle, mit blauviolett Lippenblumen, 20 cm, Juli/Aug., F E	0.30	2.70	24.—
Calamintha alpina , Bergminze, dunkellila, pol- sterbildend, 10 cm, Juni/Juli, F	0.35	3.10	28.—
Campanula , Glockenblume <i>carpathica</i> , mit zierlichen blauen Glöckchen, 20 bis 30 cm, Juni/September, F E	0.35	3.10	28.—
<i>glomerata superba</i> , mit großen, runden Blütenstr., tiefdunkelviolet, 40—50 cm, Juni/Juli, R S	0.35	3.10	28.—
<i>latifolia macrantha</i> , sehr großblumig, dunkel- violet, 100—120 cm, Juni/Juli, R S	0.40	3.60	32.—
<i>persicifolia</i> , großbl., blau, 60—80 cm, Juli, R S	0.35	3.10	28.—
<i>Portenschlagiana</i> , polsterbildend, sehr reichbl., blau, 10—15 cm, Mai/Sept., F E	0.50	4.50	40.—
<i>pusilla alba</i> , niedrige Tuffs, reinweiß, 10—15 cm, Juli—Sept., F E	0.35	3.10	28.—
<i>turbinata</i> , Bl. groß, schalenförmig, rein tiefblau, 20—30 cm, Juni/August, F E	0.50	4.50	40.—
In verschiedenen Sorten meiner Wahl	0.35	3.—	27.—
Centaurea , Kornblume <i>dealbata</i> , Blüten rosa, einzeln, mit weißer Mitte 50 cm, Mai/August, R S	0.35	3.10	28.—
<i>macrocephala</i> , gelb, 120 cm, Juni/Juli, R S	0.40	3.60	32.—
<i>montana</i> , blau, 40—50 cm, April/Mai, R S	0.35	3.10	28.—
<i>montana maxima rosea</i> , rosafarbig, großblumig, 40—50 cm, Mai/August, R S	0.35	3.10	28.—
Cerastium Biebersteinii , Hornkraut, silberweiße Polster bild., weißbl., 10—15 cm, Mai/Juni, F E	0.18	1.60	15.—
Chrysanthemum indicum , Winteraster, in ver- schiedenen Sorten und Farben, 70—80 cm, Sept./Okt., R S	0.35	3.20	30.—
<i>maximum</i> [<i>Leucanthemum maximum</i>], reinweiß, großbl. Margerite, 60—70 cm, Juni/Sept., R S	0.35	3.10	28.—
<i>uliginosum</i> , starkwüchsig, reinweiß, 150 cm, August/Oktober, R S	0.35	3.10	28.—
Colchicum autumnale , einheim. Herbstzeitlose, lila, 5—20 cm, September/Oktober, Bl., F	0.35	3.10	28.—
Convallaria majalis , Maiglöckchen, 10 Keime GM 0.60, 100 Keime GM. 5.50, 1000 GM. 50.—			
Coreopsis verticillata , Mädchenauge, Blüte hell- gelb mit braun. Scheibe, 60 cm, Juli/Sept., RS	0.35	3.10	28.—
Cotula squalida , Laugenblume, moosartig, Be- laubung feingefiedert, olivfarbig, Blüten gelb, unscheinbar, 5 cm, F	0.20	1.80	15.—
Crinum Powellii , Hakenlilie, sehr dekorativ mit langen, schmalen, frischgrünen Blättern und amaryllisähnl. dunkelrosa Blüten, 100 cm, Juli/August, R D	0.70	6.30	—
Delphinium , Rittersporn, in verschiedenen Sor- ten und Farben meiner Wahl, Juni/Juli, R S D	0.45	3.75	34.—
hybr. Arnold Böcklin, tiefenzianblau mit weißer Mitte, 100—120 cm, Juni, Juli und Sept.	0.45	4.—	36.—
hybr. Andenken an August Koenemann, sehr großblumig, leuchtend lasurkobaltblau mit weiß. Mitte, ca. 100 cm, Juli/Sept.	0.55	5.—	45.—
hybr. King of Delphiniums, ultramarinblau mit weißer Mitte, Juni/Juli/Sept., 140-180 cm, R S D	0.55	5.—	45.—

S T A U D E N

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Dianthus, Nelke			
deltoides, Heidenelke, reichblühend, blutrot, 20 cm, Juni/Juli, F E	0.35	3.10	28.—
plumarius, Federnelke, reinweiß, rosa, 20-40 cm, Juni/Juli, F E S	0.35	3.10	28.—
Dielythra, Herzblume			
eximia, rosarot, 30 cm, Mai/Juli, R S	0.45	4.—	36.—
spectabilis, Tränendes Herz, rosa, 60-90 cm, Mai/Juni, R S	0.45	4.—	36.—
Digitalis gloxinaeflora, Fingerhut, weiß bis tief- rot variierend, inwendig gefleckt, 100-150 cm, Juni/Juli, R D	0.25	2.25	20.—
Doronicum plant. excelsum, Gemswurz, mit groß. goldgelben Scheibenblumen, 60-80 cm, Mai, R S	0.35	3.10	28.—
Epimedium alpinum, Sockenblume, rötl. violett, Blätter bronzerot, 15-25 cm, April/Mai, F E	0.45	4.—	36.—
Eremerus spectabilis, Steppenlilie, mit grünlich- gelben Blütenrispen, 100 cm, Mai/Juni, R D	0.70	6.30	—
Erigeron, Beifußkraut			
Asa Gray, aprik.-farb., 30-40 cm, Juni/Juli, S R	0.40	3.60	32.—
aurantiacus, orangebraun, 30-40 cm, Juni/Juli, RS	0.40	3.60	32.—
mesagrande speciosus, dunkelblauviolett, 40-60 cm, Juni/August, R S	0.35	3.10	28.—
Quakeress, mattsalila, sehr reichbl., 50-60 cm, Juni/September, R S	0.35	3.10	28.—
speciosus semiplenus, dunkelblau, halbgefüllt, 50 cm, Juni/August, R S	0.35	3.10	28.—
Eryngium planum, Edeldistel, mit zahlr. stahlbl. Blütenköpfen, 100-150 cm, Juli/Aug., R S F	0.35	3.10	28.—
Eupatorium, Wasserdost			
ageratoides, weiß, 120 cm, Aug./Sept., D R W	0.35	3.10	28.—
cannabinum fl. pl., rosagefüllt, 150 cm, Aug./Sept., D R W	0.35	3.10	28.—
Euphorbia polychroma, Wolfsmilch, dicht buschig mit leuchtendgelben Blütendolden, 50 cm, Mai/Juni, R	0.35	3.10	28.—
Funkia, Funkie, Taglilie			
jap. albo-marginata, Blätt. weißgerandet, Blüten tiefblau, 30-50 cm, Juli/Aug., R E	0.35	3.10	28.—
jap. ovata (coerulea), Blüten tiefblau, Blätter breitoval, dunkelgrün, 50 cm, Juli/Aug., R E	0.35	3.10	28.—
jap. undalata vittata, mit weißbunten Blättern, Blüten violettblau, 50 cm, Juli/Aug., R E	0.55	5.—	45.—
Sieboldiana, Blätter groß, blaugrün, Blüten hell- lila, 60 cm, Juli/Aug., R E	0.40	3.60	32.—
Gaillardia grandifl. hybr., Kokardenblume, große, goldgelbe, braunrot gez. Strahlenblüten, reich- blühend, 60 cm, Juni/Okt., R G	0.35	3.10	28.—
Galega bicolor Hartlandii, Geißraute, mit weißen u. lila Schmetterlingsbl., 120 cm, Juni/Aug., R S	0.50	4.50	40.—
Geranium platypetalum, Storchschnabel, leuch- tend blauviolett, großblumig, 40-60 cm, Juni/ Juli, R F	0.40	3.60	32.—
Geum Heldreichi splendens, Nelkenwurz, leuchtend ziegelrot, großblumig, 40 cm, Mai/ Juni, R F S	0.35	3.10	28.—

STAUDEN

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Gypsophila paniculata , Schleierkraut, große, dichte Büsche mit kl. weißen Blüten, 60 cm, Juli/Aug., R S	0.35	3.10	28.—
Helenium , Sonnenbraut			
autumnale Riverton Beauty, zitronengelb mit schwarzer Mitte, 100-150 cm, Aug./Okt. R S D	0.35	3.10	28.—
autumnale superbum rubrum, goldgelb, 100-150 cm, September/Oktober, R S D	0.35	3.10	28.—
Hoopesii, mit großen, orangegelben Strahlenblüten, 60/80 cm, Mai/Juni, R S	0.45	4.—	36.—
pumilum magnificum, sehr reichblüh., buschig, ringelb, 60/80 cm, Juni/August, R S	0.35	3.10	28.—
Helianthemum mutabile , Felsröschen, gelb- und rotblühend, 15—20 cm, Juni/Juli, F E	0.35	3.10	28.—
Heliopsis scabra fl. pl. gratissima , Sonnenauge, ockergelb, 60—100 cm, August/September, RS	0.35	3.10	28.—
Helleborus hybridus , Christrose, variierend weiß bis rot, 40 cm, Dezember/März, R S	0.60	5.50	50.—
niger, die reinweiße Christrose, 20—30 cm, Dezember/März, R S	1.—	9.—	—
Hemerocallis , Taglilie			
flava, hellgelb, wohlriechend, leicht überhängend, 40—60 cm, Mai/Juni, S R W	0.40	3.60	32.—
(fulva) Kwanso fl. pl., orangegelb, gefüllt, von schöner Form, 75—100 cm, Juli/Aug., R S W	0.40	3.60	32.—
Hepatica triloba , Leberblümchen, blau, Februar bis April, Belaubung immergrün, lederartig, 15 cm, F E	0.35	3.10	28.—
Heuchera sanguinea , Purpurglöckchen, karmesinrot, 30—40 cm, Mai/August, R S F	0.40	3.60	32.—
Houstonia serpyllifolia , rosa bis hellblaue Sternblümchen, reichbl., polsterbild., 10 cm, Mai, FE	0.30	2.70	24.—
Iberis , Schleifenblume			
sempervirens, immergrün, reinweiße Blütenkissen bildend, 20—30 cm, April/Mai, F E	0.20	1.80	16.—
semp. Weißer Zwerg, Wuchs dicht gedrungen, reinweiß, sehr reichbl., 20 cm, April/Mai, FE	0.25	2.25	20.—
Incarvillea Delavayi , Freiland-Gloxinie, Blüten trompetenförmig, tief rosenrot mit gelbem Schlund, 75—100 cm, Juni/Juli, R S	0.45	4.—	36.—
Inula Royleana , Alant, mit großen, gelben Blüten- scheiben, 30—50 cm, Mai/Juni, R S	0.35	3.10	28.—
Iris , Schwertlilie			
germanica, in verschiedenen Sorten und Farben, Mai/Juni, R S D W	0.35	3.20	28.—
sibirica, mit schmalen Blättern und feinen, hell- blauen Blüten, 60 cm, Mai/Juni, R S W	0.35	3.20	28.—
Leontopodium alpinum , Alpen-Edelweiß, 15 cm, Juni/Juli, F	0.35	3.10	28.—
Lilium tigrinum , Tigerlilie, dunkellachsrot mit schwarzrot. Fleck., 75-100 cm, Juli/Aug., RS, Bl.	0.40	3.60	28.—
Linaria pallida , Maueraflachs, kriechend, hell- violett, 5 cm Juni/Herbst, F	0.30	2.70	24.—
Lypinus polyphyllus , Staudenlupine, blau, bis 100 cm, Juni/Juli, R S	0.35	3.10	28.—

STAUDEN

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Lychnis, Lichtnelke			
<i>chalcidonica</i> , Brennende Liebe, scharlachrot, 80—100 cm, Juni/Juli, R S	0.35	3.10	28.—
<i>viscaria splendens</i> , Pechnelke, karminrot, 40 cm, Mai/Juni, R S	0.35	3.10	28.—
Lythrum roseum superbum , Weiderich, leuch- tendrosa mit lachsfarbigem Schein, 80—100 cm, Juli/September, R S W	0.35	3.10	28.—
Monarda didyma , Bienenbalsam, blüht sehr reich in Etagen, scharlachrot, 50—80 cm, Juli bis September, R S	0.35	3.10	28.—
Myosotis palustris Perle von Ronnenberg, Vergißmeinnicht, dunkelhimmelblau, 40-60 cm, Mai/August, R S	0.25	2.25	20.—
Nymphaea Marliacea albida , Seerose, reinweiß, sehr großblumig, W	4.50	—	—
<i>Marliacea rosea</i> , zartrosa Art	4.50	—	—
Oenothera, Nachtkerze			
<i>missouriensis</i> , kriechend, schwefelgelb, 20—30 cm, Juni/September, F	0.35	3.10	28.—
<i>speciosa</i> , weiß, in rosa übergehend, duftend, 40 cm, Juli/August, R	0.35	3.10	28.—
<i>Youngii</i> , goldgelb, reichblühend, großblumig, 40—60 cm, Juni/August, R	0.35	3.10	28.—
Orobis vernus , Waldwicke, leuchtend karmin- rot, 30 cm, März/April, F	0.45	4.—	—
Osmunda regalis , Königsfarn, mit gelbgrünen, doppeltgefiederten Wedeln, 100 cm, Fa. W	1.20	11.—	—
Paconia sinensis , Pfingstrose, in verschiedenen Farben mit Namen, 70—100 cm, Juni, R S D	0.60	5.50	50.—
ohne Namen, sehr starke Pflanzen	0.35	3.—	27.—
Papaver, Mohn			
<i>nudicaule</i> , mit haltbaren, schalenförmigen Blüten gelb, weiß, orange, 30-40 cm, Mai/Herbst, R S F	0.35	3.10	28.—
<i>orientale</i> , türkischer Mohn, großblumig, variiert., Mai/Juli, 80—120 cm, R S	0.40	3.60	32.—
<i>orientale</i> Lachskönigin, mit leuchtend lachs- roten Blüten, R S	0.45	4.—	36.—
Pentstemon (Chelone) barbata , Bartfaden, fleischfarbig bis karmin, 70—90 cm, Juni/Juli, R S	0.35	3.10	28.—
<i>hybr. Southgate</i> , 40—50 cm lange Blütenrispen mit fingerhutähnlichen, leuchtend karminroten Blumen, Juni, R	0.45	4.—	36.—
Phlox, Flammenblume			
<i>amoena</i> , kriechend, rasenbildend, leuchtend kar- minrot, 20—30 cm, April/Mai, S F E	0.30	2.70	24.—
<i>decussata (paniculata)</i> , in verschiedenen Sort. und Farben, 50—100 cm, August/Okttober, R S	0.35	3 —	25.—
<i>divaricata</i> , dunkellilabl., 20-30 cm, Mai/Juni, F E S	0.40	3.60	32.—
<i>maculata hybr. Alpha</i> , leuchtend rosa, mit dunkl. Mitte, frühblüh., 80-100 cm, Juli/August, R S	0.35	3.10	28.—
<i>setacea Moerheimii</i> , leuchtend karminrosa, ra- senbildend, ca. 10 cm, April/Mai, F E	0.35	3.10	28.—
<i>setacea nivalis</i> , schneeweiß, rasenbildend, ca. 10 cm, April/Mai, F E	0.35	3.10	28.—
<i>setacea Sprite</i> , karminrot mit dunklem Auge, rasenbildend, ca. 15 cm, April/Mai, F E	0.35	3.10	28.—

STAUDEN

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Physalis Franchetii , Judenkirsche, Kelchhüllen scharlachrot, 80 cm, Aug./Sept., R S, 10 Keime	0.40	—	—
Platycodon Mariesi , Ballonblume, mit flachen, blauen Glocken, 40 cm, Juli/August, R . .	0.55	5.—	45.—
Polygonum , Knöterich			
<i>polystachyum</i> , Herbstlieder mit prächtig. weiß-rosa Blütenrispen, 100-130 cm, Sept./Okt., D S	0.45	4.—	36.—
<i>sachalinense</i> , Wucherknöterich, großblättrig und starkw., Bl. weiß, 150-200 cm, Sept./Okt., DW	0.45	4.—	36.—
Polypodium vulgare , Engeliuß, Farn mit 10 bis 30 cm langen, immergrünen Wedeln, Fa. F	0.35	3.10	28.—
Potentilla chrysocraspeda , Fingerkraut, polsterbild., leuchtend gelb, 8—10 cm, Mai/Juni, F	0.50	4.50	—
Primula , Primel, Himmelsschlüssel			
<i>Bullesiana</i> , in roten, orange und gelben Schattierungen blühend, 40—50 cm, Juni/Juli, R S	0.25	2.25	20.—
<i>cashmeriana</i> , violettblaue Kopfprimel, 30 cm, April/Mai, R S	0.30	2.70	24.—
<i>denticulata grandiflora</i> , Kopfprimel, lila, reichblühend, 30 cm, April/Mai, R S	0.25	2.25	20.—
<i>japonica</i> , Blüten meist purpurrot mit weißem Auge, auch weiß und rosa, rotgestreift, 30-40 cm, Mai/Juni, R S	0.25	2.25	20.—
<i>Juliae</i> , kriechend, dichte, frischgrüne Blattpolster, Blüten groß, sattviolett, 10 cm, April/Juni, FE	0.25	2.25	20.—
<i>veris elatior</i> , Bl. sehr groß in allen Schattierungen, weiß bis rot, 25—30 cm, April/Mai, R S	0.20	1.80	16.—
Pulmonaria saccharata , Lungenkraut, silberweiß geflecktes Laub, Blüten glockig, rotviolett, 25 cm, April/Mai, E	0.35	3.10	28.—
Pyrethrum , Margaretenblume			
<i>caucasicum</i> (Tschihatschewi), rasenbildend, weißblühend, Juni/Aug., 10—20 cm, F E	0.30	2.70	24.—
<i>roseum</i> , einfach- und gefülltblühend, in versch. Farben und Sorten, 60—80 cm, Juni/Sept., R S	0.40	3.50	32.—
Rudbeckia , Sonnenhut			
<i>laciniata</i> fl. pl. Goldball, goldgelb gefüllt, bis 150 cm, August/September, R S	0.40	3.60	32.—
<i>Neumannii</i> , dunkelgoldgelb, mit tiefschwarzer Mitte, 60 cm, August/Okttober, R S	0.35	3.10	28.—
<i>nitida Herbstsonne</i> , ungefüllt, goldgelb, 150—200 cm, Juli/Okttober, R S W	0.40	3.60	32.—
<i>purpurea</i> , karminrot, 100—120 cm, Juli/Okt., R S	0.40	3.60	32.—
Salvia , Salbei			
<i>memorosa</i> , dunkelviolettblau, 60—80 cm, Juli bis September, F R S	0.40	3.60	32.—
<i>officinalis</i> , Blüten weiß bis violett, Juni/Juli, 100 cm, R S F	0.40	3.60	32.—
<i>virgata</i> , hellblau, bis 50 cm, Juli/Aug., F R S	0.35	3.10	28.—
Saponaria ocymoides , Seifenkraut, kriechend, Blumen lebhaft rosa, 15—20 cm, Mai/Juni, F	0.40	3.60	32.—
Saxifraga , Steinbrech, in verschiedenen Sorten, bis 20 cm, April/Mai, F E	0.25	2.25	20.—
Scabiosa caucasica , Grindkraut, Blüten groß, himmelblau bis rötlichlila, 50—70 cm, Juni—September, R S	0.40	3.60	32.—

STAUDEN

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Sedum, Fetthenne, Mauerpfeffer			
spectabile Brillant, dunkelrot, 30—50 cm, August/September, F R	0.40	3.60	32.—
niedrige Sorten, 10—15 cm, meist im Hoch- sommer weiß, rosa oder gelbblühend, F E	0.20	1.80	16.—
Sempervivum, Hauswurz , in verschiedenen Sor- ten, 15—25 cm, Juli/August, F E	0.25	2.25	20.—
Senecio, Kreuzkraut			
Clivorum, mit dekorativem, großem Blattwerk, orangegelb, 80—100 cm, Juli/August, R D	0.45	4.—	36.—
tanguticus, goldgelb, 150 cm, August, R D	0.45	4.—	36.—
Sidalcea „Rosenknospe“ , Schmuckmalve, mit hübscher Rispe, einfacher rosaroter Blume, 40—60 cm, Juli/August, R	0.40	3.60	32.—
Solidago, Goldrute			
aspera, überhängende, gelbe Blütenrispen, 100 cm, August/September, R S D	0.35	3.10	28.—
multiradiata, rasenbild., gelb, 15—20 cm, Juli, F Shortii, Königsgoldrute, Wuchs straff aufrecht, gelbe, federige Rispen, 100—150 cm, Sep- tember/Okttober, R D S	0.40	3.60	32.—
virgaurea nana, goldgelb, mit steifen Blüten- ständen, 40—50 cm, August/September, R S	0.35	3.10	28.—
virgaurea praecox, frühbl., gelb, 70—80 cm, Juli, RS	0.35	3.10	28.—
Spergula pilifera, Sternmoos , ganz niedrig, moos- artig, frischgrün, mit kl. weiß, Bl., Juli/Aug. Spiraea, Spierstaude	0.20	1.80	16.—
filipendula fl. pl., elfenbeinweiß gefüllt, 40 bis 50 cm, Juni/Juli, R S	0.40	3.60	32.—
venusta magnifica, rosa, Dolden sehr groß, 100—150 cm, Juli, R S	0.40	3.60	32.—
Stachys lanata , Ziest, blüht purpurrosa, Blätter weiß-filzig, 20—40 cm, Juli, F E	0.20	1.80	16.—
Stokesia cyanea , Blüten hellblau, asterähnlich, 30—50 cm, September/Okttober, R	0.40	3.60	32.—
Thalictrum, Wiesenraute			
adiantifolium, feingefiedertes, farnähnlich. Laub, Blüte gelblich, 25—40 cm, Juni/Juli, W S R	0.35	3.10	28.—
aquilegifolium, Blüten lilarot, rot oder weiß, 120 cm, Juli/August, R S	0.35	3.10	28.—
diptercarpum, purpurrosa, mit zitronengelben Staubgefäßen, 150 cm, Juli/August, R S	0.50	4.50	40.—
glaucum, Belaubung blaugrün, Blüte sattgelb, 130 cm, Juni/August, R S	0.35	3.10	28.—
Thymus citriodorus und serpyllum , Thymian, polsterbildend, mit stark würzig duftender Be- laubung, reichbl., 15 cm, Juni/Juli, F E	0.25	2.25	20.—
Tradescantia virginica , Dreimasterblume, vio- lettblau, 50—60 cm, Mai/September, R	0.35	3.10	28.—
Tritoma hybrida Expreß , Fackellilie, mit orange- und lachsroten Blütenkolben, 60—90 cm, Juni/September, R S	0.55	5.—	45.—
Trollius, Trollblume			
europaeus, hellgoldgelb, reichblühend, 50 cm, Mai/Juni, R S	0.55	5.—	45.—
hybr. Salamander, tief orangerot, 50 cm, Mai bis Juni, R S	0.65	6.—	55.—

STAUDEN

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
Tunica Saxifraga, Felsnelke , Juli/August, mit zartrosa Blütchen übersät, 25 cm, R F . . .	0.40	3.60	32.—
Verbascum pannosum, Königskerze , Laub weiß- filzig, gelb, 150 cm, Juli, R D	0.40	3.60	32.—
Veronica, Ehrenpreis			
amethystina , lilablau, 40 cm, Mai/Juni, R S	0.35	3.10	28.—
Hendersonii , prachtvoll dunkelblau, 60 cm, RS	0.50	4.50	40.—
incana , silberweiß behaart, kriechend, Blüten dunkelblau, 30 cm, Juni/Juli, F E	0.20	1.80	16.—
latifolia Royal Blue , leuchtend blau, 25 cm, Mai, F E	0.35	3.10	28.—
prostrata pallida , rasenbildend, bläulichweiß, 10 cm, Juni, F	0.25	2.25	20.—
rupestris , rasenbild., amethystblau, 10 cm, Juni, FE	0.20	1.80	16.—
spicata , lilablau, 60 cm, Juni/Juli, R S . . .	0.35	3.10	28.—
Vinca major , großblättr. Immergrün, s. S. 46			
minor , kleinblättriges Immergrün, siehe Seite 46			
Viola, Veilchen			
cornuta G. Wermig , Hornveilchen, prächtig blau, äußerst reichbl., 15 cm, Mai-September, R F E	0.25	2.25	20.—
cornuta Hansa , großblumig, sehr reichblühend, dunkellila, 15 cm, Mai/September, R F E . .	0.30	2.70	24.—
gracilis Juwel von Eisenach , dunkelviolet, 10—15 cm, April/September, F R E	0.30	2.70	24.—
odorata Königin Charlotte , wohlriechend, dun- kelblau, sehr reichblühend, 15 cm, März bis April, September/Okttober, F R E	0.30	2.70	24.—
Yucca filamentosa, Palmlilie , mit schwertförmig. Blättern und prächtigen, cremeweißen Glocken- blüten aufkräftig. Schaft, 100 cm, Juli/Sept., DRS	0.80	7.20	—

Sortimentspreise

Stauden für den Schnitt und für Rabatten

	GM.	in besseren Sort. GM.
100 Stück in 10 Sorten	22.—	28.—
100 " " 20 "	24.—	30.—
20 " " 10 "	5.50	6.50
10 " " 10 "	3.—	3.75

Stauden für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen

	GM.	in besseren Sort. GM.
100 Stück in 10 Sorten	18.—	22.—
100 " " 20 "	20.—	24.—
20 " " 10 "	4.50	5.50
10 " " 10 "	2.50	3.—

Dahlien oder Georginen

	1 St. GM.	10 St. GM.	100 St. GM.
in guten Sorten meiner Wahl	0.45	4.—	35.—
in neueren und besseren Sorten meiner Wahl	0.65	6.—	55.—

Junge Ziergehölze zur Weiterkultur

Absk. = Absenker, b. = bewurzelt, S. = Sämling, St. = Steckling
v. = verpflanz, V. = Veredlung

Bei Abnahme von weniger als 50 Stück erhöht sich der Hundertpreis
um 25%. — Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Acer campestre , siehe Seite 65	1j. S.	10—20	3.—	20.—	—
dasyacarpum	1j. S.	20—40	4.—	30.—	—
	2j. v. S.	40—65	7.—	60.—	—
	2j. v. S.	65—100	9.—	80.—	—
Ginnala	1j. S.	10—20	3.—	20.—	—
	1j. S.	20—40	4.—	30.—	—
	2j. v. S.	30—60	7.—	60.—	540.—
monspessulanum	1j. S.	15—30	8.—	70.—	—
	2j. v. S.	20—40	10.—	90.—	—
	2j. v. S.	40—60	13.—	120.—	—
Negundo	1j. S.	20—40	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	40—65	2.50	15.—	135.—
	2j. v. S.	40—65	3.50	25.—	—
	2j. v. S.	65—100	4.50	35.—	—
palmatum	1j. S.	10—25	4.—	30.—	250.—
palmatum atropurpureum	1j. S.	10—20	50.—	—	—
platanoides , siehe Seite 65					
pseudoplatanus , siehe Seite 65					
pseudopl. purpurescens , s. S. 65					
tataricum	1j. S.	10—20	3.—	20.—	—
	1j. S.	20—40	4.—	30.—	—
Aesculus hippocastanum	1j. S.	10—2	2.—	14.—	125.—
	2j. v. S.	20—40	3.50	24.—	—
	3j. v. S.	40—65	5.—	40.—	—
	3j. v. S.	65—100	7.—	60.—	—
Ailanthus glandulosa	1j. S.	20—40	3.50	25.—	—
Alnus glutinosa und incana , siehe Seite 65					
Amelanchier vulgaris	1j. S.	—	2.—	12.—	—
und canadensis	2-3j. v. S.	30—60	4.—	30.—	—
Amorpha fruticosa	1j. S.	10—20	2.—	15.—	—
	2j. v. S.	30—50	4.—	30.—	—
Ampelopsis Engelmanni	1j. b. St.	—	6.—	50.—	—
quinquefolia	1j. b. St.	—	5.—	40.—	360.—
Aristolochia Siphon	1j. S.	20—40	6.—	50.—	—
	1j. pik.	20—40	8.—	70.—	—
Azalea mollis	2j. S.	—	4.—	35.—	—
	3j. v. S.	10—15	14.—	120.—	—
	4j. v. S.	15—30	20.—	180.—	—
Berberis aggregata Pratti	1j. S.	10—20	3.50	25.—	—
buxifolia (dulcis) nana	2j. v. St.	—	7.—	60.—	—
Giraldii	1j. S.	—	4.—	35.—	—
stenophylla	2j. v. St.	—	16.—	—	—
Thunbergi	1j. S.	8—20	1.20	9.—	80.—
	2j. v. S.	15—30	5.—	40.—	—
	3j. v. S.	30—50	9.—	80.—	—

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Berberis Thunbergi atropurpurea	1j. S.	—	10.—	90.—	—
vulgaris	1j. S.	10—20	1.20	8.—	70.—
	2j. v. S.	20—40	3.—	20.—	180.—
vulgaris atropurpurea	1j. S.	10—20	2.50	15.—	—
	2j. v. S.	20—40	6.—	50.—	—
	3j. v. S.	30—50	9.—	80.—	—
Betula alba , siehe Seite 65					
lenta	1j. S.	10—20	1.50	9.—	—
	1j. S.	20—40	2.—	12.—	—
	2j. v. S.	20—40	2.50	20.—	—
	2j. v. S.	40—65	3.75	30.—	—
lutea	1j. S.	10—20	1.50	9.—	—
	1j. S.	20—40	2.—	12.—	—
	3j. v. S.	40—65	3.75	30.—	—
	3j. v. S.	65—100	6.—	50.—	—
	3j. v. S.	100—140	10.—	80.—	—
Maximowiczii	1j. S.	10—20	2.—	12.—	—
	1j. S.	20—40	2.50	18.—	—
papyracea	1j. S.	10—20	1.50	9.—	—
	1j. S.	20—40	2.—	12.—	—
	3j. v. S.	50—80	6.—	50.—	—
	3j. v. S.	80—120	10.—	80.—	—
odorata	1j. S.	10—20	2.—	12.—	—
	1j. S.	20—40	2.50	18.—	—
verrucosa	1j. S.	10—20	1.—	7.—	60.—
	1j. S.	20—40	1.30	9.—	84.—
	1j. S.	40—60	2.—	15.—	135.—
	2j. v. S.	20—40	2.—	15.—	135.—
	2j. v. S.	40—65	3.—	27.—	240.—
	2j. v. S.	65—100	5.—	40.—	360.—
	3j. v. S.	100—140	8.—	72.—	660.—
Buddleia variabilis	1j. b. St.	40—60	15.—	—	—
variabilis Veitchiana	1j. b. St.	40—60	15.—	—	—
Buxus , siehe Seite 89					
Calycanthus floridus	1j. S.	10—20	11.—	100.—	—
	2j. v. S.	20—40	20.—	180.—	—
Caragana arborescens , s. S. 65					
Carpinus betulus , siehe Seite 66					
Castanea vesca	1j. S.	10—25	5.50	45.—	—
	2j. v. S.	20—40	9.—	80.—	—
	3j. v. S.	40—65	11.—	100.—	—
Catalpa bignonioides (syr.)	1j. S.	20—40	3.—	20.—	—
Ceanothus americanus	1j. S.	15—20	5.—	40.—	—
	2j. v. S.	30—40	8.50	75.—	—
Cercidiphyllum japonicum	1j. S.	—	5.—	40.—	—
Clematis tangutica	1j. S.	—	6.—	50.—	—
vitalba	1j. S.	—	2.50	15.—	—
viticella	1j. S.	—	10.—	90.—	—
Colutea arborescens	1j. S.	30—60	2.50	15.—	—
Cornus alba	1j. b. St.	30—60	6.—	50.—	—
	1j. S.	10—20	3.—	20.—	—
	2j. v. S.	30—60	6.—	50.—	—
alba flaviramea	1j. b. St.	20—40	10.—	—	—
alba arg. marg.	2j. Abs.	30—60	15.—	—	—
alba Späthi	2j. Abs.	—	12.—	110.—	—
mas	1j. S.	10—20	3.50	25.—	225.—
	1j. S.	20—40	4.—	30.—	270.—

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Cornus mas	2j. v. S.	15—30	4.50	33.—	300.—
	2j. v. S.	30—50	5.—	40.—	360.—
	3j. v. S.	50—80	7.50	65.—	600.—
	3j. v. S.	80—100	9.—	80.—	720.—
sanguinea	2j. S.	20—40	4.—	30.—	—
	2j. S.	40—65	6.—	50.—	—
	2j. v. S.	20—40	5.—	40.—	—
	2j. v. S.	40—65	7.—	65.—	—
tatarica sibirica	bew Senker	—	8.—	70.—	—
Corylus Avellana , siehe Seite 66					
Columna	1j. S.	15—30	7.—	60.—	—
	2j. v. S.	20—40	10.—	90.—	—
	3j. v. S.	40—65	16.—	150.—	—
maxima atropurpurea	2j. Senker	—	30.—	—	—
Cotoneaster acutifolia	1j. S.	15—30	8.—	70.—	—
applanata	1j. S.	12—25	5.—	40.—	—
	2j. v. S.	20—40	7.—	60.—	—
	3j. v. St.	—	12.—	—	—
bullata	1j. S.	10—20	3.50	25.—	—
	2j. v. S.	30—50	7.—	60.—	—
divaricata	1j. S.	10—15	6.—	50.—	—
	2j. v. S.	20—40	9.—	80.—	—
	3j. v. S.	40—60	11.—	100.—	—
Franchetii	2j. v. S.	15—20	9.—	80.—	—
horizontalis	1j. S.	—	5.—	40.—	—
	2j. v.	—	9.—	80.—	—
	3j. v.	—	12.—	110.—	—
moupinensis	1j. S.	10—20	3.50	25.—	—
	2j. v. S.	20—40	6.—	50.—	—
nitens	2j. v. St.	20—40	9.—	80.—	—
praecox	2j. v. St.	—	20.—	180.—	—
	3j. v. St.	—	27.—	250.—	—
prostrata	2j. v. St.	—	12.—	100.—	—
	3j. v. St.	—	17.—	150.—	—
Simonsii	1j. S.	10—20	3.50	25.—	—
	2j. v. S.	20—40	7.—	60.—	—
Crataegus coccinea	1j. S.	10—20	12.—	100.—	—
	1j. S.	20—40	15.—	135.—	—
	2j. v. S.	30—50	18.—	160.—	—
	2j. v. S.	50—80	20.—	180.—	—
monogyna , siehe Seite 66					
Pyracantha	2j. S.	15—30	12.—	100.—	—
	3j. v. S.	—	25.—	—	—
Cydonia japonica	1j. S.	10—20	1.—	7.—	—
	1j. S.	20—40	1.50	10.—	—
japonica Maulei , siehe Seite 66					
Cytisus sessilifolius	1j. S.	—	4.—	30.—	—
Daphne Mezereum	1j. S.	—	12.—	100.—	—
	2j. v. S.	20—40	22.—	200.—	—
Deutzia crenata candidissima , cren. Fortunei, cren. plena, cren. Pride of Rochester, cren. rosea pl., hybrida Wateri, hybrida Welsi	1j. b. St.	30—60	7.—	60.—	—
gracilis	2j. v. St.	15—30	9.—	80.—	—
Lemoinei compacta	2j. v. St.	15—30	9.—	80.—	—
Elaeagnus angustifolia	1j. S.	25—40	4.—	30.—	—
	2j. v. S.	30—50	6.—	50.—	—

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Elaeagnus argentea	2j. Abs.	—	12.—	100.—	—
edulis	1j. S.	—	7.—	60.—	—
Evonymus europaea	1j. S.	15—30	4.—	30.—	—
	2j. v. S.	20—40	6.—	50.—	—
	3j. v. S.	30—50	8.—	70.—	—
radicans	2j. v. St.	10—20	9.—	80.—	—
radicans arg. var.	2j. v. St.	10—20	9.—	80.—	—
radicans vegeta	2j. v. St.	—	16.—	150.—	—
Exochorda grandiflora	1j. S.	—	12.—	—	—
Fagus sylvatica , siehe Seite 66					
sylvatica purpurea, s. S. 66					
sylv. atropur. macrophylla	1j. V.	30—50	80.—	—	—
	2j. V.	50—80	100.—	—	—
Forsythia intermedia	2j. v. St.	30—50	9.—	80.—	—
intermedia densiflora	1j. b. St.	—	8.—	—	—
int. spectabilis	1j. b. St.	—	8.—	—	—
int. vitellina	1j. b. St.	—	8.—	—	—
suspensa	2j. v. St.	25—50	15.—	135.—	—
suspensa Fortunei	2j. v. St.	30—50	15.—	135.—	—
suspensa Sieboldi	2j. v. St.	30—50	15.—	135.—	—
viridissima	2j. v. St.	25—50	9.—	80.—	—
Fraxinus americana (alba) , ex- celsior und pubescens s. S. 66					
Ornus	1j. S.	10—20	3.—	20.—	—
	2j. v. S.	20—40	6.—	50.—	—
	3j. v. S.	40—65	8.—	70.—	—
Genista scoparia	1j. S.	30—60	3.—	20.—	—
tinctoria	1j. S.	—	6.—	50.—	—
in Sorten	2j. V.	—	35.—	—	—
Gleditschia triacanthos	1j. S.	15—30	4.—	30.—	—
	2j. v. S.	25—50	6.—	50.—	—
Hibiscus syriacus-Hybriden					
in Sorten	1j. V.	—	40.—	—	—
Hippophae rhamnoides	1j. S.	15—30	3.—	20.—	—
	2j. v. S.	30—50	5.—	40.—	—
	3j. v. S.	50—80	7.50	65.—	—
Hydrangea paniculata grandifl.	2j. v. St.	20—40	9.—	80.—	—
	3j. v. St.	25—50	13.—	120.—	—
Hypericum calycinum und) Moserianum)	1j. pik.	—	8.—	70.—	—
	2j. b. St.	—	12.—	100.—	—
Ilex aquifolium	1j. S.	—	5.—	40.—	—
	2j. v. S.	10—20	8.—	70.—	—
crenata	3j. v. St.	—	12.—	100.—	—
	4j. v. St.	—	15.—	135.—	—
Jasminum nudiflorum	2j. b. St.	—	16.—	150.—	—
Juglans regia	1j. S.	15—30	8.—	70.—	—
	2j. v. S.	30—60	12.—	110.—	—
	3j. v. S.	40—65	20.—	180.—	—
Kerria japonica	2j. v. St.	25—40	9.—	80.—	—
japonica fl. pl.	2j. v. St.	30—50	13.—	120.—	—
Laburnum alpinum	1j. S.	15—30	5.—	40.—	—
vulgare	1j. S.	10—20	2.—	12.—	—
	1j. S.	20—40	2.50	15.—	—
	2j. v. S.	40—65	4.—	30.—	—
	2j. v. S.	65—100	5.—	40.—	—
	2j. v. S.	100—140	6.50	55.—	—
Vossi	1j. V.	—	40.—	—	—

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Ligustrum <i>Ibota</i>	1j. b. St.	—	4.—	30.—	—
<i>ionandrum</i>	2j. b. St.	—	7.—	60.—	—
<i>Lodense</i> siehe Seite 42	2j. b. St.	—	7.—	60.—	—
<i>ovalifolium</i> , siehe Seite 42-43					
<i>vulgare</i> , siehe Seite 43					
<i>vulg. atrovirens</i> , siehe Seite 43					
Liriodendron <i>tulipifera</i>	1j. S.	—	15.—	—	—
	2j. v. S.	20—40	25.—	—	—
	3j. v. S.	30—60	35.—	—	—
Lonicea <i>Morrowii</i> , <i>tatarica alba</i> , <i>tat. rosea grandifl.</i> , <i>Xylosteum</i>	1j. b. St.	40—80	7.—	60.—	—
<i>Caprifolium</i>	2j. v. St.	—	18.—	160.—	—
<i>coerulea</i>	2j. v. St.	20—40	7.—	60.—	—
	3j. v. St.	25—50	9.—	80.—	—
<i>nitida</i>	2j. v. St.	15—25	9.—	80.—	—
<i>pileata</i>	2j. v. St.	15—30	9.—	80.—	—
<i>Xylosteum</i>	1j. S.	15—30	4.—	30.—	—
	3j. v. S.	40—65	7.—	60.—	—
	3j. v. S.	65—100	9.—	80.—	—
Lycium <i>halimifol.</i> (<i>europaeum</i>)	1j. b. St.	—	6.—	50.—	—
Mahonia <i>aquifolium</i>	1j. S.	—	1.—	6.—	54.—
	2j. S.	—	1.50	12.—	100.—
	2j. v. S.	10—25	2.20	18.—	160.—
	2j. v. S.	12—30	3.—	25.—	220.—
	3j. v. S.	15—30	3.50	30.—	270.—
	3j. v. S.	20—40	4.50	40.—	360.—
	4j. v. S.	20—40	5.50	50.—	450.—
	2×v.	20—35	10.—	90.—	—
	2×v.	30—50	15.—	135.—	—
Malus , in Sorten wie: <i>bacc. fructu flavo</i> , <i>bacc. fructu</i> <i>maximo</i> , <i>bacc. The Fairy</i> , <i>Eleyi</i> , <i>floribunda purpurea</i> , <i>Nied-</i> <i>zwetzkjana</i> , <i>Scheideckerie</i> , <i>Sie-</i> <i>boldi calocarpa</i>	1j. V.	40—65	25.—	—	—
Morus <i>alba</i> , siehe Seite 66					
Philadelphus in den Sorten: <i>brachybotris</i> , <i>Falconeri</i> , <i>flori-</i> <i>bundus</i> , <i>Gordonianus</i> , <i>grandi-</i> <i>florus</i> , <i>inodorus</i> , <i>pubescens</i> , <i>Satsumi Yokohamae</i>	1j. b. St.	40—60	7.—	60.—	—
<i>coronarius</i>	1j. b. St.	—	9.—	—	—
<i>coronarius aureus</i>	2j. v. St.	15—30	11.—	100.—	—
<i>Lemoinei Avalanche</i>	2j. v. St.	30—50	8.—	70.—	—
<i>Lemoinei Bouquet blanc</i>	2j. v. St.	30—50	10.—	90.—	—
<i>Lemoinei erectus</i>	2j. v. St.	30—50	8.—	70.—	—
<i>Lemoinei Girandole</i>	2j. v. St.	—	22.—	—	—
<i>Lemoinei Montblanc</i>	2j. v. St.	20—40	8.—	70.—	—
<i>Lemoinei Virginal</i>	2j. v. St.	20—40	14.—	125.—	—
Polygonum <i>baldschuanicum</i>	1j. V.	—	35.—	—	—
Populus <i>alba Bolleana</i>	1j. V.	80—130	25.—	225.—	—
<i>alba nivea</i>	1j. b. St.	40—65	5.—	40.—	—
	1j. b. St.	65—100	7.—	60.—	—
<i>angulata cordata robusta</i> , s. S. 67					

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Populus berolinensis	1j. b. St.	40—65	4. 50	35. —	—
	1j. b. St.	65—100	6. —	50. —	—
	2j. v. St.	100—140	9. —	75. —	—
canadensis (monolifera), s. S. 67					
nigra, siehe Seite 67					
nigra fastigiata, siehe Seite 67					
trichocarpa	1j. b. St.	65—100	6. —	50. —	—
Potentilla fruticosa	1j. S.	—	4. —	30. —	—
	2j. v. St.	25—50	7. —	60. —	—
Prunus Laurocerasus					
schipkaensis	2j. v. St.	20—30	15 —	135. —	—
Laurocerasus schipk. Reynvanii	3j. v. St.	—	35. —	—	—
Padus	1j. S.	20—40	3. —	20. —	—
	1j. S.	40—60	5. —	40. —	—
	2j. v. S.	30—50	6. —	50. —	—
	3j. v. S.	50—80	8. —	70. —	—
Pissardi	1j. V.	70—120	25. —	—	—
Pissardi nigra	1j. V.	70—120	25. —	—	—
serotina, siehe Seite 67					
serrulata Hisakura	1j. V.	40—65	30. —	—	—
serr. Shidare Sakura	1j. V.	40—65	50. —	—	—
spinosa	1j. S.	15—30	2. —	10. —	—
	1j. S.	30—50	2. 50	18. —	—
	2j. v. S.	30—50	3. 50	25. —	—
	2j. v. S.	50—80	4. 50	35. —	—
virginiana	1j. S.	20—40	3. —	20. —	—
	2j. v. S.	30—50	6. —	50. —	—
	2j. v. S.	50—70	8. —	70. —	—
Ptelea trifoliata	1j. S.	—	2. —	15. —	—
Quercus coccinea, palustris, pedunculata (robur) rubra s. S. 67					
Rhamnus cathartica	1j. S.	—	4. —	30. —	—
	2j. v. S.	30—60	8. —	70. —	—
Frangula	1j. S.	—	3. —	20. —	—
	2j. v. S.	40—60	6. —	50. —	—
Rhodotypus kerrioides	1j. S.	20—40	6. —	50. —	—
	2j. v. S.	30—60	9. —	80. —	—
Rhus Cotinus	1j. S.	15—30	7. —	60. —	—
	2j. v. S.	20—40	11. —	100. —	—
Ribes alpinum	1j. b. Abr.	30—50	10. —	90. —	—
mit 1—2 Trieben	2j. v.	15—30	12. —	100. —	—
" 1—2 "	2j. v.	30—50	15. —	130. —	—
" 3—5 "	3j. v.	40—60	17. —	150. —	—
" 3—5 "	3j. v.	60—80	19. —	170. —	—
alpinum compactum	3j. v.	30—50	19. —	—	—
	3j. v.	50—80	22. —	—	—
arboreum (divaricatum)	1j. b. St.	50—70	6. —	50. —	—
	2j. b. St.	80—120	9. —	80. —	—
aureum	1j. b. St.	50—70	7. —	60. —	—
floridum	1j. b. St.	50—70	7. —	60. —	—
sanguineum	1j. b. St.	60—100	7. —	60. —	—
sang. atrorubens	1j. b. St.	60—100	10. —	90. —	—
	2j. v. St.	—	15. —	135. —	—
Robinia hispida rosea	1j. V.	—	45. —	—	—
neomexicana und andere Sorten	1j. V.	—	35. —	—	—
Pseudoacacia, siehe Seite 67					

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Rosa alpina	1j. S.	—	4.—	30.—	—
canina, siehe Seite 95					
lucida	1j. S.	—	4.—	30.—	—
	2j. v. S.	40—70	8.—	70.—	—
multiflora, siehe Seite 96					
pimpinellifolia	1j. S.	—	6.—	50.—	—
	2j. v. S.	25—50	9.—	80.—	—
rubiginosa 3—5 mm	1j. S.	20—40	1.50	7.—	60.
	1j. S.	30—50	3.—	20.—	180.
	2j. v. S.	40—65	6.—	50.—	—
	3j. v. S.	50—80	9.—	80.—	—
rubrifolia 3—5 mm	1j. S.	10—30	2.—	12.—	—
	1j. S.	20—40	3.—	20.—	—
	2j. v. S.	—	5.—	40.—	—
rugosa hollandica	1j. b. St.	—	4.—	33.—	300.—
rugosa Regeliana	1j. S.	10—20	2.—	12.—	—
	2j. v. S.	25—50	4.50	35.—	—
	3j. v. S.	40—70	7.—	60.—	—
rugosa Regeliana alba	1j. S.	10—20	2.—	12.—	—
	2j. v. S.	25—50	4.50	35.—	—
	3j. v. S.	40—70	7.—	60.—	—
Salix alba argentea	1j. b. St.	60—100	6.—	50.—	—
alba vit. Britzensis	1j. b. St.	60—100	6.—	50.—	—
alba vit. pendula nova	1j. b. St.	60—100	9.—	80.—	—
caprea	2j. v. St.	30—60	12.—	100.—	—
caprea latifolius	1j. b. St.	60—100	12.—	100.—	—
daphnoides latifolius glabra	1j. b. St.	80—140	6.—	50.—	—
daphnoides ruberrima	1j. b. St.	80—140	6.—	50.—	—
laurifolia	1j. b. St.	—	6.—	50.—	—
regalis	1j. b. St.	—	6.—	50.—	—
rotundifolia	1j. b. St.	—	6.—	50.—	—
Smithiana	1j. b. St.	60—100	12.—	100.—	—
Sambucus canadensis lutea	1j. b. St.	30—50	9.—	—	—
nigra	1j. b. St.	60—90	7.—	60.—	—
	1j. S.	30—60	4.—	30.—	—
nigra laciniata	1j. b. St.	30—60	9.—	—	—
racemosa	1j. S.	30—60	4.—	30.—	—
	1j. S.	60—100	5.—	40.—	—
	2j. v. S.	80—120	7.—	60.—	—
Sorbus aucuparia und scandica siehe Seite 67					
Spiraea albiflora (callosa alba)	2j. v. St.	10—20	9.—	80.—	—
	3j. v. St.	15—30	11.—	100.—	—
arguta	2j. v. St.	20—40	13.—	120.—	—
ariaefolia (Holodiscus discolor)	1j. S.	15—30	5.—	40.—	—
	2j. v. S.	40—60	9.—	80.—	—
Billiardi	1j. b. St.	30—50	6.—	50.—	—
Bumalda Anthony Waterer	2j. v. St.	15—30	9.—	80.—	—
	3j. v. St.	20—30	12.—	110.—	—
callosa Froebeli	2j. v. St.	20—40	9.—	80.—	—
	3j. v. St.	30—50	11.—	100.—	—

JUNGE ZIERGEHÖLZE ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Spiraea					
capitata	1j. b. St.	—	6.—	50.—	—
Douglasi	1j. b. St.	30—50	6.—	50.—	—
hypericifolia thalictroides	2j. v. St.	20—40	9.—	80.—	—
Menziesii	1j. b. St.	30—50	6.—	50.—	—
opulifolia	1j. b. St.	40—60	6.—	50.—	—
opulifolia lutea	1j. b. St.	30—60	8.—	70.—	—
prunifolia fl. pl.	2j. v. St.	—	20.—	—	—
Thunbergi	2j. v. St.	10—20	15.—	—	—
van Houttei	1j. b. St.	—	7.—	60.—	—
	2j. v. St.	25—50	9.—	80.—	—
Stephanandra incisa (flexuosa)	2j. v. St.	20—40	9.—	80.—	—
Symphoricarpus orbiculatus	1j. b. St.	30—60	10.—	90.—	—
orbiculatus aur. var.	2j. v. St.	15—30	12.—	100.—	—
racemosus	1j. b. St.	20—40	6.—	50.—	—
	1j. S.	15—30	2.—	10.—	—
	1j. S.	30—50	2.50	15.—	—
Syringa Rothomagensis (chinens.)	1j. V.	20—40	40.—	350.—	—
vulgaris, siehe Seite 96					
vulgaris in veredelten Sorten	1j. V.	—	40.—	350.—	—
Tamarix in den Sorten					
gallica indica, germanica, odes-					
sana, tetrandra (africana), tetr.					
parviflora, tetr. purpurea	1j. b. St.	40—80	7.—	60.—	—
Teucrium chamaedrys	1j. b. St.	—	8.—	70.—	—
Tilia platiphyllus (grandifolia)					
und parvifolia, siehe Seite 67-68					
euchlora, intermedia und pallida }	1j. V.	60—90	50.—	450.—	—
	1j. V.	90—120	70.—	630.—	—
tomentosa	1j. V.	50—80	100.—	—	—
Ulmus campestris und montana					
siehe Seite 68					
mont. Dampieri Wredei	1j. V.	30—50	50.—	—	—
mont. fastigiata	1j. V.	80—120	30.—	—	—
Viburnum Carlesi	1j. V.	—	70.—	—	—
Lantana	1j. S.	—	3.—	20.—	—
	2j. S.	15—25	4.—	30.—	—
	2j. S.	25—50	5.—	40.—	—
	2j. v. S.	25—50	6.—	50.—	—
opulus	1j. S.	5—15	3.—	20.—	—
	2j. v. S.	15—30	5.—	40.—	—
	3j. v. S.	30—50	7.—	60.—	—
opulus sterile	2j. b. Abs.	50—70	15.—	130.—	—
Weigelia (Diervilla) in den					
Sorten: amabilis, amabilis alba,					
intermedia Stelzneri, van Hout-					
tei, Verschaffelti }	1j. b. St.	—	9.—	80.—	—
	2j. v. St.	25—50	11.—	100.—	—
Eva Rathke	2j. v. St.	15—30	20.—	180.—	—

Junge Koniferen zur Weiterkultur

S. = Sämling, v. = verpflanzt, St. = Steckling, V. = Veredlung,
m/m. = mehrmals verpflanzt.

Bei Abnahme von weniger als 50 Stück erhöht sich der Hundertpreis
um 25%. - Unter 10 Stück einer Sorte werden nicht abgegeben.

	Alter	Höhe in cm	100 St. CM.	1000 St. GM.
Abies amabilis	1j. S.	—	4.—	30.—
arizonica	1j. S.	—	4.—	30.—
	2j. S.	—	6.—	50.—
	3j. v. S.	—	12.—	100.—
	4j. v. S.	—	16.—	150.—
	5j. 2x v. S.	—	22.—	200.—
balsamea	3j. v. S.	—	4.50	35.—
	4j. v. S.	12—25	7.—	60.—
	5j. 2x v. S.	—	9.—	80.—
brachyphylla (homolepis)	1j. S.	—	4.—	30.—
	2j. S.	—	6.—	50.—
	3j. v. S.	—	14.—	125.—
	4j. v. S.	—	20.—	180.—
	5j. 2x v. S.	—	30.—	—
cephalonica	2j. S.	—	7.—	60.—
	3j. v. S.	—	16.—	150.—
concolor	1j. S.	—	2.—	10.—
	2j. S.	—	3.—	20.—
	3j. v. S.	—	6.—	50.—
	4j. v. S.	—	9.—	80.—
	5j. 2x v. S.	—	17.—	150.—
concolor violacea	1j. S.	—	4.—	30.—
	2j. S.	—	6.—	50.—
	3j. v. S.	—	9.—	80.—
firma	1j. S.	—	3.—	20.—
	2j. S.	—	5.—	40.—
Fraseri	1j. S.	—	3.—	25.—
grandis	1j. S.	—	2.50	15.—
	2j. S.	—	4.50	35.—
	3j. v. S.	—	6.50	55.—
	4j. v. S.	—	10.—	90.—
lasiocarpa	1j. S.	—	4.—	30.—
	2j. S.	—	6.—	50.—
magnifica	1j. S.	—	4.—	30.—
nobilis	1j. S.	—	5.—	40.—
Nordmanniana	1j. S.	—	2.—	10.—
	2j. S.	—	3.—	20.—
	3j. v. S.	—	5.—	40.—
	4j. v. S.	—	8.—	70.—
	6j. 2x v. S.	—	18.—	160.—
pectinata, siehe Seite 68				
pinsapo	1j. S.	—	4.—	30.—
	2j. S.	—	6.—	50.—
sachalinensis	1j. S.	—	3.—	20.—
	4j. v. S.	—	14.—	120.—
	5j. 2x v. S.	—	25.—	—
sibirica	1j. S.	—	1.50	10.—
	4j. v. S.	—	5.—	40.—
	5j. 2x v. S.	—	10.—	90.—

JUNGE KONIFEREN ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.
Abies Veitchii	1j. S.	—	2.50	15.—
	2j. S.	—	5.—	40.—
	3j. v. S.	—	8.—	70.—
	4j. v. S.	—	11.—	100.—
	5j. 2x v. S.	—	22.—	200.—
Araucaria imbricata	1j. S.	—	50.—	—
	2j. v. S.	—	150.—	—
Buxus japonica aurea	2j. v. St.	8—15	8.—	70.—
sempervirens (arborescens)	2j. v. St.	8—12	5.—	40.—
	3j. v. St.	10—15	8.50	75.—
	4j. v. St.	15—25	11.—	100.—
	4j. v. St.	20—30	14.—	120.—
	2x v.	10—15	10.—	90.—
	2x v.	15—25	14.—	120.—
	2x v.	20—30	22.—	200.—
	2x v.	30—40	35.—	320.—
semp. Handsworthii	2j. v. St.	8—15	8.—	70.—
Cedrus atlantica	1j. S.	—	5.—	40.—
	2j. v. S.	—	13.—	120.—
deodara	1j. S.	—	5.—	40.—
	2j. S.	—	8.—	70.—
	2j. v. S.	—	11.—	100.—
	3j. v. S.	—	16.—	150.—
libani	1j. S.	—	5.—	40.—
	2j. v. S.	—	11.—	100.—
Chamaecyparis Lawsoniana, s. S. 68				
Laws. Alumii	2j. v. St.	15—25	13.—	120.—
	3j. v. St.	20—35	20.—	180.—
	4j. v. St.	30—50	28.—	250.—
	1j. V.	15—25	20.—	180.—
	2j. V.	25—50	30.—	270.—
Laws. coerulea	1j. V.	12—30	25.—	—
	2j. V.	20—40	30.—	—
Laws. erecta alba	2j. V.	25—40	30.—	—
	3j. V.	40—60	45.—	—
Laws. Fraserii	2j. v. St.	10—20	13.—	120.—
	3j. v. St.	20—30	20.—	180.—
	4j. v. St.	30—50	28.—	250.—
	1j. V.	15—25	20.—	180.—
	2j. V.	25—50	30.—	270.—
Laws. glauca nivea	1j. V.	12—20	30.—	—
Laws. intertexta	1j. V.	12—25	27.—	—
	2j. V.	—	30.—	—
Laws. Silver Queen	1j. V.	12—25	27.—	—
	2j. V.	20—40	35.—	—
	3j. V.	40—60	45.—	—
Laws. Stewardtii	1j. V.	12—25	27.—	—
	2j. V.	20—40	35.—	—
Laws. Triumph von Boskoop	1j. V.	15—25	25.—	225.—
	2j. V.	30—50	30.—	270.—
Laws. versicolor	1j. V.	—	25.—	—
	2j. V.	20—40	35.—	—
Laws. Wisselii	1j. V.	—	25.—	—
	2j. V.	—	35.—	—
pisifera	3j. v. S.	—	9.—	80.—
	2x v. S.	30—50	12.—	100.—
	2j. v. St.	15—25	15.—	120.—
	3j. v. St.	25—40	20.—	180.—

JUNGE KONIFEREN ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.
Chamaecyparis <i>pisifera aurea</i>	2j. v. St.	10—20	16.—	150.—
	3j. v. St.	15—25	22.—	200.—
[pisifera filifera	2j. v. St.	10—20	18.—	—
	3j. v. St.	15—30	22.—	—
<i>pisifera plumosa</i>	2j. v. St.	15—25	14.—	120.—
	3j. v. St.	20—30	18.—	160.—
<i>pisifera plumosa aurea</i>	2j. v. St.	10—20	14.—	120.—
	3j. v. St.	20—30	18.—	160.—
<i>pisifera squarrosa</i>	2j. v. St.	15—25	14.—	120.—
	3j. v. St.	20—40	18.—	160.—
Cryptomeria <i>japonica</i>	2j. S.	—	5.—	40.—
	3j. v. S.	—	8.—	70.—
<i>japonica elegans</i>	2j. v. St.	15—25	14.—	—
	3j. v. St.	20—40	18.—	—
Ginkgo <i>biloba</i>	1j. S.	—	5.—	40.—
Ilex <i>aquifolium</i> , siehe Seite 83				
Juniperus <i>chinensis Pfitzeriana</i>	2j. v. St.	10—20	27.—	250.—
	3j. v. St.	15—25	33.—	300.—
<i>communis</i>	1j. S.	—	2.—	10.—
	2j. v. S.	—	4.—	30.—
	3j. v. S.	—	6.—	50.—
	5j. 2x v. S.	25—40	12.—	100.—
<i>communis hibernica und suecica</i>	2j. v. St.	10—20	16.—	150.—
	3j. v. St.	15—35	27.—	250.—
<i>Sabina femina</i>	2j. v. St.	—	16.—	150.—
	3j. v. St.	—	25.—	—
<i>Sabina mas</i>	2j. v. St.	—	16.—	—
	3j. v. St.	—	25.—	—
[Sabina tamariscifolia	2j. v. St.	—	40.—	—
[virginiana	1j. S.	—	2.—	10.—
	2j. S.	—	3.—	20.—
	2j. v. S.	—	4.—	30.—
	3j. v. S.	—	8.—	70.—
	5j. 2x v. S.	25—40	15.—	135.—
Larix <i>dahurica, europaea, leptolepis,</i> <i>sibirica, sudetica</i> , siehe Seite 68				
Picea <i>ajanensis</i>	3j. v. S.	—	3.75	30.—
<i>alba</i> , siehe Seite 69				
<i>Alcockiana</i>	3j. v. S.	—	3.75	30.—
<i>Engelmannii</i>	2j. S.	—	1.50	10.—
	3j. v. S.	—	2.50	20.—
	4j. v. S.	15—30	4.—	30.—
<i>excelsa</i> , siehe Seite 69				
<i>excelsa Clanbrasiliana</i>	2j. v. St.	—	25.—	—
<i>excelsa compacta pyr.</i>	2j. v. St.	—	25.—	—
<i>excelsa compacta nana</i>	2j. v. St.	—	25.—	—
<i>excelsa pumila glauca</i>	2j. v. St.	—	25.—	—
<i>Omorica</i>	2j. S.	—	4.—	30.—
	3j. v. S.	10—25	9.—	80.—
	4j. v. S.	20—40	16.—	150.—
<i>orientalis</i>	2j. S.	—	5.—	40.—
	4j. v. S.	10—20	20.—	180.—
	5j. 2x v. S.	15—25	27.—	250.—
<i>pungens</i> , siehe Seite 69				

JUNGE KONIFEREN ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.
Picea pungens glauca	2j. S.	—	2.50	15 —
	3j. v. S.	10—20	4. —	30. —
	4j. v. S.	15—30	6. —	50. —
	5j. 2x v. S.	20—30	16. —	140. —
	5j. 2x v. S.	30—40	25. —	225. —
pungens glauca Kosteri	1j. V.	—	60. —	—
	2j. V.	—	80. —	—
sitchensis , siehe Seite 69				
Pinus Banksiana , siehe Seite 69				
cembra	2j. S.	—	5. —	40. —
	3j. v. S.	—	12. —	100. —
contorta	2j. S.	—	1.25	10. —
	3j. v. S.	15—30	3. —	24. —
	4j. v. S.	20—40	3.75	30. —
contorta Murrayana	1j. S.	—	1. —	6. —
	2j. S.	—	1.60	12. —
	3j. v. S.	20—40	3. —	25. —
densiflora	1j. S.	—	3. —	25. —
	3j. v. S.	—	8.50	75. —
edulis	1j. S.	—	3. —	25. —
	2j. S.	—	4. —	35. —
	3j. v. S.	—	8.50	75. —
	4j. v. S.	—	10. —	90. —
	5j. 2x v. S.	—	16. —	—
excelsa	1j. S.	—	1.50	10. —
	2j. S.	—	2.50	18. —
	3j. v. S.	—	4. —	30. —
	4j. v. S.	—	6. —	50. —
	5j. 2x v. S.	—	12. —	110. —
flexilis	1j. S.	—	3. —	25. —
	3j. v. S.	—	7. —	60. —
	4j. v. S.	—	10. —	—
Jeffreyi	1j. S.	—	4. —	30. —
	2j. v. S.	—	6. —	50. —
	3j. v. S.	—	10. —	90. —
Laricio austriaca , siehe Seite 69				
Laricio corsicana	1j. S.	—	1.50	10. —
montana , siehe Seite 69				
montana mughus ^{0/000} 55. —	2j. S.	—	1. —	6. —
	3j. v. S.	—	3.50	25. —
	4j. v. S.	—	6. —	50. —
montana uncinata ^{0/000} 40. —	2j. S.	—	1. —	5. —
	3j. v. S.	—	3. —	20. —
	4j. v. S.	—	5. —	40. —
monticola	1j. S.	—	3. —	20. —
	3j. v. S.	—	6. —	50. —
	4j. v. S.	—	10. —	90. —
	5j. 2x v. S.	—	25. —	—
Peuce	1j. S.	—	4. —	30. —
	2j. S.	—	5. —	40. —
ponderosa	3j. v. S.	—	6. —	50. —
	4j. v. S.	—	9. —	75. —
	5j. 2x v. S.	—	15. —	135. —
silvestris , siehe Seite 69				
Strobus , siehe Seite 69				
Thunbergii	1j. S.	—	6. —	50. —

JUNGE KONIFEREN ZUR WEITERKULTUR

		Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.
Pseudotsuga Dougl. caesia, glauca und viridis , siehe Seite 70					
Sciadopitys verticillata		2j. S.	—	35.—	—
Sequoia (Wellingtoniana) gigantea		1j. S.	—	16.—	150.—
Taxodium distichum		1j. S.	—	5.—	40.—
		4j. v. S.	40—60	14.—	120.—
		4j. v. S.	60—80	17.—	150.—
Taxus baccata	‰ 225.—	1j. S.	—	3.—	25.—
	‰ 360.—	2j. S.	—	5.—	40.—
	‰ 630.—	2j. v. S.	—	8.—	70.—
	‰ 720.—	3j. v. S.	7—15	9.—	80.—
	‰ 1000.—	3j. v. S.	10—20	12.—	110.—
	‰ 1400.—	3j. v. S.	12—25	18.—	160.—
		4j. v. S.	15—30	22.—	200.—
		m/m	20—30	30.—	270.—
		m/m	30—40	35.—	320.—
		m/m	40—50	45.—	400.—
baccata Dovastoni aureo-var.		2j. v. St.	8—15	20.—	—
		3j. v. St.	10—20	30.—	270.—
baccata elegantissima		3j. v. St.	10—20	30.—	270.—
baccata erecta Overeynderi		3j. v. St.	15—30	22.—	200.—
		4j. v. St.	20—30	27.—	250.—
baccata fastigiata		2 x v. S.	20—30	35.—	320.—
		2 x v. S.	30—40	44.—	400.—
		3j. v. St.	8—15	30.—	270.—
		4j. v. St.	12—20	35.—	320.—
bacc. fast. aureo-var.		3j. v. St.	8—15	30.—	270.—
bacc. gracilis pendula		3j. v. St.	—	30.—	—
		4j. v. St.	15—25	40.—	—
bacc. Washingtonii		3j. v. St.	10—20	30.—	—
		4j. v. St.	15—25	40.—	—
cuspidata		5j. v. S.	12—25	30.—	—
Thuja gigantea		2j. S.	—	2.50	15.—
		3j. v. S.	—	6.—	50.—
gigantea aurescens		2j. v. St.	12—25	14.—	120.—
		3j. v. St.	20—30	20.—	180.—
		2 x v. St.	30—50	33.—	300.—
occidentalis	‰ 54.—	2j. S.	—	1.—	6.—
	‰ 220.—	3j. v. S.	12—25	3.—	25.—
	‰ 270.—	3j. v. S.	15—30	3.50	30.—
	‰ 360.—	4j. v. S.	20—45	4.50	40.—
	‰ 400.—	4j. v. S.	25—50	5.—	45.—
	‰ 450.—	4j. v. S.	30—60	5.50	50.—
		2 x v.	30—40	15.—	135.—
		2 x v.	40—60	22.—	200.—
		2 x v.	60—80	28.—	250.—
		2 x v.	80—100	33.—	300.—
occ. albo spica nova		2j. v. St.	10—15	15.—	—
		3j. v. St.	15—25	20.—	—
occ. atrovirens		2j. v. St.	10—15	25.—	—
occ. columna		2j. v. St.	10—15	25.—	225.—
		3j. v. St.	15—30	33.—	300.—
occ. Ellwangeriana		2j. v. St.	10—15	13.—	120.—
		3j. v. St.	15—30	20.—	180.—
occ. Ellwangeriana elegantissima		2j. v. St.	8—15	13.—	120.—
		3j. v. St.	15—25	20.—	180.—
occ. Ellwangeriana Rheingold		2j. v. St.	—	20.—	—

JUNGE KONIFEREN ZUR WEITERKULTUR

	Alter	Höhe in cm	100 St. GM.	1000 St. GM.
Thuja occ. fastigiata	2j. v. St.	10—15	25.—	225.—
	3j. v. St.	15—20	33.—	300.—
occ. globosa	2j. v. St.	10—15	16.—	150.—
occ. Hoveyi	2j. v. St.	10—15	13.—	120.—
occ. pyramidalis	2j. v. St.	10—20	15.—	135.—
	3j. v. St.	15—25	20.—	180.—
	4j. v. St.	25—50	27.—	250.—
occ. recurva nana	2j. v. St.	—	18.—	—
	3j. v. St.	8—15	25.—	—
occ. Riversii	2j. v. St.	8—15	13.—	120.—
occ. Rosenthalii	2j. v. St.	8—12	25.—	225.—
	3j. v. St.	10—15	33.—	300.—
occ. Vervaeneana	2j. v. St.	8—15	13.—	120.—
occ. Wagneri (Versmanni)	2j. v. St.	10—20	13.—	120.—
occ. Wareana	2j. v. St.	8—15	20.—	—
Thujopsis dolabrata	2j. v. St.	—	13.—	120.—
Tsuga canadensis	2j. S.	—	6.—	50.—
	3j. v. S.	15—25	12.—	100.—
	4j. v. S.	20—35	22.—	200.—
	2 x v. S.	25—40	33.—	300.—
diversifolia	3j. v. S.	10—20	35.—	320.—
	4j. v. S.	15—25	40.—	360.—
Mertensiana	2j. S.	—	9.—	75.—
	3j. v. S.	15—25	17.—	150.—
	4j. v. S.	20—30	25.—	220.—
Sieboldii	3j. v. S.	10—20	30.—	270.—
	4j. v. S.	15—25	35.—	320.—

Wildlinge zu Unterlagen

Von überaus vielen meiner Kunden wird mir immer wieder unaufgefordert bestätigt, daß die von mir gelieferten Wildlinge sich zur vollsten Zufriedenheit entwickelt haben. Es ist dies wohl der schlagendste Beweis dafür, daß Sie bei mir auf das beste bedient werden. Ich widme der Anzucht von Wildlingen meine ganz besondere Aufmerksamkeit, kultiviere dieselben nur auf frischen, gut vorbereiteten Böden und habe auch in diesem Jahr wieder große Vorräte in gesunder, wüchsiger Qualität. Auf gutes und reelles Sortieren können Sie sich unbedingt verlassen.

	Alter	Dm. in mm	100St. GM.	1000 St. GM.	10000 GM GM.
Apfelwildlinge (Pirus malus)	2j. v.	8—10	8.—	70.—	650.—
	2j. v.	6—10	6.—	50.—	450.—
	2j. v.	6—8	5.—	40.—	360.—
	2j. pik.	8—10	9.—	80.—	750.—
	2j. pik.	6—10	6.50	55.—	500.—
	2j. pik.	6—8	5.50	45.—	400.—
	1j. pik.	7—9	8.—	70.—	650.—
	1j. pik.	5—7	5.—	40.—	350.—
	1j. S.	6—8	4.—	30.—	270.—
	1j. S.	5—8	3.—	20.—	180.—
	1j. S.	4—6	2.—	12.—	100.—
	1j. S.	3—5	1.20	8.—	70.—

WILDLINGE ZU UNTERLAGEN

	Alter	Dm. in mm	100 St. GM.	1000St. GM.	10000 St. GM.
Birnenwildlinge (<i>Pirus communis</i>)	2j. v.	8—10	8.50	75.—	700.—
	2j. v.	6—10	6.—	50.—	450.—
	2j. v.	6—8	5.—	40.—	360.—
	1j. pik.	7—9	8.—	70.—	650.—
	1j. pik.	5—7	5.—	40.—	360.—
	1j. S.	6—8	4.—	35.—	320.—
	1j. S.	5—8	3.—	20.—	180.—
	1j. S.	4—6	1.50	12.—	100.—
	1j. S.	3—5	1.20	8.—	70.—
Doucín gelb	2j. v.	8—10	11.—	100.—	—
	2j. v.	6—10	9.—	80.—	—
	2j. v.	6—8	8.—	70.—	—
	2j. v.	4—6	4.—	30.—	—
	1j. Abr.	6—8	5.50	45.—	420.—
	1j. Abr.	4—6	3.—	25.—	230.—
Doucín Ketziner Ideal	2j. v.	8—10	12.—	110.—	—
	2j. v.	6—8	9.—	80.—	—
	1j. Abr.	8—10	8.50	75.—	—
	1j. Abr.	6—8	7.—	60.—	—
	1j. Abr.	4—6	4.50	35.—	—
Doucín schwarz	2j. v.	8—10	11.—	100.—	—
	2j. v.	6—8	9.—	80.—	—
	2j. v.	4—6	4.50	35.—	—
Paradies	2j. v.	8—10	15.—	140.—	—
	2j. v.	6—8	11.—	100.—	—
	2j. v.	4—6	6.50	55.—	—
Pfirsich (<i>Amygdalus persica</i>)	1j. S.	9—12	5.—	40.—	—
	1j. S.	7—9	4.50	35.—	—
	1j. S.	5—7	3.50	25.—	—
	1j. S.	3—5	3.—	20.—	—
Prunus Mahaleb	2j. v.	6—10	3.—	18.—	160.—
	1j. S.	7—9	3.—	18.—	160.—
	1j. S.	5—7	2.50	14.—	125.—
	1j. S.	3—5	1.—	6.—	50.—
Prunus Mariana	1j. b. St.	5—10	6.50	55.—	500.—
Prunus Myrabolana	2j. v.	6—10	3.50	30.—	270.—
	1j. S.	7—9	3.50	27.—	250.—
	1j. S.	5—7	3.—	22.—	200.—
	1j. S.	3—5	2.—	10.—	90.—
Prunus spinosa	1j. S.	5—7	—	—	—
	1j. S.	3—5	—	—	—
Prunus St. Julien damascena	2j. v.	6—10	7.—	60.—	—
	1j. S.	8—10	8.—	70.—	—
	1j. S.	6—8	6.—	50.—	450.—
	1j. S.	4—6	3.50	25.—	225.—
Prunus St. Julien echt	2j. v.	6—10	4.50	33.—	300.—
	1j. S.	5—8	3.50	25.—	225.—
	1j. S.	3—5	2.—	10.—	90.—
Quitten	2j. v.	8—10	12.—	110.—	—
	2j. v.	6—10	11.—	95.—	—
	2j. v.	6—8	9.—	80.—	—
	2j. v.	4—6	5.—	40.—	—
	1j. Abr.	8—10	9.—	80.—	—
	1j. Abr.	6—8	7.—	60.—	—
	1j. Abr.	4—6	3.50	25.—	—

WILDLINGE ZU UNTERLAGEN

	Alter	Dm. in mm	100St. GM.	1000St. GM.	10000 St. GM.
Sauerkirschen (<i>Prunus cerasus</i>)	1j. S.	7—9	4.—	30.—	—
	1j. S.	5—7	3.—	20.—	—
	1j. S.	3—5	2.—	10.—	—
Vogelkirschen (<i>Prunus avium</i>), echte, hellrindige Harzer.	1j. S.	9—12	5.—	40.—	360.—
	1j. S.	7—9	3.50	28.—	250.—
	1j. S.	5—7	3.—	20.—	180.—
	1j. S.	3—5	2.—	12.—	100.—
Rosa canina	1j. S.	8—10	3.50	25.—	220.—
100000 St. GM. 1200.—	1j. S.	5—8	2.50	14.—	130.—
100000 St. GM. 720.—	1j. S.	4—6	2.—	9.—	80.—
100000 St. GM. 400.—	1j. S.	3—5	1.—	5.—	45.—
„ canina Brög	1j. S.	8—12	4.50	35.—	—
	1j. S.	5—8	3.50	25.—	—
	1j. S.	3—5	2.—	12.—	—
	1j. S.	2—3	1.—	5.—	—
„ canina Deegen	1j. S.	8—12	4.50	35.—	—
	1j. S.	5—8	3.50	25.—	—
	1j. S.	3—5	2.—	12.—	—
	1j. S.	2—3	1.—	5.—	—
„ canina Jägerbataillon	1j. S.	8—12	6.—	50.—	—
	1j. S.	5—8	5.—	40.—	—
	1j. S.	3—5	3.—	20.—	—
	1j. S.	2—3	1.50	8.—	—
Zum Aufpfl. f Samenträger 65-100 cm	3j. v.	—	11.—	100.—	—
„ canina Kokulinsky	1j. S.	8—12	4.50	35.—	—
	1j. S.	5—8	3.50	27.—	250.—
	1j. S.	3—5	2.—	12.—	110.—
	1j. S.	2—3	1.—	4.—	35.—
„ canina Meyers Zukunft	1j. S.	5—8	2.50	15.—	—
	1j. S.	3—5	1.50	8.—	—
	1j. S.	2—3	1.—	4.—	—
„ canina Schmid's Ideal	1j. S.	8—12	6.—	50.—	—
	1j. S.	5—8	5.—	40.—	—
	1j. S.	3—5	3.—	20.—	—
	1j. S.	2—3	1.50	8.—	—
„ canina Schmidt's Spezial	1j. S.	8—12	6.—	50.—	—
	1j. S.	5—8	5.—	40.—	—
	1j. S.	3—5	3.—	20.—	—
	1j. S.	2—3	1.50	8.—	—
„ canina Senff	1j. S.	8—12	4.—	30.—	—
	1j. S.	5—8	3.—	20.—	180.—
	1j. S.	3—5	2.—	10.—	90.—
	1j. S.	2—3	1.—	4.—	35.—
„ Laxa	1j. S.	8—12	4.—	30.—	270.—
	1j. S.	5—8	3.—	22.—	200.—
	1j. S.	3—5	2.—	12.—	100.—
	1j. S.	2—3	1.—	4.—	35.—
„ Pollmeriana	2j. v.	8—12	4.—	33.—	300.—
	2j. v.	6—8	3.50	25.—	225.—
	2j. v.	4—6	2.—	14.—	120.—
	1j. S.	8—12	4.50	35.—	—
	1j. S.	5—8	3.50	25.—	—
	1j. S.	3—5	2.—	12.—	—
	1j. S.	2—3	1.—	5.—	—

WILDLINGE ZU UNTERLAGEN

	Alter	Durchm. in mm	100St. GM.	1000 St. GM.	10000 St. GM.
Rosa polyantha (multiflora)	1j. b. St.	5-10	3.—	22.—	200.—
	1j. S.	5-8	3.—	20.—	180.—
	1j. S.	3-5	2.—	15.—	140.—
	1j. S.	2-3	1.—	5.—	40.—
„ rubiginosa	1j. S.	8-12	4.—	30.—	—
	1j. S.	5-8	3.—	20.—	180.—
	1j. S.	3-5	1.50	7.—	60.—
„ rugosa hollandica	1j. b. St.	5-10	4.—	33.—	300.—
	1j. S.	5-8	3.—	20.—	—
	1j. S.	3-5	2.—	10.—	—
Syringa vulgaris	v.	8-10	5.—	40.—	360.—
	v.	6-8	3.—	22.—	200.—
	2j. S.	8-12	5.—	40.—	360.—
	2j. S.	6-8	3.—	22.—	200.—
	2j. S.	5-8	2.50	18.—	160.—
	2j. S.	4-6	1.50	8.—	70.—
Cham. Lawsoniana, Veredlungs- ware	3j. v.	5-7	5.—	40.—	—
	3j. v.	4-6	4.50	35.—	—
Wildstämme zur Veredlung von Hochstamm-Rosen (Edelcanina in verschiedenen Sorten)	Länge cm				
		100-125	12.—	100.—	—
		125-150	20.—	175.—	—
		150-175	23.—	210.—	—
		175-200	30.—	270.—	—

Unterlagen für Gehölze und Koniferen Preise auf Anfrage

Topftannen

Prima runde, gutgarnierte Pflanzen von tadelloser Farbe, frostfreie Ware.

	100 St. GM.	1000 St. GM.
20-30 cm hoch	16.—	145.—
30-50 cm „	20.—	180.—
40-60 cm „	22.—	200.—
50-70 cm „	25.—	225.—
70-100 cm „	35.—	315.—

Tannen mit Fehlern, zum Dichtpflanzen für Balkonkästen, etc. geeignet sind 40 % billiger.

Picea pungens, zum Eintopfen	10 St. GM.	100 St. GM.	1000 St. GM.
20-30 cm hoch	3.50	30.—	270.—
30-40 cm „	4.50	40.—	360.—
40-60 cm „	7.—	60.—	540.—
60-80 cm „	10.—	90.—	800.—

Picea pungens glauca, zum Eintopfen	10 St. GM.	100 St. GM.
40-60 cm hoch	11.—	100.—
60-80 cm „	18.—	160.—

Zum Bepflanzen von Balkonkästen

	empfehle ich weiter:	100 St. GM.	1000 St. GM.
Pinus montana	20-30 cm hoch	20.—	180.—
(Krummholzkiefer)	30-40 „ „	25.—	225.—
Pinus Strobus	30-50 „ „	20.—	180.—
(Weymouthskiefer)	40-60 „ „	25.—	225.—
Pinus excelsa	30-50 „ „	22.—	200.—
(Tränenkiefer)	40-60 „ „	27.—	240.—
Juniperus communis	20-30 „ „	18.—	160.—
(Wacholder)	30-50 „ „	22.—	200.—

Tabelle für Frachtberechnung

(Ohne Gewähr)

Spezialtarif für lebende Pflanzen, die als Eilgut zum Frachtgutsatz reisen, wenn die einzelnen Packstücke nicht länger als 3½ m und nicht schwerer als 150 kg sind. Bei Waggonladung fällt die Beschränkung bezüglich Länge und Gewicht fort.

Für gedeckte Wagen kommen 5% Aufschlag in Anrechnung.

Von Station Pinneberg nach	Stück- gutver- packt	Waggonladung unverpackt		Von Station Pinneberg nach	Stück- gutver- packt	Waggonladung unverpackt	
	100 kg RM.	5000 kg RM.	10000 kg RM.		100 kg RM.	5000 kg RM.	10000 kg RM.
Aachen	8.20	131.—	209.—	Kolberg	8.50	134.50	214.—
Arnsberg (Westf.)	7.10	111.50	179.—	Königsberg/P. Hbf.	10.90	174.50	279.—
Aschaffenburg Hbf.	9.—	141.50	226.—	Köln-Gereon	7.80	124.50	199.—
Augsburg Hbf.	10.50	166.50	266.—	Konstanz	11.10	177.50	284.—
Bamberg	9.30	148.—	238.—	Krefeld	7.30	116.—	185.—
Basel Bad Bf.	10.90	175.—	280.—	Leer (Ostfr.)	4.90	77.50	124.—
Bautzen	8.40	132.50	212.—	Lehrte	4.10	64.50	102.—
Bebra	7.10	111.50	179.—	Leipzig M. Th. Bhf.	7.20	113.—	181.—
Berlin Spreeufer	6.—	93.—	149.—	Liegnitz	9.—	144.50	231.—
Bielefeld Hbf.	5.50	86.—	138.—	Lüneburg	2.10	30.—	48.—
Bingen Rhein	9.30	148.—	238.—	Magdeburg Hbf.	5.50	86.—	138.—
Bochum Hbf.	6.80	107.50	172.—	Mainz Hbf.	9.30	146.50	234.—
Bonn	8.10	129.50	206.—	Mannheim Hbf.	9.70	152.50	244.—
Braunschweig Hbf.	4.60	71.—	113.—	Minden (Westf.)	5.10	80.—	128.—
Bremen Hbf.	3.30	51.—	81.—	München Hbf.	10.80	171.50	274.—
Breslau-Ost	9.70	152.50	244.—	M.-Gladbach Hbf.	7.60	120.—	192.—
Celle	3.60	56.50	91.—	Nürnberg Hbf.	9.90	156.50	251.—
Chemnitz Hbf.	8.10	129.50	206.—	Oldenburg (Oldb.)	4.10	62.50	100.—
Darmstadt Hbf.	9.30	144.50	231.—	Osnabrück	5.10	79.50	127.—
Dortmund Hbf.	6.70	106.—	169.—	Ratibor	10.60	169.50	271.—
Dresden-Neustadt	8.10	129.50	206.—	Regensburg	10.20	162.50	260.—
Düsseldorf Hbf.	7.30	116.—	185.—	Rendsburg	2.60	38.50	61.—
Elbing	10.40	165.—	264.—	Rostock Hbf.	4.80	73.50	118.—
Erfurt	7.40	117.50	188.—	Schleswig Altst.	3.10	47.50	75.—
Eydtkuhnen	11.30	180.—	287.—	Schwerin (Meckl.)	3.40	53.50	85.—
Flensburg	3.60	56.50	91.—	Stettin Hbf.	6.90	109.50	174.—
Frankfurt (Oder)	7.10	112.50	180.—	Stralsund	5.80	91.50	147.—
Frankfurt/M. Hbf.	9.—	141.50	226.—	Stuttgart Hbf.	10.20	162.50	260.—
Freiburg (Breisg.)	10.80	171.—	273.—	Tilsit	11.30	179.50	286.—
Geldern a. Rh.	7.30	116.—	185.—	Trier Hbf.	9.50	151.50	242.—
Glogau	8.80	138.—	221.—	Uelzen	2.80	42.50	68.—
Görlitz	8.50	136.—	218.—	Ulm	10.60	167.50	268.—
Göttingen	6.—	94.50	151.—	Warnemünde	4.90	76.50	122.—
Halberstadt	5.80	91.—	145.—	Wernigerode Rbf.	5.70	89.50	142.—
Halle (Saale)	6.70	106.—	169.—	Wesel	6.90	109.50	174.—
Hannover	4.30	67.50	108.—	Wesermünde- Bremerhaven	3.40	52.50	84.—
Heilbronn Hbf.	9.90	156.50	251.—	Wiesbaden-Süd	9.30	147.50	235.—
Hildesheim Hbf.	4.60	71.—	113.—	Worms	9.50	150.—	240.—
Hof Hbf.	8.80	138.50	221.—	Wuppertal-Barmen	7.20	114.50	182.—
Jena Saalbhf.	7.70	122.—	195.—	Wuppertal- Elberfeld	7.30	115.—	184.—
Karlsruhe Hbf.	10.—	158.50	253.—	Würzburg	9.—	141.50	226.—
Kassel Hbf.	6.80	106.—	171.—	Zittau	8.80	141.—	225.—
Kiel Hbf.	2.50	36.—	58.—				
Koblenz Hbf.	8.80	138.08	221.—				

Inhalts-Verzeichnis

	Seite
Allee- und Parkbäume	47—52
Beerensträucher	6
Buxus	54—55
Forstpflanzen	65—70
Heckenpflanzen, Laubhölzer	40—44
" für immergrüne Hecken	44—46
" Zusammenstellung geeigneter Sorten	46—47
Koniferen	53—64
" zur Weiterkultur	88—92
Lieferungsbedingungen	2
Obstbäume	4—5
Obstsorten	6—7
Rosenpreise	8
Rosensorten	9—16
Schlingpflanzen	39—40
Stauden	70—79
Tabelle für Frachtberechnung	3. Umschl. Seite
Taxus	45 u. 62
Thuja	45
Topftannen	96
Trauerbäume	52—53
Wildlinge zu Unterlagen	93—96
Ziergehölze und Moorbeetpflanzen	17—39
Ziergehölze zur Weiterkultur	80—87